

## К ПОЗНАНИЮ ПОДЕНОК (ЕРНЕМЕРПТЕРА) СЕВЕРНОЙ МОНГОЛИИ

О. Я. Байкова

Амурское отделение Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии - ТИНРО  
680005 Хабаровск - 5, СССР

В 1974-75 и 1979-80 гг. Советско-Монгольская комплексная Хубсугульская экспедиция Иркутского и Монгольского университетов проводила исследования в оз. Хубсугул и в Прихубсугулье. Работы, проведенные экспедицией, впервые дали новый материал по фауне притоков верхнего течения р. Селенги - главной водной артерии МНР и самого большого притока озера Байкал.

Материал в виде количественных проб собирался в основном в русле р. Селенги и вблизи устьев некоторых ее притоков; просмотрено содержание желудков рыб, собранных в оз. Хубсугул и его притоках Их-Хороо-Гол, Их-Ханх-Гол и Байн-Гол.

В результате обработки материалов экспедиции (Байкова и др. 1977; Байкова, Варыханова 1978) и литературных данных (Чернова 1952; Браш (Braasch 1979) для водоемов Северной Монголии известно в настоящее время 47 видов поденок из них 45 видов указываются впервые. Это далеко не весь видовой состав поденок Монголии, поскольку, качественные сборы на различных биотопах почти не проводились, а поденки юга - востока Монголии не задеты исследованиями вообще.

Фауна поденок Монголии состоит в основном из видов Восточной Палеарктики с небольшой примесью западных форм, (10 видов), в том числе трех видов голарктических - Parameletus chelifer, Cloeon dipterum /L./, Ephemerella aurivillii Bngtss., последние распространены в водоемах Северной Америки, а южной их границей распространения, повидимому, и является Монголия.

В Монгольской фауне имеются виды общие с южной Сибирью: Ecdyonurus yoshidae Takah., Rhithrogena lepnevae Br., Epeorus latifolium Ueno, Cinygma altaica Tshern., Ephemerella lepnevae Tshern., Ephemerella tricantha Tshern.

Наибольшее сходство фауна поденок Монголии имеет с фауной Приамурья (8%) и Восточной Сибири (8%), виды которых распространены в Северном Китае, Корее и Японии (Чернова 1952; Байкова

1965, 1967, 1969, 1970, 1979).

В Северную Монголию проникли два вида поденок - Isonychia "na" Iman., Ephemerella trispina, которые распространены в бассейне Амура, Китая и Японии, но отсутствуют в водоемах Восточной Сибири. Для фауны поденок Монголии пока описаны только три новых вида: Baetis mongolicus? Tshern. (Чернова 1952), Ecdyonurus mongolicus Bayk. and Var. (Байкова и Варыханова 1978), / = Heptagenia mongolica / Bayk. and Var. / comb. n. /, Epeorus tshernovae Braasch.

Проникновение западных, сибирских и восточных видов поденок в Северную Монголию шло, повидимому, через районы Забайкалья. Рассмотренный материал позволяет предположить, что фауна Монголии молодая, возникла в четвертичное время и вселение ее в этот регион произошло в последковое время.