ENTOMOLOGIA PARISIENSIS;

SIVE

CATALOGUS Insectorum quæ in Agro Parisiensi reperiuntur;

SECUNDUM methodum Geoffræanam in sectiones, genera & species distributus:

CUI addita sunt nomina trivalia & fere trecentæ novæ Species.

Edente A. F. DE FOURCROY, Doct. Med. Paris.; è Reg. Scientiar. Academ.; è Reg. Soc. Medic. &c.

PARS PRIMA.

PARISIIS,

VIA ET ÆDIBUS SERPENTINEIS.

M. DCC. LXXXV.

SUB PRIVILEGIO ACADEMIÆ.

1860 30/6

LECTORI ENTOMOPHYLO

MONITUM EDITORIS.

JAM à viginti annis prodiit celeb. Geoffroy de insectis opus eximium, quod multo favore prosecuti sunt historiæ naturalis cultores. Dudum à plurimis expectabatur manuale Compendium quod nomenclaturam & methodum complectens, omissâ scilicet historicâ parte, rus deferri posset. Non ergo ingratum entomophylis fore arbitratus est illustr. autor, si catalogus insectorum quæ circà Parisios reperiuntur typis parvâ formâ mandaretur, Botanicon Parisiensis ad instar. Felicissimæ apud cives suos praxeos medicæ curis distractus, hoc quod susceperat opus omnino absolvere non potuit. Entomologiæ olim deditus & autoris auxilio fretus, hunc catalogum

publici juris facere non timui. Methodum ill. Geoffroy, genera, species, descriptivas sententias, religiosè servavi. Trivialia, sæpius Linneana, ipse autor addidit, quæ in magno opere (1) *neglexerat. Hâc simul datâ occasione quædam in methodo suâ emendavit, adjecit plurima. Sic genus Eulophi post Tenthredines omnino omissum est, cum sedulâ attentione factâ, Eulophus nihil aliud sit quàm verus Cynips antennis ramosis. Hinc insectum illud inter cynipes nunc incedit. Præterea multæ à viginti annis novæ in agro Parisiensi detectæ sunt insectorum species, quæ ad sua quæque genera revocatæ sunt; sed ut novæ illæ species quæ ducentum & quinquaginta superant à cæteris in historiâ Insectorum in-4°. descriptis*

(1) Hist. abreg. des Insectes, par M. Geoffroy, 2 vol. in-4°. Paris, 1764.

distinguantur, singulas asterico notandas curavi. Speçierum dimensiones, & habitationum loca adjeci; sic ergo quoad numerum specierum & nomenclaturam hic catalogus multo auctior & emendatior magno opere in-4°. prodit, & hanc illustrationem celeb. Geoffroy omnino deberi fateor. Levia quædam vel addidi, vel mutavi tantum, quæ hìc commemorare supervacuum duco; simplicis igitur editoris munus suscepi, utilitatis potiùs quàm gloriæ spe ductus.

Dabam Lutetiæ, mense apr. 1785.

Insectorum Divisio generalis.

Insecta dividuntur in sex sectiones.

Sectio I. *Coleoptera*, quorum alæ coleoptris seu elytris teguntur & quibus est os maxillosum.

Sectio II. *Hemiptera*, quorum alæ superiores elytris accedunt, & quorum os sub thorace est inflexum.

Sectio III. *Tetraptera alis farinaceis*, quibus sunt quatuor alæ squamulis tectæ.

Sectio IV. *Tetraptera alis nudis*, quibus alæ quatuor sunt membranaceæ.

Sectio V. *Diptera*, quibus sunt alæ duæ & halteres sub alarum origine.

Sectio VI. *Aptera*, quæ carent alis.

Prima autem sectio, coleopterorum scilicet, cum maxime numerosa sit, in articulos & ordines dispertitur.

Articulus primus insecta coleoptera comprehendit quæ coleoptra gerunt integra & dura.

Articulus ſecundus ex iis componitur quorum coleoptra dura ſunt, ſed dimidiata, ſeu ſemiſecta ita ut abdomen non omnino tegant.

Articulus tertius ea exhibet inſecta, quorum coleoptra mollia ſunt & membranacea.

Ex iis articulis quiſque in varios ordines dividitur, prout tarſi inſectorum varium referunt articulorum numerum, duos nempe, tres, quatuor aut quinque articulos, vel quinque in primo & ſecundo pedum pari, quatuor verò in poſteriore.

ERRATUM.

Pag. 82, *lin.* 8, tribus *lege* tibiis.

EXTRAIT des regiſtres de l'Académie des Sciences.

Du 13 Juillet 1785.

LES Commiſſaires nommes par l'Académie, lui ayant rendu compte d'un Ouvrage de M. DE FOURCROY, intitulé : *Entomologia Pariſienſis*, elle a jugé cet Ouvrage digne de ſon approbation, & de paroître ſous ſon Privilège.

Je certifie le préſent extrait conforme à l'original & aux regiſtres de l'Académie. Le 13 Juillet 1785.

Signé, le Marquis DE CONDORCET.

EXTRAIT des regiſtres de la Société Royale de Médecine.

LA Société Royale de Médecine ayant entendu, dans la ſéance tenue au Louvre le 23 Juin préſent mois, la lecture d'un rapport très-avantageux fait par MM. GEOFFROY & MAUDUYT, ſur un Ouvrage de M. DE FOURCROY, intitulé : *Entomologia Pariſienſis, ſive Catalogus Inſectorum quæ circa Lutetiam reperiuntur, &c.* a penſé que cet Ouvrage étoit très-digne de ſon approbation. En foi de quoi j'ai ſigné le préſent. A Paris, ce 28 Juin 1785.

Signé, VICQ D'AZIR, Secrétaire perpétuel.

ENTOMOLOGIA

ENTOMOLOGIA PARISIENSIS.

PRIMA SECTIO INSECTORUM.

INSECTA COLEOPTERA.

Caracteres sectionis.

Abdomen elytris duris tectum.
Maxillæ corneæ laterales.

ARTICULUS PRIMUS.

Caract. articuli I.

Elytra integra dura.

ORDO PRIMUS.

Caract. Ordin. I.

Tarsorum articuli quinque.

I. PLATYCERUS. *Le Cerf-volant.*

Antennæ in extremo uno versu pectinatæ.

FAMILIA I. *Antennis fractis.*

1. P. Cervus.

Le grand Cerf-volant.

Longueur 21 lignes. Largeur 7 lignes.

P. fuscus, cornubus duobus mobilibus, aspice bifurco, intus ramo denticulisque instructis.

Locus. Habitat silvas & præcipue ilices.

2. P. fœmina cervi.

La grande Biche.

Long. 16 lig. Larg. 6 lig.

P. fuscus, elytris lævibus, capite lævi.

Loc. Larva carie exesos fraxinorum truncos habitat.

3. P. parallelipipedus.

La petite Biche.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig.

P. niger, elytris lævibus, capitis puncto duplici prominente.

Loc. Habitat arbores cariosas.

4. P. caraboides.

La Chevrette bleue.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

P. violaceo-cœruleus, elytris lævibus.

Varietas A. Platycerus caraboides latior, superne viridis, inferne fuscus. *La Chevrette verte.*

Loc. Habitat easdem arbores.

FAMIL. II. *Antennis integris.*

5. P. striatus.

La Chevrette brune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

P. fuscus, capite & thorace punctatis, elytris punctato-striatis.

Loc. Habitat vetustas arbores.

* 6. P. pygmæus.

Le Cerf-volant mignonette.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

P. nigro fuscus, elytris striatis, pedibus fuscis, capite brevi, antennis vix apparentibus.

Loc.

II. PTILINUS. *LA PANACHE.*

Antennæ ſecundùm totam longitudinem uno verſu pectinatæ.

1. P. fuſcus.

La Panache brune.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

P. atro-fuſcus, thorace convexo, pedibus antenniſque pallidis.

Loc. Habitat vetuſtas ſalices quas rotundis foraminibus larva terebrat.

2. P. flaveſcens.

La Panache jaune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

P. niger, ſubvilloſus, thorace plano marginato, elytris flavis mollioribus.

Loc. Habitat flores apertos.

III. SCARABÆUS. *LE SCARABÉ.*

Antennæ clavatæ, clavâ lamellatâ; ſcutellum inter elytrorum origines.

FAMIL. I. *Antennarum lamellis septem.*

1. S. nasicornis.

Le Moine.

Long. 15 lig. Larg. 9 lig.

S. capite unicorni recurvo, thorace gibbo, abdomine hirsuto.

Loc. Habitat humum recentem (*les couches*) & arborum cariem.

2. S. fullo.

Le Foulon.

Long. 17 lig. Larg. 7 lig.

S. antennarum lamellis maximis, corpore nigro, squammis albis, varie maculato.

Loc. Habitat meridionales Galliæ provincias; in musæis frequens.

3. S. melolontha.

Le Hanneton.

Long. 1 pouce. Larg. 6 lig.

S. testaceus, thorace villoso, abdominis incisuris lateralibus albis, caudâ inflexâ.

Loc. Habitat arbores.

FAMIL. II. *Antennarum lamellis tribus.*

4. S. typhæus.

Le Phalangiste.

Long. 8 lig. Larg. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, elytris ſtriatis, thorace antrorſum tricorni.

Loc. Habit. bovinas fæces, gallicè *Bouzes de vaches.*

5. S. auratus.

L'Emeraudine.

Long. 9 lig. Larg. 5 lig.

S. viridi-ænæus, thoracis parte pronâ, antice prominente.

Loc. Habitat flores præcipue roſæ & pæoniæ.

6. S. nobilis.

Le Verdet.

Long. 7 lig. Larg. 4 lig.

S. viridis nitens, thorace infra æquali, non prominente.

Loc. Habitat flores umbellatos.

7. S. autumnalis.

Le petit Hanneton d'automne.

Long. 7 lig. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

S. teſtaceus, thorace villoſo, elytris luteo-

pallidis, lineis tribus elevatis pallidioribus.

Varietas A. Scarabæus autumnalis omnino viridis.

Loc. Habitat circa arbores.

8. S. horticola.

Le petit Hanneton à corcelet vert.

Long. 4 lig. Larg. 2 $\frac{2}{5}$ lig.

S. capite thoraceque cœruleo piloso; elytris rufis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

9. S. ſtercorarius.

Le grand Pilulaire, le fouille-merde.

Long. 10 lig. Larg. 5 lig.

S. ater, dorſo glabro, elytris ſulcatis; capitis clypeo rhomboide, centro prominulo.

Loc. Habitat bovinas fæces.

10. S. vernalis.

Le petit Pilulaire.

Long. 7 lig. Larg. 5 lig.

S. cœruleſcens, dorſo elytriſque glabris læviſſimiſque, capitis clypeo rhomboide, centro prominulo.

Loc. Habitat bovinas fæces.

11. S. ſubterraneus.

Le Scarabé perlé.

Long. 3 ½ lig. Larg. 2 lig.

S. ater, punctis elevatis, per ſtrias digeſtis.

Loc. Habitat arenam ſterilem; in urbe *Fontainebleau* frequens.

12. S. hæmipterus.

Le Scarabé à tarrière.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

S. ater depreſſus & ſquamoſus, maculis albis variegatus, elytris abdomine brevioribus, fœmina aculeo ani.

Loc. Habitat arbores exeſas & cortices.

13. S. argenteus.

L'Ecailleux violet.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig. ¾.

S. violaceus & ſquamoſus, ſquamis ſubtus argenteis.

Loc. Habitat exeſos arborum truncos.

14. S. funerarius.

Le Drap mortuaire.

Long. 5 lig. Larg. 3 lig.

S. nigro-cœrulescens, maculis albis sparsis, ordine macularum abdominalium longitudinali.

Loc. Habitat umbelliferarum flores.

15. S. marginatus.

Le Scarabé à bordure.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, elytris croceis margine nigro.

Loc.

16. S. fasciatus.

La Livrée d'ancre.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.

S. niger hirsutie-flavus, elytris luteis, fasciis tribus nigris interruptis.

Loc. Habitat flores umbellatos.

17. S. villosus.

L'Arquelin velu.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

S. villosus albo, nigro flavoque irregulariter variegatus.

Loc.

18. S. bicolor.

Le Scarabé bedeau.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

S. capite thoraceque nigro, antennis elytrisque rubris.

Loc. Larva & Scarabæus fæces bovinas habitat.

19. S. fimetarius.

Le Scarabé gris des bouzes.

Long. 1, 2, 3 lig. Larg. ½ 1, 1 ½ lig.

S. capite thoraceque nigro glabro, elytris griseis, pedibus pallidis.

Loc. Abundat in bovinis fæcibus.

20. S. fossor.

La Tête armée.

Long. 2, 3, 4, 5 lig. Larg. 1, 2, 2 ½ lig.

S. totus niger, spinulis tribus capitis transversim positis.

Loc. Abundat in bovinis fæcibus.

21. S. gagatinus.

Le Scarabé jayet.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

S. totus niger, capite inermi.

Loc. Habitat bovinas fæces.

22. S. fulvescens.

Le Scarabé fauve aux yeux noirs.

Long. 3 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

S. fulvus, oculis nigris, thorace glabro.
Loc. Habitat arbusta sepium.

23. S. atratus.
Le Velours noir.
Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.
S. niger hirsutus.
Loc. In horto regio Parisiensi frequens.

24. S. fumosus.
Le Scarabé couleur de suie.
Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.
S. ater, thorace subvilloso, elytris fuscis striatis.
Loc.

25. S. lamellatus.
Le Scarabé brun chagriné.
Long. 4 lig. Larg. 2 lig.
S. atro-fuscus, supra veluti cinerascens, antennis pedibusque fuscis, lamellis antennarum longis, elytris striatis.
Loc.

26. S. aquaticus.
Le Scarabé noir des marais.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

S. piceus.

Loc. Habitat putridas paludum aquas.

27. S. natator.

Le Scarabé nageur.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

S. totus rufo-niger, maculis nigrioribus.

Loc. Habitat rivulos & aquas.

28. S. perla.

La Perle aquatique.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

S. ſubrotundus lucidus, capite thoraceque nigro, elytris pallidis pellucidis.

Loc. Habitat rivulos.

29. S. putridus.

Le petit Scarabé noir ſtrié.

Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. niger, pedibus rufis, elytris profunde ſtriatis.

Loc. Habitat putridas plantas.

30. S. florilegus.

Le petit Scarabé des fleurs.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

S. nigro-cœruleſcens.

Loc. Habitat flores.

* 31. S. ſulcatus. Hister sulcatus Olav. Encycl. vt. 447. 21.

Le Scarabé à côtes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

S. ater, ſupra coſtis elevatis ſtriatis.

Loc.

IV. COPRIS. *Le Bousier.*

Antennæ clavatæ, clavâ lamellatâ.
Scutellum inter elytrorum origines nullum.

1. C. lunaris.

Le Bouſier capucin.

Long. 8 lig. Larg. 4 $\frac{2}{3}$ lig.

C. capitis clypeo lunulato, margine elevato, corniculo denticulato.

Loc. Habitat fimetaria & bovinas fæces rar.

2. C. ſerratus.

Le Hottentot.

Long. 7 lig. Larg. 5 lig.

C. niger; capite clypeato, margine ſerrato, thorace lato lævi; elytris ſtriatis.

Loc. Habitat bovinas fæces; rar. in agris lutetianis.

3. C. nuchicornis.

Le petit Bouſier noir cornu.

Long. 3 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2, 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. fuſco-niger, capite clypeato angulato, pone cornuto, elytris ferrugineo-nebuloſis, brevibus, ſtriatis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

4. C. acornis.

Le petit Bouſier noir ſans cornes.

Long. 2, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. fuſco-niger, capite clypeato angulato, non cornuto, elytris brevibus, ſtriatis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

5. C. conſpurcatus.

Le Bouſier à deux cornes.

Long. 4 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. obſcure ænæus, capite pone bicorni, thorace antice prominente, elytris rufis nigro maculatis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

6. C. fulvus.

Le Bouſier fauve.

Long. 2, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig.

C. fulvus, capite ænæo, thoracis utrinque cavitate laterali fuſcâ.

Loc. Habitat bovinas fæces.

7. C. hæmorrhoidalis.

Le Bouſier à points rouges.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. niger nitidus, thorace antice gibbo duplici, elytro ſingulo maculâ duplici rubrâ.

Loc. Habitat bovinas fæces.

8. C. ſinuatus.

Le Bouſier à couture.

Long. 5 lig. Larg. 4 lig.

C. niger, capite clypeato, elytris margine exteriore ſinuatis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

9. C. arachnoides.

Le Bouſier araignée.

Long. 4 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger, pedibus longis, femorum poſteriorum baſi denticulatâ, elytris poſtice gibbis.

Loc. Idem.

10. C. corniger.

Le Bouſier à cornes retrouſſées.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger, capite pone bicorni, corniculis tenuibus arcuatis, longitudine thoracis, thorace utrinque ſinuato.

Loc. Habitat bovinas fæces.

V. ATTELABUS. *L'ESCARBOT.*

Antennæ clavatæ, clavâ integrâ, in medio fractæ.

Caput intra thoracem.

1. A. unicolor.

L'Eſcarbot noir.

Long. 1, 3, 4 lig. Larg. 1, 2, 3 lig.

A. totus niger, elytris lævibus nonnihil ſtriatis.

Loc. Habitat identidem fæces bovinas, ſæpius glaream ſterilem.

2. A. bimaculatus.

L'Eſcarbot à taches rouges.

Long. 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{4}$ lig.

A. niger, elytro ſingulo macula rubra.

Loc. Cum præcedent.

3. A. cupreus.
L'Escarbot bronzé.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig.
A. nigro-cupreus, capite nonnihil prominulo.
Loc. Cum præcedent. zie pag. 13 nr. 31.

VI. DERMESTES. *LE DERMESTE.*

Antennæ clavatæ perfoliatæ, ultimo articulo solido gibboso.
Elytra non marginata.

1. D. vespillo.
Le Dermeste à point d'Hongrie.
Long. 9 lig. Larg. 4 lig.
D. thorace marginato, elytris abscissis, nigris, fasciis duabus transversis undulatis luteis.
Loc. Habitat cadavera putrida.

2. D. Listerianus. Necrophorus germanicus Linn.
Le grand Dermeste noir.
Long. 14 lig. Larg. 6 lig.
D. thorace marginato, elytris abscissis, totus niger.
Loc. Cum præcedente, rarior.

3. D. bipunctatus.

Le Dermeste à 2 points rouges.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. niger, coleoptris punctis rubris binis.

Loc. Putrida cadavera habitat.

4. D. pellio.

Le Dermeste à 2 points blancs.

Long. 2, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

D. niger, coleoptris punctis albis binis.

Loc. Habitat hortos & domos.

5. D. lardarius.

Le Dermeste du lard.

Long. 3 lig.

D. niger, elytris antice cinereis.

Loc. Habitat partes animalium putridas, musæis ubi pelles conservantur infestus.

6. D. pallidus.

Le Dermeste effacé.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. nigro-fuscus, elytris antice pallidioribus nebulosis.

Loc. Habitat partes animalium putridas, musæis ubi pelles conservantur infestus.

7. D. murinus.

Le Dermeste à écusson jaune.

Long. 2, 3 lig. Larg. 1 lig.

D. lævis niger, cinereo-nebulosus, scutello luteo.

Loc. Cadavera & exesas arbores habitat.

8. D. flavescens.

Le Velours jaune.

Long. 2 lig.

D. flavescens pilosus, oculis nigris.

Loc. Habitat lignum exesum.

9. D. oblongus.

Le Dermeste levrier à stries.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

D. oblongus fuscus, elytris striatis.

Loc. Habitat ligneas supellectiles in domis.

10. D. contractus.

Le Dermeste levrier ponctué & strié.

D. oblongus ferrugineus; elytris punctato-striatis.

Loc. Habitatio præcedentis.

11. D. auriculatus.

Le Dermeste à oreilles.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. tentaculis ante oculos antenniformibus mobilibus.

Loc. Vere novo in aquas natat.

12. D. stercoreus.

Le Dermeste du fumier.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

D. oblongus, glaber, testaceus, oculis nigris.

Loc. Fimetaria habitat, identidem in domis reperitur.

13. D. variegatus.

Le Dermeste panaché.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. nigro fuscoque nebulosus, elytris vix striatis.

Loc. Habitat cortices cariosos.

14. D. striatus.

Le Dermeste à côtes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. nigro fuscoque nebulosus, thorace

elytrisque profundè striatis & punctatis.

Loc. Habitat vetustas arbores.

15. D. aquaticus. Helophorus aquaticus Linn.

Le Dermeste bronzé.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 $\frac{3}{4}$ lig.

D. viridi-ænæus, thorace fasciis quatuor elevatis, elytris punctato-striatis.

Loc. Confervas rivorum habitat.

16. D. 4-punctata.

Le Dermeste à 4 points rouges, strié.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

D. niger, coleoptris punctis rubris quaternis, elytris striatis oblongus.

Loc. Habitat arbores; rarus.

17. D. hortensis.

Le Dermeste à 4 points rouges, sans stries.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

D. niger, coleoptris punctis rubris quaternis, elytris lævibus subrotundus.

Loc. Habitat arbores in sylvis & hortis.

18. D. gagatinus.

Le Dermeste jayet.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. niger ſubrotundus elytris lævibus.
Loc. Habitat flores.

19. D. lugubris.
Le Dermeſte en deuil.
Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.
D. niger ſubrotundus, elytris ſtriatis.
Loc. Habitat plantas aquaticas.

20. D. longicornis.
Le Dermeſte noir à longues antennes.
Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.
D. niger ſubrotundus, elytris lævibus, antennis thorace longioribus.
Loc. Habitat flores.

21. D. fulvipes.
Le Dermeſte noir à pattes fauves.
Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.
D. niger oblongus, elytris punctatis, pedibus fulvis.
Loc. Habitat flores.

22. D. pellucidus.
Le Dermeſte à étuis tranſparens.
Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.
D. elytris corneis pellucidis, thorace obſcuriore.

Loc. Habitat umbelliferarum flores.

* 23. D. ſuturatus.

Le Dermeſte à couture.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. totus niger, ſubrotundus, thorace elytriſque profunde ſtriatis & punctatis.

Loc.

* 24. D. triſulcus.

Le Dermeſte à tête noire.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. oblongus, fuſcus capite nigro, thorace coſtis tribus elevatis, elytris ſtriatis.

Loc.

* 25. D. faſciatus.

Le Dermeſte à bandè noire.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

D. oblongus, niger, pedibus coleoptriſque fulvis, elytrorum faſciâ tranſversâ nigra.

Loc.

* 26. D. ſcapularis.

Le Dermeſte à épaulettes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. capite thoraceque rubro, elytris nigris, maculis antice extusque rubris.

Loc.

* 27. D. pygmæus.

Le Dermeste puce.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. ovatus testaceus, subpilosus oculis nigris.

Loc.

* 28. D. thoracicus.

Le Dermeste puce à corcelet rouge.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

D. ovatus, capite, thorace pedibusque rubicundis, elytris nigris.

Loc.

* 29. D. testudinarius.

Le Dermeste-tortue noire.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

D. niger nitens ovatus, elytris postice lividis.

Loc.

* 30. D. tricolor.

Le Dermeste-tortue à tache rouge.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

D.

D. niger nitens ovatus, elytris postice, antice maculâ rubrâ.

Loc.

* 31. D. tesselatus.

Le Dermeste à l'échiquier.

Lon. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. niger; maculis fuscis, plurimis connexis, elytris punctatis.

Loc.

* 32. D. semi-coleopterus.

Le Dermeste noir à étuis courts.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. ater, elytris marginatis brevibus, pedibus fuscis.

Loc.

* 33. D. dimidiatus.

Le Dermeste à demi-étuis.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. niger, elytris dimidiatis pone flavis.

Loc.

VII. BIRRHUS. *LA VRILLETTE.*

Antennæ articulis tribus ultimis longissimis semi-clavatæ.

1. B. domesticus.

La Vrillette des tables.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ lig.

B. testaceo-niger, thorace subhirsuto.

Loc. Ligneas suppelectiles foraminibus rotundis terebrat.

2. B. paniceus.

La Vrillette de la farine.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

B. testaceus glaber oculis nigris.

Loc. Habitat cerealia.

3. B. mollis.

La Vrillette fauve.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

B. fulvus obscurus, oculis nigris.

Loc. Habitat pinum.

4. B. pertinax.

La Vrillette savoyarde.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

B. totus nigro-fuscus.

Loc. Habitat ligna tabulata domorum.

5. B. fasciatus.

La Vrillette brune à bandes grises.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. fuſcus, faſciis elytrorum tranſverſis cinereis.

Loc.

6. B. cœruleſcens.

La Vrillette bleuâtre.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

B. totus nigro-cœruleus ſubvilloſus.

Loc.

VIII. ANTHRENUS. *L'ANTHRÊNE.*

Antennæ clavatæ integræ, clavâ ſolidâ compreſſâ.

1. A. ſcrophulariæ. Anthr. pimpinellae F.

L'Anthrêne à broderie.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

A. ſquamoſus niger, faſciâ punctiſque coleoptrorum albis, ſuturis fuſcis.

Loc. Habitat flores, multiplex.

2. A. florilegus. Anthrenus verbasci pimpinellae F.

L'Amourette.

Long. $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. ſquamoſus niger, elytris fuſcis, faſciâ triplici undulatâ albâ.

Loc. Larva cadavera habitat, alatus floro

IX. CISTELA. *La Cistele.*

Antennæ extrorsum crassiores nonnihil perfoliatæ.

Thorax conicus non marginatus.

1. C. viridescens. Byrrhus pilula Linn.

La Cistele satinée.

Long. 4 lig. Larg. 2 $\frac{2}{3}$ lig.

C. subvillosa viridescens, fasciis longitudinalibus fuscis interruptis.

Loc. Habitat arenam & gramina.

2. C. atra. Byrrhus fasciatus ☿.

La Cistele à bande.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. subvillosa atra, fasciâ elytrorum transversâ aurato-fuscâ.

Loc.

3. C. nitens.

La Cistele noire lisse.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. nigra nitens glabra.

Loc.

X. PELTIS. *Le Bouclier.*

Antennæ extrorsum crassiores nonnihil perfoliatæ.

Thorax & elytra marginata.

1. P. atrata. Silpha atrata Linn.

Le Bouclier noir à trois raies & corcelet lisse.

Long. 4, 5, 6 lig. Larg. 2, 3, 4 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis, spatio interjecto punctato, thorace lævi.

Variet. A. ead. spatio interjecto punctato, thorace lævi, utrinque sulco armato.

B. ead. spatio interjecto punctato, thorace lævi, ubique æquali.

C. ead. spatio interjecto punctato, thorace lævi, punctis duobus impressis.

D. ead. spatio interjecto punctis latis inæqualibus, thorace lævi.

Loc. Habitat putrefacta animalium cadavera.

2. P. ſcabra. Silpha opaca Linn.

Le Bouclier noir à corcelet raboteux.

Long. 5, 6 lig. Larg. 2, 5 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis, ſpatio interjecto minutiſſime punctato, thorace ſcabro.

Loc. Habitat cadavera, rarior.

3. P. gibboſa. Necrodes littoralis

Le Bouclier à boſſes.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis, primâ & ſecundâ gibboſitate connexis, thorace lævi.

Loc. Habitat cadavera.

4. P. complicata. Silpha rugosa Linn.

Le Bouclier noir chiffoné à corcelet raboteux.

Long. 5 ½ lig. Larg. 2 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis acutis, ſpatio interjecto veluti complicato, thorace ſcabro.

Loc. Habitat cadavera.

5. P. inæqualis. Silpha obscura Linn. vulgaris Schrank
Silpha atrata Linn. volgens Vill.
Le Bouclier noir chiffonné à corcelet lisse.

Long. 1 lig. Larg. 2 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis acutis, spatio interjecto veluti complicato, thorace lævi.

Loc. Habitat cadavera.

6. P. thoracica. Silpha id. Linn.
Le Bouclier à corcelet jaune.

Long. 6 lig. Larg. 2 ½ lig.

P. nigra, lineis tribus elevatis acutis, thorace ferrugineo.

Loc. Habitat cadavera.

7. P. maculata. Silpha 4 punct. Linn.
Le Bouclier jaune à taches noires.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

P. nigra, thorace elytrisque testaceis, thoracis maculâ coleoptrorumque punctis quinque nigris.

Loc. Habitat cadavera, rarior.

8. P. excavata. Silpha Canaliculata 3
La Goutiere.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

P. nigra tota, elytris lævibus, punctis minimis excavatis.

Loc. Habitat ligna humida.

9. P. testacea. Scyda pedemontana F.

Le Bouclier fauve.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

P. tota testacea.

Loc.

10. P. villosa.

Le Bouclier brun velouté.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. nigro-fusca subvillosa.

Loc. Habitat arenam.

XI. CUCUJUS. *Le Richard.*

Antennæ serratæ breves.

Thorax subtus nudus.

Caput dimidium intra thoracem crassum.

1. C. chrysostygma.

Le Richard à fossettes.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

C. aureus, elytrorum fossulis quatuor impressis nitentibus.

Loc. Habitat excelsas arbores; frequenter in insula lutetiana *Louvier* dicta reperitur, ad quam cum ligno advehitur, ex sylvis.

2. C. 8-guttatus.

Le Richard à points blancs.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. viridi-æneus, punctis quatuor impressis albis.

Loc. Idem.

3. C. rusticus.

Le Richard doré à stries.

Long. 7 lig. Larg. 1 lig.

C. viridi-auratus, oblongus, thorace punctato, elytris striatis.

Loc. Habitat arbusta sepium.

4. C. rubinus.

Le Richard rubis.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. æneus, elytris fuscis, thorace rubro fasciis fuscis.

Loc. Habitat rosas.

5. C. viridis.

Le Richard vert allongé.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. viridi-cupreus, lævi oblongus.

Loc. Habitat arbores ſepium.

6. C. minutus.

Le Richard triangulaire ondé.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. fuſco-cupreus, triangularis, faſciis undulatis villoſo albidis.

Loc. Idem.

* 7. C. ater.

Le Richard noir allonge.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. niger oblongus, punctatus, elytris ſtriatis.

Loc.

* 8. C. dentatus.

Le Richard noir chagriné.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. niger thorace punctato, poſtice dentato, elytris ſulcatis.

Loc. Habitat inſulas Sequanæ propè locum dictum *le Gros Caillou.*

XII. ELATER. *Le Taupin.*

Antennæ ſerratæ vel filiformes intra capitis cavitatem ſubtus receptæ.
Thorax ſubtus aculeo intra cavitatem abdominis recepto.

1. E. ruber.
Le Taupin rouge.
Long. 8 lig. Larg. 3 lig.
E. thorace elytriſque rubris.
Loc. Habitat carioſas ſalices.

2. E. ſanguineus.
Le Taupin à étuis rouges.
Long. 5 lig. Larg. 1 ½ lig.
E. niger, elytris rubris.
Loc. Habitat cortices arborum.

3. E. flaveſcens.
Le Taupin à étuis jaunes & corcelet liſſe.
Long. 5 lig. Larg. ½ lig.
E. niger, elytris flavis.

Varietas A. niger, elytris omnino flavis.
B. niger, elytris flavis apice nigris.

C. niger, elytris testaceo-fuscis.

Loc. Habitat vetustas arbores.

4. E. castaneus.

Le Taupin à corcelet velouté.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

E. thorace villoso, elytris testaceis apice nigris.

Varietas A. thorace villoso, elytris flavescentibus apice nigris.

B. thorace villoso, elytris rubescentibus apice nigris.

Loc. Idem.

5. E. ruficollis.

Le Taupin noir à corcelet rouge.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

E. niger, thorace rubro.

Loc.

6. E. cruciatus.

Le Taupin porte-croix.

Larg. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

E. thorace nigro, circulo rubro, elytris fulvis, cruce-nigra.

Loc.

7. E. pectinicornis.

Le Taupin brun cuivreux.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

E. fusco-viridi-æneus.

Loc. Habitat gramina.

8. E. niger.

Le Taupin brun nébuleux.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

E. nigro-fuscus, cinereo-nebulosus.

Loc. Habitat messes.

9. E. tessellatus.

Le Taupin à plaques velues.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

E. niger, villoso undulatus.

Loc. Habitat agros.

10. E. murinus.

Le Taupin gris de souris.

Long. 4, 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

E. niger, elytris villoso-murinis.

Loc.

11. E. balteatus.

Le Taupin bedeau.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

E. niger, elytris fuſcis, ſingulo faſciâ longitudinali fulvâ.

Loc. Habitat arva.

12. E. obſcurus.

Le Taupin noir à étuis bruns.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

E. niger, elytris fuſcis.

Loc. Idem.

13. E. ater.

Le Taupin en deuil.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

E. totus niger nitidus.

Loc. Idem.

14. E. rufipes.

Le Taupin noir à pattes fauves.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

E. niger pedibus rufis.

Loc. Habitat cortices.

15. E. bimaculatus.

Le Taupin noir à taches rouges.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

E. niger elytrorum basi maculis rubris.
Loc. Habitat cortices.

16. E. clavicornis.
Le Taupin à antennes en masse.
Long. 1 lig. Larg. ½ lig.
E. fuscus, antennis serrato-clavatis.
Loc. Habitat sylvas.

* 17. E. rachifer.
Le Taupin à bandes.
Long. 1 ½ lig. Larg. ½ lig.
E. niger, elytris fulvis, rachi nigra.
Loc.

* 18. E. melanophtalmos.
Le Taupin fauve aux yeux noirs.
Long. 3 ½ lig. Larg. 1 lig.
E. fuscus, oculis nigris.
Loc.

* 19. E. fuscus.
Le Taupin brunet.
Long. 4 lig. Larg. 1 ½ lig.
E. totus fuscus, thorace punctato, elytris striatis.
Loc.

* 20. E. villosus.

Le Taupin brun velouté.

Long. 9 lig. Larg. 2 lig.

E. fulvus vellere levi fasciatim conspersus.

Loc.

XIII. BUPRESTIS. *Le Bupreste.*

Antennæ filiformes.

Trochanter magnus seu appendix ad basim femorum posteriorum.

FAMIL. I. *thorace cordato capite latiore elytris angustiore.*

1. B. coriaceus.

Le Bupreste noir chagriné.

Long. 14 lig. Larg. 6 lig.

B. ater, elytris rugosis.

Loc. Habitat humida hortorum loca.

2. B. nitens.

Le Bupreste doré & sillonné à larges bandes.

Long. 11 lig. Larg. 4 lig.

B. viridis, elytris obtuse sulcatis, non

punctatis, pedibus antennisque ferrugineis.

Loc. Habitat frequentissimè hortos & agros.

3. B. granulatus.

Le Bupreste galonné.

Long. 11 lig. Larg. 5 lig.

B. niger, elytris æneis convexe punctatis striatisque.

Varietas A. totus violaceus, elytris convexe punctatis striatisque.

Loc. Idem. rarior.

4. B. purpurascens.

Le Bupreste azuré.

Long. lig. Larg. lig.

B. totus nigro-violaceus, elytris dense striatis.

Varietas A. Elytro singulo striis XVI, oris aureo-cupreis.

B. Elytro singulo striis XVI, tribus interruptis.

C. Elytro singulo striis XXII, tribus interruptis.

Loc. Habitat hortos humidos.

5. B. ſycophanta.

Le Bupreſte quarré couleur d'or.

Long. 7 lig. Larg. 3 lig.

B. nigro-violeſcens, elytris latis æneis è viridi purpureis, ſingulo ſtriis ſexdecim.

Loc. Habitat ilicem, ubi papilionum larvas devorat.

6. B. antiquus.

Le Bupreſte quarré couleur de bronze antique.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

B. totus è fuſco-viridi cupreus, elytris latis, ſingulo ſtriis ſexdecim.

Loc. Idem.

7. B. leucophtalmos.

Le Bupreſte tout noir.

Long. 8 lig. Larg. 3 $\frac{3}{4}$ lig.

B. ater, elytro ſingulo ſtriis octo lævibus, pedibus nigris.

Loc. Idem.

* 8. B. longicornis.

Le Bupreſte luiſant.

Long. 10 lig. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

B. ater, elytro ſingulo ſtriis octo lævi-

bus vix impressis pedibus nigris, antennis fuscis, thorace duplo longioribus.

Loc. Idem.

9. B. rufipes.

Le Bupreste noir à pattes rougeâtres.

Long. 4, 5 lig. Larg. 2 lig.

B. niger, elytro singulo striis octo punctatis, pedibus ferrugineis.

Loc. Idem.

10. B. flavipes.

Le Bupreste noir à pattes jaunes.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. niger, elytro singulo striis octo lævibus, pedibus lividis.

Loc. Idem.

11. B. vinearum.

Le Bupreste à six points enfoncés.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

B. nigro-viridis, elytro singulo striis octo punctis tribus impressis.

Loc. Habitat vites.

12. B. agrorum.

Le Bupreste vert pointillé à huit stries & pattes fauves.

Long. 4 lig. Larg. 1 ½ lig.

B. viridis punctatus, elytro singulo striis octo, pedibus pallidis.

Loc. Habitat agros.

13. B. lucorum.

Le Bupreste vert lisse, à huit stries & pattes fauves.

B. viridis nitens; elytro singulo striis octo, pedibus pallidis, punctis tribus impressis.

Loc. Habitat sylvas aridas.

14. B. bicolor.

Le Bupreste à étuis verts & bruns.

Long. 3 lig. Larg. 1 ½ lig.

B. viridis, elytro singulo striis octo, pedibus elytrorumque anticâ parte & margine fulvis.

Loc. Habitat arenam.

15. B. 6-punctatus.

Le Bupreste à étuis cuivreux.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

B. nitens, capite thoraceque viridi, elytris cupreis punctulis duodecim.

Loc. Habitat arenam, propè rivulos.

16. B. thoracicus.

Le Bupreste à corcelet cuivreux.

Long.

B. nitens, capite elytrisque viridibus, thorace cupreo, punctis duodecim.

Loc. Idem.

17. B. cyano-cephalus.

Le Bupreste bleu à corcelet rouge.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. capite elytrisque cæruleis, thorace rubro.

Loc. Idem.

18. B. equestris.

Le Chevalier noir.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

B. niger, thorace atro, elytris rubris cruce nigrâ.

Loc. In loco dicto *Fontainebleau* frequens.

19. B. crux major.

Le Chevalier rouge.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

B. niger, thorace pedibusque rubris elytris rubris, cruce nigra.

Loc.

20. B. crepitans.

Le Bupreste à tête, corcelet & pattes rouges & étuis bleus.

Long.

B. capite, thorace, pedibusque rubris, elytris cæruleo-nigris.

Loc. Habitat humum umbrosum, sub lapidibus.

21. B. ustulatus.

Le Bupreste quadrille à corcelet rond & étuis striés.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{2}$, 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$, 1 lig.

B. niger, thorace ovato, nigro, elytris striatis maculis quatuor lividis.

Loc. Habitat rivorum ripas.

22. B. 4-maculatus.

Le Bupreste quadrille à corcelet plat & étuis lisses.

Long. idem. Larg. idem.

B. niger, thorace plano ferrugineo, elytris lævibus, maculis quatuor lividis.

Loc. Idem.

23. B. crucifer.

Le Bupreste quadrille à corcelet plat, brun & étuis striés.

Long. idem. Larg. idem.

B. niger, thorace plano ferrugineo, elytris striatis, maculis quatuor lividis.

Loc. Idem.

24. B. quadrifer.

Le Bupreste quadrille à corcelet plat & noir & étuis striés.

B. niger, thorace plano nigro, elytris striatis, maculis quatuor lividis.

Loc. Idem.

25. B. octo-maculatus.

Le Bupreste noir à huit taches fauves.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. niger, elytris striatis, maculis octo lividis.

Loc. Habitat arenam.

26. B. fulvus.

Le Bupreſte fauve à tête noire.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. teſtaceus, capite nigro.

Loc. Idem.

27. B. minutus.

Le Bupreſte noir ſans ſtries.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

B. totus niger, lævis.

Loc. Habitat arenam.

FAMIL. II. *Thorace capite elytriſque anguſtiore.*

28. B. campeſtris.

Le Velours vert à 12 points blancs.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

B. inauratus, ſupra viridis, coleoptris punctis duodecim albis.

Loc. Habitat loca ſicca, arenam.

29. B. epiſcopalis. Carabus coeruleſcens (Linn) olim Enc.

Le Bupreſte épiſcopal.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

B.

B. totus violaceus, pedibus antennisque fuscis.

Loc. Idem.

30. B. fasciatus.

Le Bupreste à broderie blanche.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

B. inauratus, supra fusco-viridis, coleoptris fasciis sex undulatis albis.

Loc. Idem.

* 31. B. suturatus.

Le Bupreste à bandes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. niger; elytris striatis, coleoptrorum anticâ parte suturâque lividis.

Loc.

32. B. germanicus.

Le Bupreste vert à 6 points blancs.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

B. inauratus, supra fusco-viridis, coleoptris punctis sex albis.

Loc. Habitat arenam, prope rivulos.

* 33. B. marginatus.

Le Bupreste bordé.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

B. fulvus, oculis nigris; elytris nigris, postice fulvis.

Loc.

34. B. riparius.

Le Bupreste à mamelons.

Long. 2 $\frac{1}{2}$, 3 lig. Larg. 1 lig.

B. viridi-æneus, elytris punctis latis excavatis mammillosis.

Loc. Habitat arenam humidam.

* 35. B. scapularis.

Cymindis? *Le Bupreste taché à corcele rouge.*

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

B. testaceus, capite nigro: elytris striatis nigris utrinque maculâ antice fulvâ.

Loc.

36. B. aquaticus.

Le Bupreste à tête cannelée.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

B. fusco-æneus, capite profunde striato, elytrorum striâ primâ remotissimâ.

Loc. Habitat arenam humidam.

37. B. contractus.

Le Bupreste levrier.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. niger, elytris fulvis ſtriatis, femoribus latis, pedibus valde ſpinoſis.

Loc.

38. B. impreſſus.

Le Bupreſte à 4 points enfoncés.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$, 1 lig.

B. cupreo viridique variegatus, punctis quatuor impreſſis, pedibuſque pallidis.

Loc. Habitat arenam prope rivulos.

* 39. B. lunulatus.

Le Bupreſte à lunules.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg.

B. niger, elytris ſtriato punctatis; poſtice maculis duabus, & apice flavis.

Loc.

40. B. ſtagnorum. Geoffr. n. 33. Elaphrus littoralis Oliv.

Le Bupreſte bronzé à 2 points enfoncés.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

B. fuſco-æneus elytris ſtriatis, punctis duobus impreſſis.

Loc. Habitat arenam humidam, rarior.

* 41. B. foveatus.

Le Bupreſte ſtrié à 4 points enfoncés.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. totus niger, elytris ſtriatis, punctis quatuor impreſſis.

Loc.

FAM. III. *Thorace capite latiore, elytrorum latitudine.*

42. B. piger.

Le Bupreſte pareſſeux.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

B. ater, thorace lato, elytrorum ſtriis punctatis.

Loc. Habitat ſiccam arenam.

* 43. B. capitatus.

Le Bupreſte brun à tête noire.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. totus fuſcus, capite nigro.

Loc.

44. B. viridulus.

Le Bupreſte verdet.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

B. totus viridis, thorace lato.

Loc.

* 45. B. maxillosus.

Le Quadrille à mâchoires brunes.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

B. niger maxillis thoraceque ferrugineis: elytris striatis, maculis quatuor luteis.

Loc.

46. B. vulgaris.

Le Bupreste rosette.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

B. infra niger, supra nigro-æneus, thorace lato.

Loc. Habitat arenam.

* 47. B. plateosus. Carabus lunatus (F.) Olid. Encycl.

Le Bupreste à plaques.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. capite cœruleo-nitido, thorace fulvo; elytris luteis striatis maculis sex atris.

Loc.

48. B. luctuosus.

Le Bupreste en deuil.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

B. totus niger, thorace lato lævi, elytrorum ſtriis lævibus.

Loc. Habitat humum ſub lapidibus.

* 49. B. fumoſus.

Le Bupreſte noir à pattes brunes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. totus niger, elytris ſtriatis, pedibus fuſcis.

Loc.

50. B. ſericeus.

Le Bupreſte noir velouté.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

B. ater ſubvilloſus, antennis pedibuſque ferrugineis.

Loc. Habitat agros.

51. B. æruginoſus.

Le Bupreſte cuivreux à pattes brunes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

B. totus nigro-auratus, elytris ſtriatis, pedibus fuſcis.

Loc.

52. B. leporinus.

Le Bupreste noir à pattes brunes.

B. ater, lævis, pedibus antennarumque basi ferrugineis.

Loc.

* 53. B. connexus. Carabus id. Olir. Encycl. V.

Le Bupreste à suture.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

B. niger, pedibus fulvis : elytris fulvis suturâ margineque postico nigris.

Loc.

54. B. psittaceus.

Le Bupreste perroquet.

Long. 5, 3 lig. Larg. 2, 1 lig.

B. totus viridi cupreus, antennis nigris.

Loc. Habitat agros & hortos, frequentissimus.

55. B. variegatus.

Le Bupreste vert à bordure.

Long. 4 ½ lig. Larg. 2 lig.

B. viridis, pedibus elytrorumque margine exteriore pallide testaceis.

Loc. Habitat agros.

56. B. melanocephalus.

Le Bupreste noir à corcelet rouge.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

B. niger, thorace, antennis pedibusque ferrugineis.

Loc. Habitat agros.

57. B. rubescens.

Le Bupreste fauve.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

B. ferrugineo-lividus, elytris punctato-striatis.

Loc.

* 58. B. rosaceus.

Le Bupreste rouget.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. niger lævis, thorace antennis pedibusque rubris.

Loc.

* 59. B. rusticus.

Le Bupreste brunet.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. niger punctatus, thorace capite antennis pedibusque fuscis.

Loc.

*60. B. humeralis.

Le Bupreste à nœud d'épaule.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. niger striatus, pedibus pallidis, elytrorum basi maculâ flavâ.

Loc.

XIV. BRUCHUS. *LA BRUCHE.*

Antennæ filiformes.
Thorax subrotundus gibbus.
Corpus sphæroidæum, dorso convexo.

1. B. fur.

La Bruche à bandes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. testaceus, elytrorum fasciâ duplici albidâ.

Loc. Habitat herbaria, plantas siccas devorat.

2. B. apterus.

La Bruche sans aîles.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

B. totus testaceus, elytris coadunatis.

Loc. Habitat plantas siccas.

* 3. B. cruciatus. Ptinus imperialis Lin.
La Bruche à croix de S. André. Inc.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig.
B. fuſcus ſubvilloſus, ſcutello albo, elytris cruce divaricatâ albidâ.
Loc.

XV. LAMPYRIS. *LE VER-LUISANT.*

Antennæ filiformes.
Caput clypeo thoracis marginato tectum.
Abdominis latera plicato-papilloſa.

1. L. nocticula.
Le Ver-luiſant à femelle ſans aîles.
Le mâle. Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.
La femelle. Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.
L. fæminâ apterâ.
Loc. Fæmina abdomine nudo campos habitat, mas in hortis volitat per noctem.

2. L. hemiptera.
Le Ver-luiſant à demi-fourreaux.
Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.
L. hemiptera.
Loc. Idem.

3. L. sanguinea.

Le Ver-luisant rouge.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

L. elytris rubris, thorace rubro, nigrâ maculâ.

Loc. Idem.

XVI. CICINDELA. *LA CICINDELE.*

Antennæ fili formes.
Thorax planus, marginatus.
Caput detectum.
Elytra flexilia.

1. C. fusca.

La Cicindele noire à corcelet maculé.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. elytris nigricantibus thorace rubro, nigrâ maculâ.

Loc. Habitat flores.

2. C. livida.

La Cicindele à corcelet rouge.

Long. 5, 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. thorace rubro immaculato, genubus posticis nigris.

Varietas A. elytris testaceis, thorace rubro immaculato, genubus posticis nigris.

B. elytris nigricantibus, thorace rubro immaculato, genubus posticis nigris.

Loc. Habitat flores.

3. C. nigra.

La petite Cicindele noire.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. elytris nigricantibus, thorace rubro immaculato, genubus omnibus rubris.

Loc. Idem.

4. C. pallida.

La petite Cicindele pâle.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. elytris testaceis, thorace rubro immaculato, genubus omnibus rubris.

Loc. Idem.

5. C. maculata.

La Cicindele à étuis tachés de noir.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. rubra, elytris testaceis, apice nigris.
Loc. Habitat flores.

6. C. lutescens.
La Cicindele noire à étuis jaunes.
Long. 2 ; 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.
C. nigra, elytris pedibusque pallidis.

Varietas A. nigra, thorace omnino nigro, elytris pedibusque pallidis.
B. nigra, thoracis margine flavo, elytris pedibusque pallidis.

Loc. Idem.

7. C. ænea.
La Cicindele bedeau.
Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.
C. viridi-ænea, elytris extrorsum rubris.
Loc. Idem.

8. C. bipustulata.
La Cicindele verte à points rouges.
Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.
C. æneo-viridis, elytris apice rubris.
Loc. Habitat flores.

9. C. elegans.

La Cicindele verte à points jaunes.

C. æneo-viridis, elytris apice flavis.

Varietas A. tota æneo-viridis, elytris apice flavis.

B. cœruleo-viridis, thoracis margine rubro, elytris apice flavis.

Loc. Habitat flores.

10. C. minima.

La Cicindele noire à points jaunes & corcelet rouge.

Long. 1 ½ lig. Larg. ½ lig.

C. fusca, elytris apice flavis, thorace rubro nigrâ maculâ.

Loc. Idem.

11. C. biguttata.

La Cicindele noire à points jaunes & corcelet noir.

C. fusca, elytris apice flavis, thorace fusco.

Loc. Idem.

12. C. fasciata.
La Cicindele à bandes rouges.

C. elytris nigris, fasciis duabus rubris.
Loc. Habitat flores.

13. C. thoracica.
La Cicindele verte à corcelet rouge.
Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.
C. viridis, thorace rubro immaculato.
Loc. Idem.

14. C. viridi-cœrulea.
La Cicindele verdâtre.
Long. 3 lig. Larg. 1 lig.
C. viridi-cœrulea.

Varietas A. viridis.
B. cœrulea.
C. viridi-cœrulea.
Loc. Idem.

15. C. plumbea.
La Cicindele plombée.
Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.
C. plumbeo-nigra.
Loc. Idem.

16. C. cinerea.

La Cicindele cendrée.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. villoso-cinerea.

Loc. Habitat flores.

17. C. rotundata.

La Cicindele bronzée.

Long. 1 lig.

C. plumbeo-cuprea, tibiis pallidis, abdomine subrotundo.

Loc. Idem.

XVII. OMALISUS. *L'OMALISE.*

Antennæ filiformes.

Thorax planus tetragonus, angulis posterioribus in spinam productis.

1. O. fontis bellaquæi.

L'Omalise.

Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. 1 lig.

Loc. Habitat fontem bellaquæum.

XVIII. HYDROPHILUS, *L'HYDROPHILE.*

Antennæ clavatæ perfoliatæ antennulis breviores.
Pedes natatorii.

1. H. picæus.
Le grand Hydrophile.
Long. 17 lig. Larg. 9 lig.
H. niger, elytris sulcatis, antennis fuscis.
Loc. Habitat rivulos & stagna.

2. H. caraboides.
L'Hydrophile noir picoté.
Long. 7 lig. Larg. 3 lig.
H. niger, elytrorum punctis per strias digestis, antennis nigris.
Loc. Habitat aquas.

3. H. punctatus.
L'Hydrophile lisse à points.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig.
H. niger, elytris lævibus dense punctatis.
Loc. Idem.

4. H. fuſcipes.

L'Hydrophile noir ſtrié.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

H. niger, elytris ſtriatis, pedibus fuſcis.

Loc. Habitat aquas.

5. H. fulvus.

L'Hydrophile fauve.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

H. fulvus.

Loc. Idem.

XIX. DYTICUS. *Le Ditique.*

Antennæ filiformes, capite longiores.

Pedes natatorii.

1. D. ſtagnalis.

Le Ditique brun à bordure.

Long. 8 lig. Larg. 4 lig.

D. fuſcus, margine coleoptrorum thoraciſque flavo.

Loc. Habitat ſtagnantes aquas.

2. D. marginalis.

Le Ditique noir à bordure.

Long. 1 pouce. Larg. 6 lig.

D. niger, margine coleoptrorum thoraciſque flavo.

Loc. Habitat ſtagna.

3. D. ſemiſtriatus.

Le Ditique demi-ſilloné.

Long. 14 lig. Larg. 7 lig.

D. elytris ſtriis viginti dimidiatis.

Loc. Habitat aquas.

4. D. cinereus.

Le Ditique à corcelet à bandes.

Long. 7 lig. Larg. 4 lig.

D. cinereus, margine coleoptrorum flavo, thoracis medietate flavâ.

Loc. Habitat ſtagna.

5. D. ſulcatus.

Le Ditique ſillonné.

Long. 6 lig. Larg. 4 lig.

D. elytris ſulcis decem longitudinalibus, thoracis medietate flavâ.

Loc. Idem.

6. D. luctuoſus.

Le Ditique en deuil.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

D. totus niger lævis.

Loc. Idem.

7. D. tesselatus.

Le Ditique fauve à taches noires.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

D. fulvus, maculis sparsis nigris.

Loc. Habitat aquam.

8. D. variegatus.

Le Ditique à bordure panachée.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. fuscus, elytris antice & externe flavis.

Loc. Idem.

9. D. lividus.

Le Ditique noir à étuis bruns.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. ater, elytris fuscis.

Loc. Idem.

10. D. ovatus.

Le Ditique sphérique.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

D. ovatus fuscus, capite thoraceque rubicundis.

Loc. Idem.

11. D. melanophtalmos.

Le Ditique aux yeux noirs.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. flavo-fuscus, oculis nigris, elytris lævibus.

Lo. Habitat aquas stagnantes.

12. D. thoracicus.

Le Ditique strié à corcelet jaune.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. cinereus, capitre nigro, thorace luteo, elytris nigro-maculatis punctato-striatis.

Loc. Habitat stagna.

13. D. quadratus.

Le Ditique panaché sans stries.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

D. niger, thorace flavo, elytris lævibus, maculis limboque luteis.

Loc. Idem.

14. D. monostriatus.

Le Ditique à une seule strie.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

D. niger, elytris maculis & limbo luteis, striâ unicâ.

Loc. Idem.

15. D. clavi-cornis.

Le Ditique à grosses antennes.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. fuscus, capite thoraceque fulvo, antennis subclavatis, scutello nullo.

Loc. Habitat aquas stagnantes.

* 16. D. hebraicus.

Le Ditique hébraique.

Long. 3 ½ lig. Larg. 2 lig.

D. niger, capite thoraceque antice flavis, elytris lævibus, maculis aliquot luteis, nonnullis connexis.

Loc. Habitat stagna.

* 17. D. punctatus.

Le Ditique picoté.

Long. 5 lig. Larg. 2 ½ lig.

D. thorace flavo maculâ nigrâ, elytris fuscis punctis nigris confertis.

Loc. Habitat aquas.

* 18. D. marmoratus.

Le Ditique marbré.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. fusco-pallidus, elytris externe maculis obliquis lineisque albidis.

Loc. Habitat rivulos & stagna.

XX. GYRINUS. *Le Tourniquet.*

Antennæ rigidæ, capite breviores.
Pedes natatorii.
Oculi quatuor.

1. C. natator.

Le Tourniquet.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

Loc. Habitat aquarum superficiem quam per orbes concentricos vivacissime peragrat.

ORDO SECUNDUS.

Caract. Ordinis II.

Tarsorum articuli quatuor.

XXI. MELOLONTHA. *La Melolonte.*

Antennæ serratæ ante oculos positæ.

1. M. quadri-punctata.

La Melolonte quadrille à corcelet noir.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

M. coleoptris rubris, maculis quatuor nigris, thorace nigro.

Loc. Habitat pruni ſylveſtris folia.

2. M. rubra.

La Melolonte quadrille à corcelet rouge.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

M. coleoptris rubris, maculis quatuor nigris, thorace rubro nigrâ maculâ.

Loc. Habitat prunum ſylveſtrem.

3. M. pallida.

La Melolonte liſette.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

M. nigro-viridis, elytris luteo-pallidis.

Loc. Habitat ſylvas.

4. M. cœrulea.

La Melolonte bleuette.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. cœrulea, thorace pedibuſque ferrugineis.

Loc. Idem.

5. M. muſcoides.

La Melolonte mouche.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. 1 lig.

M.

M. viridi cœruleo, thorace rubro cœruleâ maculâ, tibiis ferrugineis.

Loc. Habitat ſylvas.

6. M. cuprea.

La Melolonte cuivreuſe.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. oblonga nigro-cuprea, ſubvilloſa elytris punctatis.

Loc. Idem.

XXII. PRIONUS. *LE PRIONE.*

Antennæ ſerratæ in oculo poſitæ.

1. P. coriarius.

Le Prione.

Long. 15 lig. Larg. 9 lig.

Loc. Habitat ſylvas, larva arborum truncos.

XXIII. CERAMBYX. *LE CAPRICORNE.*

Antennæ à baſi ad apicem decreſcentes, in oculo poſitæ.

Thorax aculeatus.

1. C. cerdo.

Le grand Capricorne noir.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ pouce. Larg. 6 lig.

C. fuſco-niger, elytris rugoſis, apice

interiore ſpinoſis, antennis corpore longioribus.

Loc. Larva truncos arborum habitat; cerambix ſylvas.

2. C. piceus.

Le petit Capricorne noir.

Long. 9 lig. Larg. 3 ½ lig.

C. ater, elytris rugoſis integris, antennis corpore longioribus.

Loc. Idem.

3. C. textor.

Le Capricorne noir chagriné.

Long. 1 pouce. Larg. 5 lig.

C. ater, elytris punctis elevatis, antennis corpore brevioribus.

Loc. Idem.

4. C. alpinus.

La Roſalie.

Long. 15 lig. Larg. 4 lig.

C. cinereo-cœruleſcens, elytrorum maculis ſex fuſcis.

Loc. Habitat exeſos arborum truncos.

5. C. moſchatus.

Le Capricorne vert à odeur de roſe.

Long. 1 pouce. Larg. 3 ½ lig.

C. viridi-cœrulescens.

Loc. Habitat truncos & folia salicis.

6. C. ruber.

Le Capricorne rouge.

Long. 8 lig. Larg. 2 $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger, elytris thoracisque lateribus rubris.

Loc. Habitat truncos arborum.

7. C. monilis.

Le Capricorne noir marbré de gris.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. niger, elytris vellere cinereo marmoratis, antennis pedibusque cinereo intersectis.

Loc. Habitat salices.

8. C. fasciatus.

Le Capricorne ovale cendré.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. ater ovatus, antennis corpore dimidio brevioribus, elytris vellere cinereo albidis.

Varietas A. elytris fuscis vellere cinereo fasciatis.

Loc. Habitat sepium arbusta.

9. C. hiſpidus.

Le Capricorne à étuis dentelés.

Long. 3 lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. ovatus, fuſcus, elytris antice cinereis, apice bidentatis.

Loc. Habitat pratorum gramina.

10. C. ovatus.

Le Capricorne brun de forme ovale.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. ovatus fuſcus, elytris integris.

Loc. Idem.

11. C. compreſſus. Cucujus flavipes (F.) Oliv. Enc. VI.

Le Capricorne applati.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger, compreſſus, ſcaber, thorace utrinque ſerrato, pedibus fulvis.

Loc.

* 12. C. dentatus.

Le Capricorne à pointes.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. fuſco-nebuloſus, elytris antice cinereis, apice unidentatis.

Loc.

13. C. nebulosus.

Le Capricorne nébuleux.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. fusco-nebulosus, elytris antice thoracisque medio subcinereis, & lytris integris.

Loc.

XXIV. LEPTURA. *LA LEPTURE.*

Antennæ à basi ad apicem decrescentes, in oculo positæ.

Thorax inermis.

FAMIL. I. *Thorace cylindraceo.*

1. L. carcharias.

La Lepture chagrinée.

Long. 1 pouce. Larg. 4 lig.

L. cinerea, nigro-punctata, thorace cylindraceo.

Loc. Habitat truncos arborum.

2. L. subcœrulea.

La Lepture ardoisée.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

L. tota cœruleo-atra, capite thoraceque subvilloso.

Loc. Habitat flores.

3. L. betulina.

La Lepture à corcelet cylindrique & taches jaunes.

Long. 4, 5, 6 lig. Larg. 1, 1 ½ lig.

L. nigra, thoracis lineis tribus, elytrorumque maculis villoso-flavis, thorace cylindraceo, antennis corpus æquantibus.

Loc. Habitat betulam.

4. L. pilosa.

La Lepture noire à étuis jaunes.

Long. 2 lig. Larg. ½ lig.

L. nigra; elytris flavis, apice nigris.

Loc. Habitat hortos.

5. L. oculata.

La Lepture aux yeux de Paon.

Long. 5 lig. Larg. 2 ½ lig.

L. nigro-cinerea, thorace elytrisque maculis oculiferis atris, circulo cinereo, thorace subcylindraceo.

Loc. Habitat hortos, rara, in horto regio inventa.

* 6. L. nebulosa.

La Lepture nébuleuse.

Long. 6 lig, Larg. 2 ½ lig.

L. fusca, subvillosa, maculis cinereis marmorata.

Loc.

7. L. ferruginea.

La Lepture rouillée.

Long. 17 lig. Larg. 5 lig.

L. tota nigro-ferruginea, thorace subcylindraceo.

Loc. Habitat sylvas.

* 8. L. fulvipes.

La Lepture à pattes fauves.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

L. atra, punctata, pedibus flavis, thorace cylindraceo.

Loc. Habitat agros fontis-Bellaquæi.

FAMIL. II. *Thorace globoso.*

9. L. variegata.

La Lepture à corcelet rond & taches jaunes.

Long. 6 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

L. nigra, maculis villoso-flavis, thorace globoso, antennis corporis dimidio brevioribus.

Loc. Habitat hortos.

10. L. villosa.

La Lepture velours jaune.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

L. nigra, villoso-flava, maculis duabus in elytro singulo giabris nigris.

Loc. Habitat flores.

11. L. punctata.

La Lepture à corcelet rouge ponctué.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

L. nigricans, capite thoraceque rubro; punctis nigris.

Loc. Habitat hortos.

12. L. arcuata.

La Lepture aux croissans dorés.

Long. 5, 6, 8 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig.

L. nigra, elytrorum lineis quatuor arcuatis, punctisque flavis, pedibus testaceis.

Loc. Habitat arborum truncos.

13. L. arietis.

La Lepture à trois bandes dorées.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

L. nigra, elytrorum lineis tribus transver

ſis punctiſque flavis, pedibus teſtaceis.

Loc. Habitat flores.

14. L. ruſtica.

La Lepture à raies blanches.

Long. 2 $\frac{1}{2}$, 4 lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. nigra, elytrorum lineis tranſverſis punctiſque albis.

Loc. Habitat umbelliferarum flores.

15. L. ſignata.

La Lepture noire à étuis gris tachés de jaune.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

L. nigra, elytris pallido-fuſcis, ſignaturis flavis.

Loc. Habitat flores.

16. L. gammoides.

La Lepture jaune à bandes noires.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

L. villoſo-flava, elytris lineis tribus tranſverſis nigris.

Loc. Idem.

17. L. myſtica.

La Lepture arlequine.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

L. nigra, elytris maculis testaceis, nigris, albidis, lineisque nigris & albicantibus variegatis.

Loc. Rar. hab. hortos, in regio horto inventa.

18. L. cyanea.

La Lepture bleue.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

L. cœrulea, tribus rufis thorace subgloboso.

Loc. Habitat arborum truncos.

FAMIL. III. *Thorace inæquali scabro.*

19. L. quadri-punctata.

La Lepture brune à corcelet rhomboïdal.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

L. testaceo-fusca, thorace rhomboidali villoso, elytrorum maculis quatuor albidis transversim positis.

Loc. Habitat arbores.

* 20. L. vidua. Callidium clavipes (F) Oliv. Enc.

La Lepture veuve.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig.

L. tota atra, denſe punctata.

Loc. Habitat arbores.

21. L. teſtacea.

La Lepture livide à corcelet liſſe.

Long. 4 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

L. teſtacea, thorace glabro.

Loc. Habitat flores.

* 22. L. punctuoſa. Callidium femoratum (F) Olivier Encycl. V.

La Lepture maroquinée.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{3}{2}$ lig.

L. atra, denſe punctata, femoribus rufis.

Loc.

23. L. femorata.

La Lepture noire à corcelet rougeâtre.

L. atra, thorace teſtaceo, femoribus craſſis.

Loc. Habitat flores.

* 24. L. turcica.

La Lepture aux croiſſans d'argent.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

L. nigra, elytris antice rufis, poſtice lineis quatuor albis arcuatis.

Loc. Habitat horſos.

25. L. crassipes.

La Lepture noire à grosses cuisses brunes.

L. atra, femoribus crassis rufis.

Loc. Habitat flores.

26. L. fusca.

La Lepture brune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

L. tota fusca punctata.

Loc. Idem.

27. L. sanguinea.

La Lepture veloutée couleur de feu.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

L. nigra, thorace coleoptrisque sericeo-rubris.

Loc. Habitat truncos arborum & frequentissimè loca domorum ubi lignum servatur.

28. L. attenuata.

La Lepture à étuis étranglés.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

L. nigra, elytris pedibusque rubescentibus lividis, coleoptris attenuatis.

Loc. Habitat flores.

XXV. STENOCORUS. *Le Stencore.*

Antennæ à basi ad apicem decrescentes, ante oculos positæ.

Elytra apice angustiora.

FAMIL. I. *Thorax armatus spinâ vel tuberculo laterali.*

1. S. parisinus.

Le Stencore lisse à bandes jaunes.

Long. 8, 9 lig. Larg. 2 ½ lig.

S. glaber, è fusco niger, elytro singulo lineis tribus elevatis, maculis duabus luteis, thorace spinoso.

Loc. Habitat sylvas.

2. S. inquisitor.

Le Stencore noir velouté de jaune.

Long. 6 ½ lig. Larg. 2 lig.

S. niger, vellere flavo variegatus, ely-

tris lineis duabus elevatis, thorace ſpinoſo.

Loc. Habitat flores.

3. S. geniculatus.

Le Stencore à genoux noirs.

Long. 7, 8, 10 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2, 2 $\frac{1}{3}$ lig.

S. è fuſco niger, femoribus rufis articulis nigris.

Loc. Idem.

4. S. rubro-violaceus.

Le Stencore rouge à étuis violets.

Long. 9 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

S. ruber, oculis nigris, elytris violaceis.

Loc. Habitat arbores.

5. S. rubeus.

Le Stencore jaune à bandes noires.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, elytris teſtaceo-flavis, punctis duobus, cruce faſciiſque nigris.

Loc. Habitat rubum.

FAMILIA II. *Thorax inermis.*

6. S. lamed.

Le Stencore bedeau.

S. niger, elytris rubeſcentibus, apice ſuturæque medietate nigris.

Loc.

7. S. melanurus.

Le Stencore noir à étuis rougeâtres.

S. niger, elytris rubeſcentibus lividis, apice nigris. *Mas.*

S. niger, elytris rubeſcentibus lividis, apice ſimili. *Fœmina.*

Loc. Habitat ſepes & arbores.

8. S. luteſcens.

Le Stencore noir à étuis jaunes.

S. niger, elytris luteis, apice nigris.

Loc. Habitat rubum.

9. S. piceus.

Le Stencore noir à ventre rougeâtre.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

S. niger nitidus, abdomine fuſco-rubente.

Loc. Idem.

10. S. clavipes.

Le Stencore noir à cuiſſes rouges.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, femoribus clavatis rufis, apice nigris.

Varietas A. S. totus niger.

Long. 3 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

Loc.

11. S. ſylveſtris.

Le Stencore noir à corcelet rouge.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

S. niger, thorace rubro.

Loc. Habitat urbem *Fontainebleau.*

12. S. aquaticus.

Le Stencore doré.

Long. 2 $\frac{1}{2}$, 3, 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 lig.

S. deauratus, femoribus poſticis dentatis.

Varietas A. Stenocorus rubro-æneus, femoribus poſticis dentatis.

B. Stenocorus viridi-æneus, femoribus poſticis dentatis.

C. Stenocorus flavo-æneus, femoribus poſticis dentatis.

D. Stenocorus violaceo-æneus, femoribus poſticis dentatis.

E. Stenocorus nigro-æneus, femoribus poſticis dentatis.

Loc. Habitat rivulorum ripas, & irides pratorum.

* 13. S. ruber.

Le Stencore rouge.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

S. totus ruber, oculis nigris.

Loc.

* 14. S. ignitus.

Le Stencore noir à étuis rouges.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

S. niger, elytris, ruberrimis dense punctatis.

Loc.

* 15. S. funereus.

Le Stencore en deuil.

Long. 9 lig. Larg. 3 lig.

S. totus niger punctatus.

Loc.

XXVI. LUPERUS. *Le Lupere.*

Antennæ filiformes articulis longis.

Thorax planus, marginatus.

1. L. ulmarius.

Le Lupere noir à corcelet & pattes rouges.

L. niger, thorace pedibusque rufis.
Loc. Habitat ulmum.

2. L. betulinus.
Le Lupere noir à pattes rouges.
Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.
L. niger, pedibus rufis.
Loc. Habitat betulam.

XXVII. CRYPTOCEPHALUS. *Le Gribouri.*

Antennæ filiformes articulis longis.
Thorax gibbus hemisphæricus.

1. C. alni.
Le Gribouri bleu de l'aulne.
Long. 4 lig. Larg. 3 lig.
C. violaceus, punctis inordinatis.
Loc. Habitat alnum.

2. C. vitis.
Le Gribouri de la vigne.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig.
C. niger, elytris rubris.
Loc. Habitat vitis folia.

3. C. ſericeus.

Le Velours vert.

Long. 3, 4 lig. Larg. 2 lig.

C. viridi-auratus ſericeus.

Loc. Habitat ſalicem.

4. C. bolati.

Le Gribouri à deux bandes jaunes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. niger, elytro ſingulo duplici linea longitudinali flava.

Loc. Habitat prata & ſepes.

5. C. 4-maculatus.

Le Gribouri à deux taches jaunes.

C. niger, capite thoraceque antice luteis, elytro ſingulo externè maculâ duplici flavâ.

Loc. Idem.

6. C. bi-punctatus.

Le Gribouri rouge ſtrié à points noirs.

Long. 2 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger, elytris rubris ſtriatis, maculis quatuor limboque nigris.

Loc. Habitat cirſium.

7. C. cirſii.

Le Gribouri rouge ſans ſtries, à points noirs.

C. niger, thorace lineis flavis, elytris rubris punctatis, maculis quatuor limboque nigris.

Loc. Idem.

8. C. violaceus.

Le Gribouri bleu ſtrié.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. cœruleo-violaceus, punctis per ſtrias digeſtis.

Loc.

9. C. cœruleus.

Le Gribouri bleu à points.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. cœruleus, punctis ſparſis, tibiis anticis ferrugineis.

Loc.

10. C. niger.

Le Gribouri noir strié.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. niger striatus, pedibus rufis.

Loc.

11. C. rufipes.

Le Gribouri noir à corcelet rouge.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. niger striatus, thorace pedibusque rufis.

Loc.

12. C. fulvus.

Le Gribouri fauve.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. capite thoraceque fulvo, elytris pallidis.

Loc.

* 13. C. 10-maculatus.

Le Gribouri rouge à 10 taches noires.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger, elytris rubris punctatis maculis decem nigris.

Loc.

* 14. C. limbosus.

Le Gribouri rouge à corcelet jaune.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. thorace flavo maculis nigris; elytris rubris punctatis, maculis sex limboque nigris.

Loc

* 15. C. chermesinus.

Le Gribouri couleur de feu.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger thorace elytrisque rubris punctatis.

Loc.

* 16. C. fuscipes.

Le Gribouri à pattes brunes.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. cœruleus, punctis inordinatis, pedibusque villoso-fuscis.

Loc.

XXVIII. CRIOCERIS. *Le Criocere.*

Antennæ cylindraceæ articulis globosis.
Thorax cylindraceus.

1. C. merdigera.

Le Criocere rouge du lys.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. rubra.

Loc. Habitat lilia.

2. C. 12-punctata.

Le Criocere rouge à points noirs.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. rubra, punctis tredecim nigris.

Loc. Habitat asparagum.

3. C. asparagi.

Le Criocere porte-croix de l'asperge.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. thorace rubro punctis duobus nigris, coleoptris flavis, cruce cœruleo-nigra.

Loc. Idem.

4. C. hordei.

Le Criocere bleu à corcelet rouge.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. cœruleo-viridis thorace femoribusque rufis.

Loc. Habitat hordeum & avenam.

5. C. cyanella.

Le Criocere tout bleu.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. tota cœruleo-viridis.

Loc.

6. C. pallida.

Le Criocere aux yeux noirs.

Long. 2 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 lig.

C. pallida, oculis nigris.

Loc.

* 7. C. ſpinoſiſſima.

La Châtaigne noire.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. tota atra, ſpinis horrida.

Loc. Habitat gramen loliaceum.

* 8. C. thoracica.

Le Criocere noir à corcelet rouge.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. atro-cœrulea, thorace femoribuſque fuſcis, elytris punctis ſparſis.

Loc.

* 9. C. atrata.

Le Criocere noir ſtrié.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C.

C. tota atro-cœrulea ſtriata.
Loc.

* 10. C. paleata.
Le Criocere paillet.
Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.
C. nigra, elytris pedibuſque pallidis.
Loc.

XXIX. ALTICA. *L'ALTISE.*
Antennæ ubique æquales.
Femora poſtica craſſa ſubgloboſa.

1. A. helxines.
L'Altiſe bleue.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig.
A. viridi-cœrulea.
Loc. Habitat hortos.

2. C. malvæ.
L'Altiſe de la mauve.
A. nigra, elytris cœruleis, thorace pedibuſque rubris.
Loc. Habitat folia malvæ.

3. A. bicolor.
L'Altiſe bedaude.
Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. nigra, elytris nigro-æneis ſtriatis, thorace rubro, pedibus nigris.

Loc. Habitat malvam.

4. A. hortenſis.

L'Altiſe noire dorée.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. nigra-ænea, elytris ſtriatis, pedibus ferrugineis.

Loc. Habitat hortos frequentiſſima.

5. A. ovata.

L'Altiſe noire ovale.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. nigro ænea, ovata, pedibus nigris.

Loc. Habitat hortos.

6. A. braſſicæ.

L'Altiſe noire allongée des cruciferes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. nigro-ænea, oblonga, pedibus nigris.

Loc. Habitat cruciferas.

7. A. lævis.

L'Altiſe noire à pattes fauves.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{5}{6}$ lig.

A. nigra, ovata, pedibus rufis, elytris non ſtriatis.

Loc. Habitat hortos.

8. A. minuta.

L'Altiſe noire à jambes jaunes.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. nigra, ſubrotunda, tibiis ferrugineis.

Loc. Idem.

9. A. nemorum.

L'Altiſe à bandes jaunes.

Long. $\frac{1}{2}$, 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ lig.

A. atra, elytris longitudinaliter in medio flaveſcentibus.

Loc. Habitat aromaticas plantas.

10. A. marginata.

L'Altiſe à bordure noire.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. nigra; thorace elytriſque flavis, oris nigris.

Loc. Habitat hortos.

11. A. hyoſciami.

L'Altiſe du choux.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. cœrulea, elytris ſtriatis, tibiis ferrugineis.

Loc. Habitat braſſicam & hyoſciamum.

12. A. cœrulea.

L'Altiſe bleue ſans ſtries.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

A. cœrulea, elytris punctis ſparſis, tibiis ferrugineis.

Loc. Habitat braſſicam.

13. A. nitidula.

L'Altiſe rubis.

Larg. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. nigro-aurata, thorace aureo, femoribus ferrugineis.

Loc. Habitat ſalicem.

14. A. aurea.

Le Plutus.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. aurea, pedibus flavis.

Loc. Habitat hortos.

15. A. 4-punctata.

L'Altiſe à points rouges.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

A. nigra, coleoptris punctis quatuor rubris.
Loc. Idem.

16. A. ferruginea.
L'Altise fauve à stries.

A. oblonga, ferruginea, elytris striatis.
Loc. Idem.

17. A. fulva.
L'Altise fauve sans stries.
Long. lig. Larg. lig.
A. ovata ferruginea, elytris punctis sparsis.
Loc. Idem.

18. A. exsoleta.
L'Altise jaune.
Long. 1 ½ lig. Larg. 1 lig.
A. flava.
Loc. Idem.

29. A. pallida.
La Paillette.
Long. 1 lig. Larg. ½ lig.
A. elytris pallido-flavis, capite nigro.
Loc. Idem.

* 30. A. ænea.

L'Altise bronzée.

Long. 1 ½ lig. Larg. 1 lig.

A. nigro-ænea, ovata, pedibus rufis, elytris punctis sparsis.

Loc. Habitat hortos.

XXX. GALERUCA. *LA GALERUQUE.*

Antennæ ubique æquales, articulis subglobosis.

Thorax inæqualis, scaber, marginatus.

1. G. tanaceti. Adimonia littoralis

La Galeruque brunette.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

G. atro-fusca, elytris lineis tribus elevatis, punctis numerosis.

Varietas A. fusca, elytris lineis elevatis interruptis.

Loc. Habitat tanacetum, & flores compositos in pratis.

2. G. sanguinea.

La Galeruque sanguine.

Long. 2 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

G. ſanguineo-rubra.
Loc. Habitat flores.

3. G. ulmii.
La Galeruque à bandes de l'orme.
Long. 2, 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig.
G. pallida, thorace nigro variegato, elytris faſciis duabus longitudinalibus nigris.
Loc. Habitat folia ulmi, abundans.

4. G. aquatica.
La Galeruque aquatique.
Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.
G. pallida, thorace nigro variegato, elytris unicoloribus pallidis.
Loc. Habitat potamogeton in rivis & ſtagnis.

5. G. livida.
La Galeruque griſette.
Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.
G. nigra, thorace elytriſque luteo-lividis.
Loc. Habitat betulam.

6. G. violacea.
La Galeruque violette.
Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

G. nigro-violacea.

Loc.

* 7. G. viridis. Galleruca nigricornis (F) Oliv. Encycl.

La Galeruque verte.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

G. thorace pallide flavescente, elytris viridibus nitentibus.

Loc.

8. G. 4-maculata.

La Galeruque quadrille.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

G. rubro-lutea, maculis quatuor nigris.

Loc.

XXXI. CHRYSOMELA. *LA CHRYSOMELE.*

Antennæ à basi ad apicem crescentes, articulis globosis.

Thorax æqualis marginatus.

1. C. populi.

La grande Chrysomele rouge à corcelet bleu.

Long. 5, 6 lig. Larg. 4 lig.

C. nigro-cœrulea, elytris rubris apice nigris.

Variet. A. ead. elytris ommino rubris.

La petite Cryſomele rouge à corcelet bleu.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

Loc. Habitat populum.

2. C. polita.

La Chryſomele rouge à corcelet doré.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

C. viridi-ænea, elytris rubicundis, punctis ſparſis.

Loc.

3. C. ſtriata. Chr. lurida Linn.

La Chryſomele rouge à corcelet noir.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. nigra, elytris rubris ſtriatis, ſtriis punctatis.

Loc.

4. C. 10-punctata.

La Chryſomele rouge à points noirs.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

C. rubra, elytro ſingulo maculis quinque nigris.

Loc. Habitat ſalicem.

5. C. hæmoptera.

La Chryſomele violette.

Long. 3 ½ lig. Larg. 3 lig.

C. tota violacea.

Loc.

6. C. violaceo-cœrulea.

La Chryſomele bleue à corcelet violet.

Long. 4 lig. Larg. 2 ½ lig.

C. cœrulea, thorace violaceo.

Variet. ead. thorace nigro-violaceo.

Loc.

7. C. nigra.

La Chryſomele noire à aîles rouges.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

C. tota nigra.

Loc.

8. C. ſanguinolenta.

La Chryſomele noire à bordure rouge.

Long. 5 lig. Larg. 4 lig.

C. nigro-cœrulea, elytris atris punctatis, margine exteriore rubro.

Loc. Habitat sylvas.

9. C. marginata.

La Chrysomele bleue à bordure rouge.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.

C. nigro-cœrulea, elytris lucidis, punctatis margine exteriore & anteriore rubris.

Loc. Habitat prata; rara.

10. C. graminis.

Le grand Vertubleu.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

C. viridi-cœrulea.

Loc. Habitat galeopsim, lamium, mentham & gramina.

11. D. viridula. Chrys. viridula ? Olid. Encycl. V. 718. 125.

La Chrysomele dorée.

Long. 2, 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig.

C. viridis nitida, thorace antice æquali, elytris pone contiguis.

Loc. Habitat flores labiatos.

12. C. ænea. Chr fastuosa Linn

Le petit Vertubleu.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. viridis nitida, thorace antice excavato, fasciis elytrorum longitudinalibus cœruleis.

Loc. Habitat flores labiaros.

13. C. nitidula.

La Chrysomele à gallons.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

C. viridis nitida, striis decem cupreis, punctorum duplici serie divisis.

Loc. Idem.

14. B. fasciata. Chr. cerealis Linn

L'Arlequin doré.

Long. 3, 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2, 2 $\frac{1}{4}$ lig.

C. aurea, fasciis cœruleis, cupreisque alternis, punctis inordinatis.

Loc. Habitat colles aridos.

15. C. rubro-cuprea. Chr. Staphylaea

La Chrysomele briquetée.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.

C. ſupra rubro-cupræa, infra nigra nitens.

Loc.

16. C. malvæ. *Chrys polygoni Linn.*

La Chryſomele verte à corcelet rouge.

Long. 1 $\frac{1}{4}$, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. nigra, elytris cœruleo-viridibus, thorace pedibus antennarumque baſi rufis.

Loc. Habitat malvam.

17. C. betulæ.

La Chryſomele bleue du ſaule.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. nigro-purpurea, punctis excavatis, ſtriata.

Loc. Habitat ſalicem & betulam.

18. C. thoracica. *Chr. viminalis Linn.*

La Chryſomele à ſuture noire.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

C. rubra, thorace punctis duobus nigris, coleoptrorum ſuturâ nigrâ.

Loc.

19. C. caraboides.

La Chrysomele à un seul étui.

Long. 3, 6, 7 lig.

C. atro-purpurea, elytris coadunatis, alis nullis.

Loc. Habitat hortos & sylvas; larva Gallium.

20. C. phellandrii.

La Chrysomele à bandes jaunes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

C. oblonga nigra, elytrorum lineis duabus longitudinalibus luteis.

Loc. Habitat phellandrium.

21. C. ferruginea. Chrys. vitellinae? (Fenin) Olis Encycl.

La Chrysomele brunie.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. nigro cuprea, punctis elytrorum per strias digestis.

Loc.

22. C. gemellata.

La Chrysomele à stries jumelles.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. viridis, punctis elytrorum per strias gemellas digestis.

Loc.

* 23. C. ſcabra.

La Chryſomele greſillée.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. viridi-aurea, elytris ſcabris nitentibus.

Loc.

24. C. antiqua.

La Chryſomele antique.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. tota fulvo-cuprea punctata.

Loc.

25. C. ſuturata.

La Chryſomele couturée.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. rubeſcens, elytrorum ſtriis punctatis, ſutura nigra.

Loc.

26. C. tulipa.

La Chryſomele tulipe.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. thorace pedibuſque fulvis; elytris antice luteis maculâ fuſcâ; poſtice fuſcis, maculis luteis.

Loc.

XXXII. MYLABRIS. *Le Mylabre.*

Antennæ ſenſim creſcentes, articulis hemiſphæricis, roſtro brevi plano inſidentes.

Antennæ quatuor in extremo roſtri.

1. M. crucigera.

Le Mylabre à croix blanche.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

M. fuſca, cinereo-nebuloſa abdominis apice cruce albâ.

Loc. Larva legumina habitat, mylabris flores.

2. M. fuſca.

Le Mylabre brun.

Long. 3 lig. Larg. 1 ½ lig.

M. tota fuſca.

Loc.

3. M. ſericea.

Le Mylabre ſatiné.

Long. 1 lig. Larg. ½ lig.

M. nigra, abdomine albo ſericeo.

Loc. Habitat flores.

XXXIII. RHINOMACER. *Le Becmare.*

Antennæ clavatæ integræ, roſtro longo inſidentes.

1. R. elongatus.

Le Becmare levrette.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

R. corpore anguſto longo niger, thorace faſciis quatuor albicantibus.

Loc. Habitat carduum.

2. R. viridis.

Le Becmare vert.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

R. totus viridi-ſericeus.

Loc.

3. R. auratus.

Le Becmare doré.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

R. viridi-auratus, ſubtus nigro-violaceus.

Loc.

4. R. ruber.

Le Becmare doré à étuis rouges.

Long. 1 $\frac{1}{4}$, 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ 1 lig.

R. niger, elytris rubris, capite thoraceque aureis, proboſcide longitudine fere corporis.

Loc.

5. R. cœruleus.

Le Becmare bleu à poil.

Long. 1, 1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$, 1, 1 $\frac{1}{4}$ lig.

R. ſubvilloſus cœruleus.

Loc. Habitat flores.

6. R. niger.

Le Becmare non ſtrie.

R. nigro-fuſcus, glaber, punctato ſtriatus.

Loc. Idem.

7. R. oblongus.

Le Becmare allongé.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

R. nigro-virideſcens, oblongus ſtriatus.

Loc. Habitat umbelliferarum flores.

8. R. fulvipes.

Le Becmare noir à pattes fauves.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

R. ſubgloboſus, niger, ſtriatus, femoribus rufis.

Loc. Habitat flores.

9. R. minutus.

Le Becmare puce.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

R. ſubgloboſus, villoſus, niger, pedibus elytriſque rufis.

Loc. Idem.

10. R. coccineus.

Le Becmare laque.

Lon. 1 $\frac{1}{2}$, 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 $\frac{1}{4}$ lig.

R. niger, thorace elytriſque rubris, proboſcide longitudine capitis.

Loc.

11. R. coryli.

La Tête écorchée.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

R. niger, thorace elytriſque rubris, capite pone elongato.

Loc. Habitat corylum.

* 12. R. ſtriatus.

Le Becmare noir à trompe fauve.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

R. oblongus, nigro cupreus; pedibus & proboſcide fulvis, punctis elytrorum per ſtrias digeſtis.

Loc.

* 13. R. fulgidus.

Le Becmare rouge.

Long. 1 ½ lig. Larg. 1 lig.

R. ovatus, ſtriatim punctatus, ſupra ruber, infra cupreus; antennis, proboſcide pedibuſque nigris.

Loc.

XXXIV. CURCULIO. *Le Charanson.*

Antennæ clavatæ fractæ, roſtro longo corneo inſidentes.

FAMIL. I. *Femoribus inermibus.*

1. C. nebuloſus.

Le Charanſon à trompe ſillonnée.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

C. albo nigroque varius, proboſcide planiuſculâ carinatâ, thoracis longitudine.

Loc. Habitat arbores.

2. C. rugosus.
Le Charanson ridé.
Long. 4 lig. Larg. 2 lig.
C. totus fuscus rugosus.
Loc. Habitat prata.

3. C. sulcatus.
Le Charanson à corcelet sillonné.
Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.
C. fusco-nebulosus, thorace sulcato, elytris striatis.
Loc. Idem.

4. C. paraplecticus.
Le Charanson à suture noire.
Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.
C. oblongus, elytris villoso-cinereis, suturâ nigrâ.
Loc.

5. C. pictus.
Le Charanson à côtes tachetées.
Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.
C. fuscus, fulvo maculatus; elytris striatis, striis alternatim nigro maculatis.
Loc. Habitat loca arida.

6. C. bipunctatus.

Le Charanson à deux points blancs.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, fuscus thoracis lateribus albidis, elytris striatis puncto albo.

Loc.

7. C. fasciatus.

Le Charanson à deux bandes transverses.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig.

C. nigro-fuscus, thorace utrinque fasciâ longitudinali, elytris duplici transversâ cinereâ.

Loc. Habitat carduum.

8. C. cardui.

Le Charanson tacheté des têtes de chardon.

Long. 2 $\frac{1}{2}$, 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$, 2 lig.

C. niger, striatus, maculis villoso-fuscis nebulosus.

Loc. Idem.

9. C. elegans.

Le Charanson brodé.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. niger, thorace punctato, elytris alternatim striatis & punctatis.

Loc.

10. C. incanus.

Le Charanson gris, strié & sans aîles.

Long. 2 $\frac{1}{2}$, 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{3}{4}$ lig.

C. cinereus, squamosus, alis carens, elytris striatis.

Loc. Habitat hortos, flores, arbores; abundans.

11. C. incisus.

Le Charanson noir à sillons.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.

C. oblongus, totus niger, thorace punctato, elytris sulcatis.

Loc.

12. C. argentatus.

Le Charanson à écailles vertes, & pattes fauves.

Long. 2, 3 lig. Larg. $\frac{2}{5}$, 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. squamoso-viridis, rostro thorace breviore, pedibus rufis.

Loc. Habitat hortos, arbores, &c.

13. C. fasciolatus.

Le Charanson à corcelet rayé.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. rostro thoracis longitudine, thorace tribus striis pallidioribus.

Loc. Habitat arbores sepium.

14. C. intersectus.

Le Charanson écailleux à bandes.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. rostro thorace breviore, squamis nitentibus, thoracis elytrorumque fasciis longitudinalibus.

Loc. Habitat flores.

15. C. modestus.

Le Charanson grisette.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.

C. rufus, subvillosus, capite nigricante, rostro thorace breviore.

Loc. Idem.

16. C. viridis.

Le Charanson satin-vert.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C.

C. cœruleo-viridis nitens, thorace punctato, elytris ſtriatis.

Loc. Habitat cruciferas.

17. C. funereus.

La Pleureuſe.

Long.

C. oblongus, niger; abdomine ſquamoſo, lateribus albis.

Loc.

18. C. granarius.

Le Charanſon brun du bled.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. rufo-teſtaceus oblongus, thorace elytrorum fere longitudine.

Loc. Habitat grana; horræis infeſtus.

19. C. ſaltator.

Le Charanſon ſauteur brun.

C. rufus, femoribus poſticis craſſioribus, elytris ruſis.

Loc. Habitat ulmum.

20. C. alni.

Le Charanson sauteur à taches noires.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. rufus, femoribus posticis crassioribus, elytris maculis quatuor nigris.

Loc. Habitat ulmum & alnum.

21. C. quadrilis.

Le Charanson quadrille à courte trompe.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. cinereus elytrorum puncto quadruplici nigricante, proboscide thorace breviore.

Loc.

22. C. 5-maculatus.

Le Charanson quadrille à longue trompe.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. cinereus, elytrorum puncto quadruplici albo, proboscide thorace longiore.

Loc.

23. C. communis.

Le Charanson satin gris.

Long. 1 ½ lig. Larg. 1 lig.

C. niger, ovatus, striatus, totus villoso-cinereus, thorace inermi.

Loc

24. C. armatus.

Le Charanson à corcelet épineux.

Long.

C. ovatus, nigro-cinereus, thorace utrinque denticulato.

Loc.

25. C. pultiaris.

Le Charanson à bandes blanches.

Long. Larg.

C. subrotundus, niger, squamosus, elytris striatis; thorace utrinque occuleato, lateribus lineâque mediâ albis.

Loc.

26. C. floriger.

Le Charanson noir strié.

Long. 1 lig. Larg. ½ lig.

C. ſubgloboſus, cinereo-ater, ſtriatus, proboſcide thoracis longitudine.

Loc. Habitat flores.

27. C. cinctus.

Le Charanſon roux à bande tranſverſale blanche.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. globoſus rufus, elytris ſtriatis, faſciâ tranſverſâ albâ.

Loc.

28. C. vittatus.

Le Charanſon noir à bande tranſverſale blanche.

C. globoſus niger, elytris ſtriatis, faſciâ tranſverſâ albâ.

Loc. Habitat ſalicem.

29. C. murinus.

Le Charanſon ſouris.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. ſubvilloſo-murinus, ſcutello albicante.

Loc.

30. C. ſpinifer.

Le Charanſon à côtes épineuſes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. totus fuſcus ſpinoſus, elytris ſtriis elevatis villoſo-ſpinoſis.

Loc.

31. C. denticulatus.

Le Charanſon noir à côtes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger, ſcutello albicante, elytrorum ſtriis utrinque denticulatis.

Loc.

32. C. acridulus.

Le Charanſon pyriforme.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. pyriformis, nigro-cœruleſcens, abdomine ovato.

Loc. Habitat flores.

33. C. marmoratus.

Le Charanſon marbré à bandes.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

C. lividus, coleoptris faſciis plurimis obſcuris.

Loc. Habitat flores ſalicariæ.

FAMIL. II. *Femoribus denticulatis.*

34. C. coronatus.

Le Charanson à corcelet couronné.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger apterus, thorace utrinque puncto duplici fulvo, basi pilis fulvis coronatâ.

Loc.

* 35. C. scabrosus.

Le Charanson noir chagriné.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

C. totus niger, nitidus, elytris striatis subrugosis.

Loc.

36. C. tigrinus.

Le Charanson tigré.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

C. niger, maculis villoso-flavis, elytris subrugosis.

Loc. Habitat Normanniam.

* 37. C. contractus.

Le Charanson levrier.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus, totus niger, thorace punctato, elytris ſtriato-punctatis.

Loc.

38. C. monopterus.

Le Charanſon gris à étuis réunis & chagrinés.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. cinereus, ſquamoſus, alis carens, elytris rugoſis.

Loc.

* 39. C. fuſcipes.

Le Charanſon noir à pattes brunes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger ſtriatus, pedibus fuſcis.

Loc.

40. C. rugoſiſſimus.

Le Charanſon cartiſanne.

Long. 3, 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{3}$ lig.

C. fuſcus, apterus, elytris rugoſo-ſtriatis.

Loc.

41. C. auratus.

Le Charanſon à écailles vertes.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. ſqamoſus, viridi-auratus.

Loc. Habitat hortos, arbores.

42. C. querneus.

Le Charanſon à étuis fauves.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus, niger, elytris pedibuſque teſtaceis.

Loc. Habitat arbores.

43. C. geographicus.

Le Charanſon gèographie.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. ſubgloboſus, nigro-fuſcus, ſquamoſus, lineolis albis variegatus.

Loc. Habitat viperinam.

44. C. ſtellifer.

Le Charanſon brun à bandes tranſverſes de taches blanches.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. fuſcus, elytris ſtriatis macularum albarum faſciâ triplici tranſverſâ.

Loc.

45. C. nucum.

Le Charanson trompette.

Long. 2, 3, 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{2}{3}$ lig.

C. rufo-marmoratus, scutello cordato albo, proboscide subulatâ longissimâ.

Loc. Habitat nuces.

46. C. tesselatus.

Le Charanson damier.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. flavescens, elytris luteo & rufo tesselatis.

Loc.

47. C. scrophularis.

Le Charanson à lozange de la scrophulaire.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. subgloboſus niger, punctis duobus aris futuræ longitudinalis coleoptrorum, thorace exalbido.

Loc. Habitat scrophulariam.

48. C. hortulanus.

Le Charanson gris de la scrophulaire.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. ſubgloboſus, cinereus, punctis duobus nigris ſuturæ longitudinalis coleoptrorum.

Loc. Habitat ſcropuulariam.

49. C. pericarpius.

Le Charanſon porte-cœur de la ſcrophulaire.

Long. 1 lig. Larg. ½ lig.

C. ſubgloboſus; fuſco-nebuloſus, maculâ cordatâ albâ in medio dorſo.

Loc. Idem.

50. C. tripunctatus.

Le Charanſon brun à points blancs.

C. ſubgloboſus, ſquamoſus, cinereo-fuſcus elytrorum maculis tribus & apice albis.

Loc. Habitat prata.

51. C. armiger.

Le Charanſon noir à corcelet armé.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. niger, thorace utrinqe dentato.

Loc.

52. C. plebeius.

Le Charanſon noir à corcelet ſans points.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. fuſco-niger thorace inermi.

Loc.

53. C. ſcutellatus.

Le Charanſon brun à écuſſon blanc.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. fuſcus, ſcutello puncto albo, elytris maculâ rubeſcente.

Loc.

54. C. rubigineus.

Le Charanſon couleur de rouille.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. ferrugineus, elytris ſtriatis, oculis nigris.

Loc.

55. C. villoſus.

Le Charanſon velouté.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. obſcure rufus, villis cinereis aſperſus, roſtro, thorace breviore.

Loc.

56. C. virgo.

Le Charanſon vierge.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, villis cinereis aſperſus, roſtro thoraci æquali.

Loc. Habitat flores.

* 57. C. punctulatus.

Le Charanſon noir picoté.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. totus niger, oblongus, thorace punctato, elytris punctato-ſtriatis, femoribus denticulatis.

Loc.

* 58. C. cordifer.

Le Charanſon à cœur.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. cinereus, ſcutello albo, faſciâque elytrorum interruptâ albâ, proboſcide longiſſimâ.

Loc.

59. C. fasciatus.
Le Charanson fascié.
Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.
C. fusco-cinereus villosus elytrorum suturâ maculisque albis.
Loc.

XXXV. BOSTRICHUS. *Le Bostriche.*

Antennæ clavatæ, clavâ ex articulis tribus compositâ, capiti insidentes.
Rostrum nullum.
Thorax cubicus caput intra se recondens.
Tarsi nudi spinosi.

1. B. ruber.
Le Bostriche.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig.
B. niger, elytris rubris.
Loc. Habitat sylvas.

* 2. B. fuscus.
Le Bostriche brun.
Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

B. fuſcus, thorace coſtis, elytris ſtriis punctatis elevatis.

Loc.

XXXVI. CLERUS. *Le Clairon.*

Antennæ clavatæ, clavâ ex articulis tribus compoſitâ, capiti inſidentes.

Roſtrum nullum.

Thorax ſubcylindraceus, non marginatus.

Tarſi ſpongioſi.

1. C. apiarius.

Le Clairon à bandes rouges.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

C. nigro-violaceus, hirſutus, elytris faſciâ triplici coccineâ.

Loc. Larva nidos apium habitat, clerus flores.

2. C. violaceus.

Le Clairon bleu.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1, 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. nigro-cœruleus.

Loc. Larva & clerus putrida loca habitat, frequens in domis.

3. C. cruciger.

Le Clairon porte-croix.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. fuscus, villosus, elytris flavis cruce fuscâ.

Loc. Habitat flores.

4. C. villosus.

Le Clairon satiné.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger, subovatus, villis cinereis.

Loc. Habitat flores resedæ.

* 5. C. fasciatus. Clerus formicarius (F) Olivier Enc. VI. 13.

Le Clairon porte-livrée.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger villosus, elytrorum fasciâ anticâ rufâ, posticâ albâ.

Varietas A. Id. thorace rufo.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

B. Id. niger subvillosus, elytrorum fasciâ anticâ rufâ, mediâ flavâ, posticâ albâ. Clerus mutillarius (F) Olivier Encyd. W. 3.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

Loc. Habitat arbores vetustas.

* 6. C. maculatus. Oliv. Encyl. VI. p. 14. C. quadrimaculatus (t.)

Le Clairon à taches jaunes.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. fusco-niger subvillosus, elytro singulo maculis duabus flavis.

Loc.

XXXVII. ANTRIBUS. *L'ANTRIBE.*

Antennæ clavatæ, clavâ ex articulis tribus compositâ capiti insidentes.

Rostrum nullum.

Thorax latus, marginatus.

Tarsi spongiosi.

1. A. marmoratus.

L'Antribe marbré.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. ovatus, niger, elytris striatis, rubro nigroque marmoratis.

Loc. Habitat jaceam pratensem.

2. A. variegatus.

L'Antribe minime.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. ovatus subvillosus, è fusco cinereoque variegatus.

Loc. Habitat flores.

3. A. ater.

L'Antribe noir strié.

Long. 6, 7 lig. Larg. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

A. ater, elytris apice cinerascentibus.

Loc. Habitat flores.

4. A. pulicarius. Silpha id. Linn.

L'Antribe des fleurs.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. niger, elytris abdomine brevioribus.

Loc. Habitat umbelliferas plantas.

5. A. bimaculatus.

L'Antribe à deux points rouges au bout des étuis.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. niger ovatus, elytris apice punctis duobus rubris.

Loc. Habitat flores.

6. A. lœvis.

L'Antribe noir lisse.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. niger, ovatus, elytris abdomen tegentibus.

Loc. Idem.

* 7. A. fulvus.

L'Antribe fauve.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

A. oblongus, totus rufus.

Loc. Habitat vetusta ligna.

* 8. A. connexus.

L'Antribe panaché.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. oblongus niger subvillosus, elytris maculis connexis luteis.

Loc. Habitat flores.

* 9. A. nitidus.

L'Antribe perlé.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. ovatus totus fuscus.

Loc. Idem.

* 10. A. vittatus.

L'Antribe à bandes.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. ovatus fuscus, suturâ longitudinali nigrâ.

Loc. Idem.

11. A. pallidus.

L'Antribe paillet.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. ovatus, ſubtùs pallidus, ſupra fuſcus ſubvilloſus.

Loc. Habitat flores.

12. A. interſectus.

L'Antribe bigaré.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

A. oblongus ater, elytris ſignaturis albis pedibuſque annulis albis interſectis.

Loc. Idem.

XXXVIII. SCOLYTUS. *Le Scolyte.*

Antennæ clavatæ, clavâ ſolidâ.
Roſtrum nullum.

1. S. niger.

Le Scolyte.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

Loc. Habitat cortices.

XXXIX. CASSIDA. *LA CASSIDE.*

Antennæ extrorsum crassiores, nodosæ.
Thorax & elytra marginata.
Caput thorace tectum.

1. C. viridis.
La Casside verte.
Long. 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 lig.
C. viridis, corpore nigro.
Loc. Habitat plantas verticillatas & carduos.

2. C. nebulosa.
La Casside brune.
Long. 2, 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.
C. nebulosa, pallida, corpore nigro.
Loc. Idem.

3. C. nobilis.
La Casside à bandes d'or.
Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.
C. pallida, lineâ duplici longitudinali, viridi-deaurata.
Loc. Idem.

4. C. thoracica.

La Caſſide verte à corcelet brun.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. viridis, thorace ferrugineo.

Lo. Habitat aſteris varias ſpecies.

5. C. variegata.

La Caſſide panachée.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. viridis maculis nigris variegata.

Varietas A. Caſſida rubra maculis nigris variegata.

Loc. Habitat enulam campanam.

XL. ANASPIS. *L'ANASPE.*

Antennæ filiformes ſenſim creſcentes.
Scutellum vix apparens.
Thorax planus, lævis non marginatus.

1. A. nigra.

L'Anaſpe noire.

Long. 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg $\frac{1}{2}$ lig.

A. tota nigra.

Loc. Habitat flores.

2. A. bicolor.

Anaspis humeralis Nic. *L'Anaspe à taches jaunes.*

A. nigra, elytro singulo antice maculâ flavâ.

Loc. Habitat flores.

Anaspis rufocollis F. & Hordella, 3. A. thoracica.

L'Anaspe à corcelet jaune.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.

A. nigra, thorace luteo.

Loc. Habitat rarior.

Anaspis obscura Gyll. 4. A. maculata.

L'Anaspe fauve.

Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. villoso-flavescens, coleoptrorum maculis tribus obscuris.

Loc. Idem.

ORDO TERTIUS.

Caract. Ordinis III.

Tarsorum articuli tres.

XLI. COCCINELLA. *LA COCCINELLE.*

Antennæ extrorsum crassiores, nodosæ, antennulis breviores.
Corpus hæmisphæricum.

1. C. bi-punctata.
La Coccinelle rouge à 2 points noirs.
Long. 2 ½ lig. Larg. 2 lig.
C. coleoptris rubris, punctis duobus nigris.
Loc. Habitat alnum; aphivora.

2. C. 5-punctata.
La Coccinelle rouge à 5 points noirs.
C. coleoptris rubis punctis quinque nigris.
Loc. Habitat hortos.

3. C. 7-punctata.
La Coccinelle rouge à 7 points noirs.
Long. 3, 4 lig. Larg. 2 ½, 3 lig.

C. coleoptris rubris, punctis ſeptem nigris.

Loc. Habitat tiliam.

4. C. 9-punctata.

La Coccinelle rouge à 9 points noirs & corcelet noir.

Long. 2 ½ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis novem nigris, thorace nigro, lateribus albis.

Loc. Habitat arbuſta.

5. C. carpini.

La Coccinelle rouge à 9 points noirs & corcelet varié.

C. coleoptris rubris, punctis novem nigris, thorace nigro, antice albo.

Loc. Habitat carpinum.

6. C. 13-punctata.

La Coccinelle rouge à 13 points noirs & corcelet jaune varié.

Long. 2 lig. Larg. 1 ½ lig.

C.

C. coleoptris rubris, punctis tredecim nigris.

Loc. Habitat arbusta.

7. C. trinacris.

La Coccinelle rouge à 13 points noirs & corcelet rouge à bande.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis tredecim nigris, thorace rubro, medio nigro.

Loc. Habitat flores.

8. C. 11-punctata.

La Coccinelle rouge à 11 points & corcelet jaune.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. coleoptris rubris, punctis undecim nigris; thorace luteo nigro punctato.

Loc. Habitat ulmum.

9. C. argus.

La Coccinelle argus.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. rubra, punctis undecim nigris, thorace rubro immaculato.

Loc. Habitat sepes.

10. C. 19-punctata.

La Coccinelle rouge à 19 points noirs.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. coleoptris rubris, punctis novem decim nigris.

Loc. Habitat sepes.

11. C. 24-punctata.

La Coccinelle rayée.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. coleoptris rubris, punctis viginti-quatuor nigris, quibusdam connexis.

Loc. Habitat flores.

12. C. conglobata.

La Coccinelle à bordure.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. coleoptris rubris, punctis plurimis nigris, quibusdam connexis suturâ longitudinali nigrâ.

Loc. Habitat hortos.

12. C. 14-guttata.

La Coccinelle à 14 points blancs.

Long. 2, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis quatuordecim albis.

Loc. Habitat hortos.

14. C. marginata.

La Coccinelle à points & bordure blanche.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis quatuordecim limboque albis.

Loc. Idem.

15. C. 14-punctata. C. conglomerata Linn

La Coccinelle à l'échiquier.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. coleoptris flavis, punctis quadratis nigris, quibusdam connatis.

Loc. Idem.

16. C. 16-punctata.

La Coccinelle jaune à suture.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. coleoptris flavis, punctis sexdecim nigris, plurimis connexis, suturâ nigrâ.

Loc. Idem.

17. C. 22-punctata. C. 22punct. Linn.
La Coccinelle jaune sans suture.
Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.
C. coleoptris flavis, punctis viginti nigris.
Loc. Habitat sepes.

18. C. 14-pustulata.
La Coccinelle noire à 14 points jaunes.
Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{5}$ lig.
C. coleoptris nigris, punctis quatuordecim flavescentibus.
Loc. Habitat arbores.

19. C. 10-pustulata.
La Coccinelle noire à 10 points jaunes.
C. coleoptris nigris, punctis decem flavescentibus aut rubris.
Loc. Habitat hortos.

20. C. 6-pustulata.
La Coccinelle noire à points rouges.
Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. 1 lig.

C. ovata, coleoptris nigris, punctis sex rubris.

Varietas A. punctis quatuor rubris.
B. punctis duobus rubris. C. semipust.
C. punctis duobus luteis.

Loc. Habitat hortos.

21. C. fasciata.

La Coccinelle velue à bandes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. subvillosa nigra, fasciis duabus transversis rubris.

Loc. Habitat flores.

22. C. villosa.

La Coccinelle velue à points.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. subvillosa nigra, punctis quatuor luteo-rubris.

Loc. Idem.

23. C. interrupta.

La Coccinelle velue à bande interrompue.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. ſubvilloſa nigra, coleoptrorum baſi faſciâ tranſverſâ rubrâ interruptâ.

Loc. Habitat cortices & folia pruni; larva pilis albis & longis conſperſa dicitur, *le Barbet blanc des écorces.*

24. C. pygmæa.

La Coccinelle velue à taches rouges au corcelet.

Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. ſubvilloſa nigra, thorace utrinque maculâ rubrâ.

Loc. Habitat flores.

25. C. 4-puſtulata.

La Coccinelle tortue à 4 points rouges.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, punctis quatuor rubris.

Loc. Habitat urticam.

26. C. 2-puſtulata.

La Coccinelle tortue à bande rouge.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

C. rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, fasciâ transversâ rubrâ.

Loc. Habitat urticam.

* 27. C. testudinaris.

La Coccinelle noire à points rouges au corcelet.

C. rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, thorace utrinque maculâ rubrâ.

Loc. Idem.

* 28. C. 16-guttata.

La Coccinelle à 16 points blancs.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis sexdecim albis.

Loc.

* 29. C. 12-guttata. *Oliv. Encycl. VI.*

La Coccinelle à 12 points blancs.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig..

C. coleoptris rubris, punctis duodecim albis.

Loc.

XLII. TRITOMA. *La Tritome.*

Antennæ extrorsum sensim crassiores, antennulis longiores.
Corpus oblongum.

1. T. bimaculata. Tritoma 2 pust. F.
La Tritôme.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

Loc. Habitat corticis salices; rarissima.

ORDO QUARTUS.

Caract. Ordin. IV.

Tarsorum primi & secundi pedum paris articuli quinque : pedum vero posteriorum articuli quatuor.

XLIII. DIAPERIS. *La Diapere.*

Antennæ taxiformes, articulis lentiformibus per centrum perfoliatis.
Thorax convexus, marginatus.

1. D. fasciata. Diaperis solati F.
La Diapere.
Long. 3 lig. Larg. 1, 1 $\frac{3}{4}$ lig.

Loc. Habitat ilicem, Fontis-Bellaquæi incola.

XLIV. PYROCHROA. *LA CARDINALE.*

Antennæ uno versu pectinatæ.
Thorax inæqualis, scaber, non marginatus.

1. P. ruberrima. Pyrochroa coccinea F.
La Cardinale.
Long. 5 lig. Larg. 2 lig.
Loc. Habitat sepes, autumnalis.

XLV. CANTHARIS. *LA CANTHARIDE.*

Antennæ filiformes.
Thorax inæqualis, scaber; non marginatus.

FAMIL. I. *Tarsorum articulis nudis.*

1. C. vesicatoria.

La Cantharide des boutiques.

Long. 4, 5, 8, 9 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2, 3 lig.

C. viridi-aurata antennis nigris.

Loc. Habitat fraxinos.

2. C. attenuata.

La Cantharide à bande jaune.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. nigra, elytris attenuatis, antice luteis.

Loc.

FAMIL. II. *Tarsorum articulis spongiosis.*

3. C. crassipes.

La Cantharide verte à grosses cuisses.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. viridi-cœrulea, elytris attenuatis, femoribus posticis globosis.

Varietas A. viridi-cœrulea, elytris attenuatis.

Loc. Habitat prata.

4. C. fulva.

La Cantharide fauve à grosses cuisses.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. nigra, elytris attenuatis fulvis, femoribus posticis globosis.

Loc. Habitat flores.

5. C. villosa.

La Cantharide jaune veloutée.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. flavescens, subvillosa, elytris attenuatis.

Loc. Idem.

6. C. flava.

La Cantharide noire à étuis jaunes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. subvillosa, nigra, elytris flavis, extremo antennarum articulo reliquis triplo majore.

Loc. Habitat sylvas.

7. C. testacea.

La Cantharide fauve avec la pointe des étuis noire.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. testacea, elytris apice nigris.
Loc.

8. C. formicoides.
La Cantharide fourmi.
Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.
C. fusca, elytris antice, thoraceque elongato rubris.
Loc.

* 9. C. variegata.
La Cantharide fourmi panachée.
Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.
C. nigra, elytris fulvis maculis quinque nigris connexis, thorace elongato.
Loc.

XLVI. TENEBRIO. *LE TÉNÉBRION.*

Antennæ filiformes.
Thorax planus marginatus.

FAMIL. I. *Antennæ articulis globosis, extrorsum crassiores.*

1. T. mortisaga.
Le Ténébrion lisse à prolongement.
Long. 10 lig. Larg. 4 lig.

T. atra, aptera, coleoptris lævibus, pone acuminatis.

Loc. Habitat plantas coacervatas & exesas in hortis.

2. T. rugosa. Opatrum griseum Fabr.

Le Ténébrion ridé.

Long. 5 lig. Larg. 3 lig.

T. atra, aptera, coleoptris rugosis, pone acuminatis.

Loc. Habitat arenam.

3. T. gemellata.

Le Ténébrion à stries jumelles.

Long. 4 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, aptera, elytrorum striis octo punctatis per paria dispositis.

Loc. Habitat hortos.

4. T. striata.

Le Ténébrion à 8 stries lisses.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigro-fusca ovata, elytro singulo striis octo lævibus.

Loc. Habitat arva.

5. T. cuprea. Helops laniipes F.

Le Ténébrion bronzé.

Long. 5 ½ lig. Larg. 2 lig.

T. nigro-cuprea, elytro singulo striis octo; coleoptris pone acuminatis.

Loc. Idem.

6. T. molitoria.

Le Ténébrion à 9 stries lisses.

Long. 7 lig. Larg. 2 ⅓ lig.

T. atra, oblonga, elytris striis novem lævibus.

Loc. Larva farinam habitat; tenebrio domos.

7. T. sabulosa. Opatrum id. Fabr.

Le Ténébrion à stries dentelées.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

T. atra, elytris striis quinque utrinque dentatis.

Loc. Habitat putrida loca.

8. T. nigra.

Le Ténébrion noir lisse.

Long. 3 lig. Larg. 1 ½ lig.

T. nigra, tota lævis, coleoptris pone rotundatis.

Loc. Habitat arenam.

9. T. villosa.

Le Ténébrion fauve velu.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. tota ferruginea subvillosa.

Loc.

10. T. ferruginea.

Le Ténébrion fauve lisse.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. tota ferruginea lævis.

Loc.

11. T. sulcata.

Le Ténébrion cannelé.

Long. 7 lig. Larg. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

T. atra, aptera rotundata, elytris sulcis tribus elevatis.

Loc. Habitat provincias Galliæ meridionales.

FAMILIA II. *Antennæ articulis longis, ubique æquales.*

12. T. lutea.

Le Ténébrion jaune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

T. lutea.
Loc. Habitat flores.

* 12. T. arenaria.
Le Ténébrion à étuis fauves.
Long. 6 ½, 6, 5 ½ lig. Larg. 2 lig.
T. nigra, elytris ſtriatis ferrugineis.
Loc.

* 13. T. rotundata.
Le Ténébrion arrondi.
Long. 3 ½ lig. Larg. 2 lig.
T. nigra - cuprea, elytris ſingulis ſtriis octo punctatis, coleoptris pone rotundatis.
Loc.

* 14. T. globuloſa.
Le Ténébrion à corcelet arrondi.
Long. 6 lig. Larg. 2 lig.
T. atra ſcabra, thorace globoſo.
Loc.

* 15. T. cœrulea. Helops coeruleus? Fabr.
Le Ténébrion bleu.
Long. 4 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

T. cœrulea punctata, elytris ſtriatis, tarſis fulvis.

Loc.

XLVII. MORDELLA. *LA MORDELLE.*

Antennæ ſubſerratæ, articulis triangularibus.

Thorax antice attenuatus, convexus.

1. M. aculeata.

La Mordelle noire à pointe.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. atra, caudata, unicolor.

Loc. Habitat flores.

2. M. iriformis.

La Mordelle veloutée à pointe.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

M. atra, caudata, faſciis villoſo-aureis.

Loc. Idem.

3. M. ſtriata. Cistela cerambioides F.

La Mordelle à étuis jaunes ſtriés.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, elytris fulvis ſtriatis.

Loc. Habitat arbores in ſylvis.

4. T. fulva. Cistela murina F.

La Mordelle à étuis jaunes ſans ſtries.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, elytris fulvis lævibus.

Loc. Idem.

5. M. flavipes.

La Mordelle brune à pattes fauves.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

M. fuſca, pedibus ferrugineis.

Loc. Idem.

XLVIII. NOTOXUS. *LA CUCULLE.*

Antennæ filiformes.

Thorax cucullatus, dente acuto.

1. C. cucullatus.

La Cuculle. Anthicus monocerus F.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

Loc. Habitat umbelliferas, rariſſimus.

XLIX. CEROCOMA. *LA CEROCOME.*

Antennæ ultimo articulo clavato: (mascules complicatæ, in medio pectinatæ).

1. C. viridis. *Cerocoma Schaefferi*
La Cerocome.
Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

Loc.

ARTICULUS SECUNDUS.

Caract. articuli II.

Coleoptra dimidiata dura.

ORDO PRIMUS.

Caract. ordinis I.

Tarsorum articuli quinque.

L. STAPHYLINUS. *LE STAPHYLIN.*

Antennæ filiformes.
Alæ tectæ.
Abdomen inerme.

1. S. maxillosus.

Le grand Staphylin noir lisse.

Long. 11 lig. Larg. 2 $\frac{3}{4}$ lig.

S. ater, extremo antennarum articulo lunulato.

Loc. Habitat sylvas, hortos, &c.

2. S. cœrulescens.

Le Staphylin bleu.

Long. 7 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. atro-cœrulescens, extremo antennarum articulo lunulato.

Loc. Habitat hortos.

3. S. globulifer.

Le petit Staphylin noir.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

S. ater, extremo antennarum articulo subgloboso, elytris thorace brevioribus.

Loc. Idem.

4. S. macroclytron.

Le Staphylin noir à longs etuis.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

S. ater, elytris thorace duplo longioribus.

Loc. Habitat hortos.

5. S. nebulosus.

Le Staphylin nébuleux.

Long. 8 lig. Larg. 2 lig.

S. niger, elytris abdomineque cinereo-nebulosis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

6. S. tessellatus.

Le Staphylin velouté.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{5}{4}$ lig.

S. villosus, è fusco cinereoque viridi tessellatus.

Loc. Habitat hortos.

7. S. hirtus.

Le Staphylin bourdon.

Long. 10 lig. Larg. 3 lig.

S. niger villosus, capite thorace anoque pilis fulvo-aureis.

Loc. Habitat sylvas, rarus.

8. S. chrysocephalus.

Le Staphylin à tête jaune.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{4}{5}$ lig.

S. pubescens, capite flavo, thorace elytrisque fusco nigroque nebulosis, punctis impressis.

Loc. Habitat arva.

9. S. erytropterus.

Le Staphylin à étuis couleur de rouille.

Long. 6 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. ater, non nitens, elytris pedibusque rufis.

Loc.

10. S. flavopterus.

Le Staphylin noir à étuis fauves & lisses.

Long. 1, 3, 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ lig.

S. niger nitens, pedibus, elytrisque lævibus testaceis.

Varietas A. Staphylinus niger nitens, pedibus elytrisque lævibus testaceis, thoracis punctis per strias digestis.

Le Staphylin à étuis fauves & corcelet strié.

Loc.

11. S. fulvopterus.

Le Staphylin à étuis marons pointillés.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

S. niger, nitens, pedibus coleoptrisque testaceis, elytris punctatis.

Loc.

12. S. brachypterus.

Le Staphylin à étuis très-courts.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

S. niger, nitens, pedibus elytrisque fuscis punctatis, thorace plano marginato.

Loc.

13. S. compressus.

Le Staphylin applati à étuis bruns.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. niger, nitens, antennis, pedibus; elytris, anoque testaceis, thorace marginato.

Varietas A. Idem; antennis clavatis.

Loc. Habitat flores.

14. S. punctatus.

Le Staphylin noir à pattes fauves & étuis pointillés.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.

S. niger, punctatus, antennis pedibusque ferrugineis.

Loc. Habitat flores.

15. S. rufipes.

Omalium floralis Grav.

Le Staphylin noir à corcelet lisse & bordé.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, thorace marginato lævi, pedibus rufis.

Loc. Habitat arenam.

16. S. sulcatus.

Le Staphylin noir à corcelet sillonné & bordé.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, thorace marginato suturato, pedibus rufis.

Loc. Idem.

17. S. æneus.

Le Staphylin à étuis bronzés.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

S.

S. niger, elytris nigro-æneis.

Loc.

18. S. chrysomelinus.

Le Staphylin couleur de paille.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

S. niger, thorace, elytris, pedibusque subtestaceis.

Loc. Habitat arenam.

19. S. marginatus.

Le Staphylin à étuis bordés de jaune.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

S. niger, elytris fuscis margine flavo.

Loc. Habitat arva.

20. S. maculatus.

Le Staphylin noir à taches jaunes.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

S. niger; thorace utrinque, singuloque elytro, maculâ flavâ.

Loc. Idem.

21. S. riparius.

Le Staphylin rouge à tête noire & étuis bleus.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. rufus, elytris cœruleis, capite abdominiſque apice nigris.

Loc. Habitat arenam humidam.

22. S. rufus.

Le Staphylin jaune à tête, étuis & anus noirs.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

S. flavus, capite, elytris abdomineque pone nigris.

Loc.

23. S. thoracicus.

Le Staphylin noir à corcelet rouge.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. atro-cœruleſcens, thorace rubro.

Loc.

24. S. biguttatus.

Le Staphylin junon.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. ater, oculis prominentibus crassis.

Varietas A. Id. elytro singulo puncto flavo.

Loc. Habitat arenam.

25. S. clavicornis.

Le Staphylin à antennes en demi-massues.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. antennis subclavatis.

Loc.

* 26. S. melanophtalmos.

Le Staphylin fauve aux yeux noirs.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. pallidus, oculis anoque nigris, antennis subclavatis.

Loc.

* 27. S. elongatus.

Le Staphylin noir à bandes de points.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger nitens, elytris punctatis, thorace elongato lævi, striis quatuor punctatis.

Loc.

* 28. S. angustatus.

Le Staphylin à corcelet étranglé.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, thorace angustato fulvo, pedibus fuscis.

Loc.

* 29. S. variegatus.

Le Staphylin applati à étuis bigarrés.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

S. niger compressus, elytris postice pedibusque fuscis.

Loc.

* 30. S. arenarius.

Le Staphylin à étuis jaunes au milieu.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. ater, elytris in medio flavescentibus.

Loc.

* 31. S. melonocephalus.

Le Staphylin à tête noire.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. fulvus, capite anoque nigris.

Loc.

* 32. S. nigro-fulvus.

Le Staphylin arlequin à longues mâchoires.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. niger, thorace pedibus elytrorum abdominisque basi fulvis, apice nigris, maxillis longitudine capitis.

Loc.

* 33. S. cupreus.

Le Staphylin cuivreux.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. æneus punctatus, elytris veluti tesselatis.

Loc.

ORDO SECUNDUS.

Caract. ordinis II.

Tarsorum articuli quatuor.

LI. NECYDALIS, *LA NECYDALE.*

Antennæ filiformes.

Alæ nudæ.

1. N. punctata. Malthinus minimus

La Necydale à points jaunes.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

N. elytris apice puncto flavo.

Varietas A. Necydalis elytris apice puncto flavo, thorace luteo.

B. Necydalis elytris apice puncto flavo, thorace nigro.

Loc. Habitat folia ilicis.

* 2. N. major. Molorchus abbreviatus F.

La grande Necydale.

Long. 9 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

N. elytris ferrugineis immaculatis, antennis corpore brevioribus.

Loc.

ORDO TERTIUS.

Caract. ordinis III.

Tarsorum articuli tres.

LII. FORFICULA. *Le Perce-Oreille.*

Antennæ filiformes.
Alæ tectæ.
Abdomen forficibus armatum.

1. F. auricularia.

Le grand Perce-oreille.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig.

F. antennarum articulis quatuordecim.

Loc. Habitat hortos, gramina, flores.

2. F. minor.

Le petit Perce-oreille.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

F. antennarum articulis undecim.

Loc. Habitat arenam humidam.

ORDO QUARTUS.

Caract. ordinis IV.

Tarsorum primi & secundi pedum paris articuli quinque, pedum vero posteriorum articuli quatuor.

LIII. MELOE. *Le Proscarabé.*

Antennæ à medio ad basim & apicem decrescentes.

Alæ nullæ.

1 M. proscarabeus.

Le Proscarabé.

Long. 10, 11 lig. Larg. 5 lig.

Loc. Habitat hortos.

ARTICULUS TERTIUS.

Caract. articuli III.

Coleoptra mollia membranacea.

ORDO PRIMUS.

Caract. ordinis I.

Tarsorum primi & secundi pedum paris articuli quinque, pedum vero posteriorum articuli quatuor.

LIV. BLATTA. *LA BLATTE.*

Antennæ filiformes.
Ad ani latera apendices vesiculosi transversim sulcati.

1 B. orientalis.
La Blatte des cuisines.
Long. 9 lig. Larg. 4 ½ lig.
B. ferrugineo-fusca, elytris sulco ovato impressis, abdomine brevioribus.
Loc. Habitat loca calida domorum; farinam.

2. B. Aurelianensis.
La grande Blatte.
Long. 15 lig. Larg. 5 lig.

B. fusco-flavescens, elytris sulco ovato impressis, abdomine longioribus.

Loc. Habitat agrum Aurelianensem.

3. B. laponica.

La Blatte jaune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$, 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

B. flavescens, elytris ad angulum acutum striatis.

Loc. Habitat farinam.

ORDO SECUNDUS.

Caract. Ordin. II.

Tarsorum articuli duo.

LV. TRIPS. *Le Trips.*

Antennæ filiformes.
Os rimulâ longitudinali.
Tarsi vesiculosi.

1. T. juniperina.

Le Trips à pointe.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{6}$ lig.

T. elytris albidis, corpore nigro, abdominali setâ.

Loc. Habitat cortices arbor. vetustas.

2. T. physapus.
Le Trips noir des fleurs.
Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{10}$ lig.
T. elytris glaucis, corpore atro.
Loc. Habitat flores compositos.

3. T. fasciata.
Le Trips à bandes.

T. elytris albis nigrisque fasciis, corpore atro.
Loc. Idem.

ORDO TERTIUS.

Caract. Ordin. III.

Tarsorum articuli tres.

LVI. GRYLLUS. *Le Grillon.*

Antennæ filiformes.
Cauda biseta.
Ocelli tres.

1. G. grillo-talpa.
La Courtillière ou le Gaupe-Grillon.
Long. 18 lig. Larg. 4 lig.

G. pedibus anticis palmatis.

Loc. Habitat humum recentem, horticolis infestus.

2. G. domesticus.

Le Grillon.

Long. 1 pouce. Larg. 4 lig.

G. pedibus anticis simplicibus.

Loc. Habitat loca calida domorum & arva.

LVII. ACRYDIUM. *Le Criquet.*

Antennæ filiformes corpore dimidio breviores.

Ocelli tres.

1. A. cyaneum.

Le Criquet à aîles bleues.

Long. 1 pouce. Larg. 2 ½ lig.

A. elytris fuscis, alis subcœruleis.

Loc. Habitat arva sicca.

2. A. cœrulescens.

Le Criquet à aîles bleues & noires.

Long. 1 pouce. Larg. 3 lig.

A. elytris nebulosis, alis cœruleis extimo nigro.

Loc. Habitat prata.

3. A. stridulum.

Le Criquet à aîles rouges.

Long. lig. Larg. lig.

A. elytris nebulosis, alis rubris extimo nigris.

Loc. Habitat vineas.

4. A. grossum.

Le Criquet ensanglanté.

Long. 5, 10, 11 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 3 lig.

A. femoribus sanguineis, alis subfuscis reticulatis.

Loc. Habitat arva.

5. A. bi-punctatum.

Le Criquet à capuchon.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. elytris nullis, thorace producto abdomini æquali.

Loc. Idem.

6. A. subulatum.

Le Criquet à corcelet allongé.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. elytris nullis, thorace producto abdomine longiore.

Loc. Habitat arva.

ORDO QUARTUS.

Caract. Ordin. IV.

Tarsorum articuli quatuor.

LVIII. LOCUSTA. *LA SAUTERELLE.*

Antennæ filiformes corpore longiores.
Ocelli tres.

1. L. viridissima.

La Sauterelle à sabre.

Long. 11 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

L. caudâ ensiferâ curvâ.

Loc. Habitat arva & prata.

2. L. vermivora.
La Sauterelle à coutelas.
Long. 22 lig. Larg. 3 lig.
L. caudâ ensiferâ rectâ.
Loc. Habitat arva & prata.

ORDO QUINTUS.

Caract. Ordin. V.

Tarsorum articuli quinque.

LIX. MANTES. *LA MANTE.*

Antennæ filiformes.

1. M. gongylodes.
La Mante.
Long. 2 pouces. Larg. 5, 6 lig.

Loc. Habitat agrum Aurelianensem.

SECUNDA SECTIO INSECTORUM.

INSECTA HEMIPTERA.

Caracteres sectionis.

Alæ superiores elytris accedentes.
Os sub thorace inflexum.

LX. CICADA. *LA CIGALE.*

Articuli tarsorum tres.
Antennæ capite breviores.
Ocelli duo.
Rostrum inflexum.
Alæ quatuor, inferiores cruciatæ.

1. C. nervosa.
La Cigale à aîles transparentes.
Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.
C. fusca, alis aqueis fusco maculatis, nervis punctatis.
Loc. Habitat plantas & gramina.

2. C. spumaria.
La Cigale bedeaude.
Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. fusca, elytris fasciâ duplici interruptâ transversâ albidâ.

Loc. Habitat prata & medicaginem.

3. C. lateralis.

La Cygale à bordure.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{5}$ lig.

C. nigra, elytrorum lateribus albis.

Loc. Idem.

4. C. membranacea.

La Cigale à ailes membraneuses.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. fusco-pallida, elytris membranaceis venosis, scutello maculâ duplici triangulari.

Loc. Idem.

5. C. viridis.

La Cigale verte à tête panachée.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. elytris viridibus, capite flavo punctis nigris.

Loc. Idem.

6. C. sanguinea.

La Cigale à taches rouges.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

C. nigra, elytris maculis sex rubris.

Loc. Habitat prata & medicaginem; rarior.

7. C. gibbosa.

La Cigale bossue.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. fusco-viridis reticulata, alarum basi dilatatâ.

Loc. Id. rara.

8. C. pallida.

La Cigale pâle.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. flavo-pallida, thorace punctis sex impressis.

Varietas A. Cicada flavo-pallida, oculis nigricantibus.

B. Cicada flavo-pallida, dorsi lineâ longitudinali nigrâ.

C. Cicada flavo-pallida, thoracis posticâ, scutelli anticâ parte, fuscis.

Loc. Idem.

9. C. interrupta.

La Cigale jaune à raies noires obliques.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. elytris flavis, lineâ abruptâ duplici longitudinali nigrâ.

Loc. Idem.

10. C. regalis.

La Cigale à diadême.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. fusca, capitis thoracisque fasciâ transversâ flavâ.

Loc. Idem.

11. C. torquata.

La Cigale à collier jaune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. fusco-nebulosa, scutelli cavitate rotundâ, thorace punctis luteis impressis transversim positis.

Loc. Idem.

12. C. variegata.

La Cigale à pattes bigarées.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. fusco-nebulosa, scutello transversim sulcato, tibiis posticis, elytrorumque limbo è flavo fuscoque variegatis.

Loc. Idem.

13. C. marginata.

La Cigale à tête & bordure jaune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. fusco-nebulosa; capite, thoracis anticâ parte, elytrorumque limbo flavis.

Loc. Habitat prata & medicaginem.

14. C. venosa.

La Cigale à veines blanches.

Lon. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. fusco-nebulosa punctata, nervis elytrorum albidis.

Loc. Idem.

15. C. nigra.

La Cigale noire.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. tota nigra.

Loc. Habitat castaneas.

16. C. fasciolata.

La Cigale noire à bandes jaunes sur le corcelet.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. nigra, thorace elytrisque fasciâ croceâ.

Loc. Habitat prata.

17. C. aurita.

Le grand Diable.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig.

C. thorace obtuſe bicorni.

Loc. Habitat prata; rariſſima.

18. C. cornuta.

Le petit Diable.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. thorace acute bicorni, pone producto.

Loc. Habitat in ſylvis filicem, cirſium, ſaltator.

19. C. infernalis.

Le demi-Diable.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. thorace inermi pone producto.

Loc. Rar. in agro lutetiano; in Campaniâ frequens.

20. C. ſtriata.

La Cigale rayée.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. elytris albido nigroque ſtriatis ad angulum acutum ſuturæ dorſalis.

Loc.

21. C. trifasciata.

La Cigale à 3 bandes brunes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

C. fusca, elytris albidis, fasciis tribus transversis fuscis.

Variet. A. Eadem elytris unicoloribus, thorace antice punctorum nigrorum fasciâ transversâ.

Loc.

22. C. transversalis.

La Cigale à deux bandes brunes.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. flava, elytrorum fasciis duabus transversis fuscis.

Loc. Habitat arbores.

23. C. cœca.

La Cigale jaune aux yeux noirs.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. flava compressa, oculis nigris.

Loc.

24. C. flammigera.

La Cigale flamboyante.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. flava, fasciâ duplici longitudinali rubrâ undulatâ.

Loc. Habitat domos.

25. C. carpini.

La Cigale verte à points noirs.

C. viridi-flava, elytris punctis tribus nigris, apice fuscis.

Loc. Habitat folia arborum.

26. C. geographica.

La Cigale géographie.

C. viridis, elytris maculis plurimis fuscis ovatis.

Loc. Idem.

27 C. ulmi.

La Cigale moucheron verte.

C. alis viridi-luteis apicibus nigrantibus deauratis.

Loc. Habitat folia ulmi.

28. C. rosæ.

La Cigale des charmilles.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

C. flava, alis albis apicibus membranaceis.

Loc. Habitat arbores & rosam.

* 29 C. nervoptera.

La Cigale à nervures.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. fusca, thoracis margine flavo; alis aqueis nervis fuscis.

Loc.

* 30. C. acephala.

La Cigale verte à tête renfoncée.

Long. 2, 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 lig.

C. tota viridis, capite brevi lato.

Loc.

* 31. C. tristis.

La Cigale à bandes blanches.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. nigro-fusca, fasciis quatuor transversis albis, mediâ interruptâ.

Loc.

* 32. C. porrecta.

La Cigale à tête allongée.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C.

C. pallida, oculis nigris, capite antice producto acuto, thorace duplo longiori.

Loc.

* 33. C. dilatata.

La Cigale renflée.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. fusca, maculis irregularibus albis, elytrorum lateribus dilatatis.

Loc.

CICADA. (1)	TETIGONIA *nostras.*
LA CIGALE.	*LA PROCIGALE.*
Antennæ capite breviores, setaceæ, articulis quinque.	Antennæ capite breviores, articulis duobus globoso & setaceo.
Ocelli tres.	Ocelli duo.
Rostrum inflexum.	Rostrum inflexum.
Alæ quatuor laterales.	Alæ quatuor, inferiores cruciatæ.
Articuli tarsorum tres.	Articuli tarsorum tres.

(1) Adduntur hìc caracteres *Cicadæ veræ* Galloprovincialis, nostræ Cicadæ *Tetigonia* vocatæ oppositi.

Annumerantur duæ præcipuæ *Cicadæ veræ* ſpecies Gallo-provinciam habitantes, quæ in muſæis noſtris frequentiſſime aſſervantur.

1. *La Cigale à bordure jaune.*

C. fuſca, thoracis & ſcutellis margine flavo, alis nervoſis.

Loc. Habitat Gallo-provinciam.

2. *La Cigale panachée.*

C. fuſca, thorace ſcutelloque flavis, variegatis, alis nervoſo-punctatis.

Loc. Habitat Gallo-provinciam.

LXI. CIMEX. *LA PUNAISE.*

Articuli tarſorum tres.
Antennæ capite longiores articulis quatuor vel quinque.
Roſtrum inflexum.
Alæ quatuor, ſuperiores ſemi-elytra.

FAMIL. I. *Antennarum articuli quatuor.*

1. C. lectularius.
La Punaise des lits.

C. apterus.
Loc. Habitat lecta.

2. C. scutellatus.
La Punaise cuirasse.
Long. 1 ½ lig. Larg. 2 ½ lig.
C. hemisphericus nigro-æneus, scutello totum abdomen tegente, amplissimo.
Loc. Habitat viciam multifloram fontis Bellaquæi.

3. C. testudinarius.
La Punaise tortue brune.
Long. 3 lig. Larg. 2 ½ lig.
C. fuscus, scutello totum abdomen tegente, amplissimo.
Loc. Habitat sylvas.

4. C. personatus.
La Punaise mouche.
Long. 7, 8 lig. Larg. 2 lig.

C. oblongus niger, roſtro arcuato, antennis apice capillaceis, elytris membranaceis.

Loc. Habitat domos.

5. C. annulatus.

La Punaiſe mouche à pattes rouges.

Long. 5 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

C. oblongus niger, roſtro arcuato, elytris membranaceis, pedibus abdomineque rubro nigroque variegatis.

Loc. Habitat ſylvas.

6. C. bidentatus.

La Punaiſe porte-épine.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

C. longus, fuſcus, roſtro arcuato, thorace ſubtùs antice bidentato.

Loc. Habitat plantas, rarus.

7. C. pellucidus.

La Punaiſe brune à étuis transparens.

Long. 1 lig. Larg. ½ lig.

C. oblongus, fusco-niger, pedibus pallidis, elytris pellucidis apice fusco.

Loc.

8. C. boopis.

La Punaise marbrée aux gros yeux.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, luteo nigroque marmoratus, oculis crassissimis.

Loc.

9. C. leviatan.

La Punaise leviatan.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. planus, fuscus, thorace elytrisque alatis, capite antice cornuto, antennis brevibus crassis.

Loc.

10. C. eryngii.

La Punaise rouge à taches triangulaires.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. oblongus niger, thorace elytrisque rubris, elytrorum extremo maculâ triangulari nigrâ.

Loc. Habitat folia Eryngii.

11. C. apterus.

La Punaise rouge des jardins.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus, elytris maculâ rotundâ, punctuloque nigris.

Loc. Habitat arborum infimam partem, multiplex.

12. C. hyosciami.

La Punaise rouge à croix de chevalier.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus, scutelli nigri apice rubro.

Loc. Habitat folia hyosciami.

13. C. stellifer.

La Punaise rouge à base des aîles blanches.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus, centro crucis albo.

Loc. Habitat hortos.

14. C. equeſtris.

La Punaiſe rouge à bandes noires & taches blanches.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus, elytris faſciâ nigrâ, alis fuſcis maculis albis.

Loc.

15. C. nobilis.

La Punaiſe rouge à point noir & taches blanches.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus, elytris punctulo nigro, alis fuſcis maculis albis.

Loc.

16. C. teſſellatus.

La Punaiſe rouge à damier.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, thorace nigro lineis tribus rubris, elytris rubro nigroque teſſellatis, limbis nigris.

Loc. In Campaniâ multiplex.

17. C. croceus.

La Punaise safranée.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. croceus, elytrorum apice rubro, alis nigris, antennarum articulo secundo clavato.

Variet. A. Cimex niger, pedibus rufis, antennarum articulo secundo clavato.

B. Cimex niger, capite, thorace pedibusque rufis, antennarum articulo secundo clavato.

Loc.

18. C. gothicus.

La Punaise rougeâtre à antennes incarnat.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. oblongus, fusco-ruber, elytris apice sanguineis, antennarum articulo secundo longissimo incarnato.

Loc.

19. C. variegatus.

La Punaise à brocard jaune.

Long. 4 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 2 lig.

C. oblongus niger, thoracis lateribus scutelloque flavis, elytris antennis pedibusque flavo-variegatis.

Loc.

20. C. marginatus.

La Punaise à ailerons.

Long. 6 lig. Larg. 2 ½ lig.

C. oblongus, fuscus, immaculatus, thorace utrinque obtuse angulato, capite prope antennas externe denticulato.

Loc.

21. C. rostratus. = Coreus scapulis Fabr.

La Punaise à bec.

Long. 5 ½ lig. Larg. 2 ½ lig.

C. oblongus, fuscus, immaculatus, thorace utrinque obtuse angulato, capite inter antennas bidentato.

Loc.

22. C. acutus. = ~~Coreus~~ Fabr. = Coreum? Corisplanum?

La Punaise brune à corcelet pointu & lisse.

Long. 9 lig. Larg. 2 lig.

C. oblongus rufus, immaculatus, thorace utrinque acute angulato, margine lævi.

Loc.

23. C. fimbriatus. = Corizus ?

La Punaise brune à corcelet pointu & épineux.

Long. 3 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

C. oblongus, rufus, immaculatus, thorace utrinque acute angulato, margine spinoso.

Loc.

24. C. chelifer.

La Punaise à pattes de crabes.

Long. 3 lig. Larg. 1 ½ lig.

C. oblongus fuscus, pedibus primi paris cheliformibus.

Loc. Habitat sylvas.

25. C. sabulosus. = Corizus crassicornis L.

La Punaise à nervures pointillées.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus, viridi-fuſcus, elytrorum nervis punctatis, antennis rufis.

Loc.

26. C. monilis.

La Punaiſe brune à antennes & pattes panachées.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus, fuſcus, antennis, pedibus abdominiſque marginibus nigro luteoque variegatis.

Loc.

27. C. cathariæ. = Heterogaster negundae Fab.

La Punaiſe griſe panachée de noir.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus, cinereo nigroque variegatus, alis glaucis.

Loc. Habitat labiatas, præcipue cathariam.

28. C. crucifer. = Pachygronthus prasinus Linn.

La Punaiſe griſe porte-croix.

C. oblongus niger, thorace poſtice cinereo, elytris cinereis, maculâ nigrâ, aliſque nigris.

Loc. Habitat arida loca.

? 29. C. apicaris. = Beosus sp.?

La Punaise brune à pointe des étuis blanche.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus niger, thorace postice cinereo, elytris fuscis apice albo.

Loc.

? 30. C. femoralis. = Plagiognathus viridulus Fam.?

La Punaise verdâtre à cuisses pointillées.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, pallide-viridescens, femoribus nigro-punctatis.

Loc.

31. C. constellaris. = Anthocoris [illegible]?

La Punaise noire à taches fauves & aîles panachées.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus, niger, elytris antice rufis, alis albo maculatis.

Loc. Habitat cortices arborum.

32. C. fuligineus. = Stygnus mustelinus Fall.

La Punaise brune ponctuée.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, atro-fuscus punctatus, alis venosis.

Loc.

33. C. pratensis. L. = Lygæus id.

La Punaise gris-fauve porte-cœur.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. griseus, scutello maculâ cordatâ flavâ, elytris apice puncto fusco.

Loc.

34. C. campestris. = Lygæus Pertinacus Fall.

La Punaise verte porte-cœur. L. F. S. 667 S. N. 10, p. 448 n. 60.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus, viridis, scutello maculâ cordatâ viridi, elytris maculâ ferrugineâ.

Varietas A. Cimex oblongus, fusco-luteus, scutello maculâ cordatâ viridi, elytris fasciâ duplici fuscâ. = Lygæus 3-punctatus?

Loc. Habitat flores.

35. C. cordatus.

La Punaise porte-cœur à taches jaunes au bout des étuis.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, fusco-ruber, scutello maculâ cordatâ luteâ, elytris apice luteis.

Loc.

36. C. porrectus.

La Punaise jaune à antennes droites.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus, flavescens, thorace fasciis duabus nigris, scutello maculis flavis, antennis antice porrectis.

Loc.

37. C. ternatus.

La Punaise à trois taches.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus niger, thorace fasciis tribus flavis, scutello elytrorumque apice maculis luteis.

Loc.

38. C. ſtriatus.

La Punaiſe rayée de jaune & de noir.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus niger, thorace faſciis tribus flavis, ſcutello nigro, elytris flavis apice fulvo.

Loc.

39. C. nigro-punctatus.

La Punaiſe jaune à corcelet tacheté & étuis verts.

Larg. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus viridi-flavus, capite thoraceque nigro maculatis, elytris viridibus.

Loc.

40. C. virideſcens.

La Punaiſe verdâtre à tache brune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus viridis, elytrorum maculâ fuſcâ.

Loc.

41. C. albinus.

La Punaise verdâtre à taches blanches.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus viridis, elytrorum apice albido, scutello lineolâ fuscâ.

Loc.

42. C. elongatus.

La Punaise verdâtre à bande brune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus viridis, thorace scutelloque lineis quatuor nigris, elytris interne fuscis.

Loc.

43. C. ærugineus.

La Punaise verte aux yeux bruns.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. oblongus, totus viridis, oculis fuscis.

Loc.

44. C. cruentatus.

La Punaise verte ensanglantée.

Long. 3 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus viridis, elytrorum lineis sanguineis.

Loc.

45. C. ruficornis.

La Punaise verte à antennes fauves.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, pallido-viridis, antennis setaceis rufis.

Loc.

46. C. lateralis.

La Punaise blanchâtre aux yeux noirs.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. longus albidus, oculis nigris.

Loc.

47. C. recticornis.

La Punaise verte à antennes droites.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. longus totus viridis antennis antice porrectis.

Loc.

48. C. ſponſalis.

La Punaiſe pâle à tache noire ſur l'écuſſon.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. longus, albidus, oculis fuſcis ſcutello maculâ nigrâ.

Loc.

49. C. conicus.

La Punaiſe griſe conique.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus conicus, fuſco-cinereus, oculis prominentibus, elytris nervoſis.

Loc. Habitat hortos.

50. C. flammeus.

La Punaiſe noire à pointe des étuis rouges.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus niger, capite, elytrorum apice, genubuſque ferrugineo-rubris.

Loc.

51. C. rolandri.

La Punaise couleur de suie à ailes jaunes.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus atro-fuscus, alarum maculâ flavâ.

Loc.

52. C. plæssæus.

La Punaise noire à pattes panachées.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus niger, pedibus viridi nigroque variegatis.

Loc.

53. C. atramentarius.

La Punaise toute noire.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus totus ater, alis atris.

Loc.

54. C. ater.

La Punaise à grosses antennes terminées par un fil.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus ater, antennis setâ terminatis.

Loc. Habitat sylvas.

55. C. carthusianus.

La Punaise chartreuse.

Long. 2 lig. Larg $\frac{3}{4}$ lig.

C. oblongus, infra niger, supra albo-lacteus, antennis crassis antice porrectis, capite pedibus antennisque nigris.

Loc. Habitat Eryngium.

56. C. clavicornis.

La Punaise tigre.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. ex albo fuscoque cinereus, elytrorum thoracisque margine punctato antennis subclavatis.

Loc. Larva flores chamædrys distendit.

57. C. appendiceus. Tingis appendiceus Ste. Inc. X653

La Punaise à fraise antique.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. antennis clavatis, thorace elytrisque corpore multo latioribus diaphanis, reticulatis, fasciâ duplici transversâ.

Loc.

58. C. vagabundus.

La Punaise culiciforme.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. linearis pedibus anticis breviſſimis, cœteris antenniſque filiformibus longiſſimis, albo fuſcoque variis.

Loc. Habitat arbores.

59. C. lacuſtris.

La Punaise nayade.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

C. linearis ſuprà niger, pedibus anticis breviſſimis.

Loc. Habitat aquarum ſtagnantium ſuperficiem.

60. C. ſtagnorum.

La Punaise aiguille.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

C. linearis nigricans compreſſus, capite cylindraceo, pedibus anticis breviſſimis.

Loc. Habitat ſtagna.

FAMIL. II. *Antennarum articuli quinque.*

61. C. juniperinus.
La Punaise verte.
Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.
C. subrotundus viridis.
Loc. Fetidissimus, habitat grossulariam.

* 62. C. tridentatus.
La Punaise à trois cornes.
Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.
C. planus, depressus, atro-fuscus, capite antice tridentato, thoracis margine serrato, elytris parvis.
Loc.

63. C. carminaris.
La Punaise verte lavée de rouge.
Long. 6 lig. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.
C. ovatus, thorace obtuse angulato, è viridi rubroque nebulosus.
Loc.

* 64. C. biclavatus.
La Punaise à double masse.
Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus lividus, antennarum articulo primo & extremo clavatis.

Loc.

65. C. pungens.

La Punaise verte à pointes du corcelet rouges.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

C. subovatus viridis, angulis thoracis acutis rubris apice nigris, abdomine subtus acuto.

Loc.

66. C. baccarum.

La Punaise brune à antennes & bords panachés.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

C. fuscus, antennis abdominisque margine nigro croceoque variegatis.

Loc. Habitat grossulariam, fetidus.

67. C. annularis.

La Punaise brune à pattes panachées.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. fuſcus, pedibus abdominiſque limbo luteo fuſco variegatis.

Loc.

68. C. ſecalinus.

Eurygaster hottentottus (F) Serv.

La Punaiſe porte-chappe brune.

Long. 5 ½ lig. Larg. 3 ½ lig.

C. nigro-ferrugineus, ſcutello ad anum uſque producto. Geoffr. n° 66.

Loc. Habitat ſecale & gramina.

69. C. cappatus. [illegible] Fabr.

La Punaiſe porte-chappe noire.

Long. 5 ½ lig. Larg. 3 lig.

C. ater punctatus, ſcutello ad anum uſque producto.

Loc. Habitat domos.

70. C. italicus.

La Punaiſe ſiamoiſe.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

C. rotundatus ruber, ſupra faſciis longitudinalibus, infra punctis nigris, ſcutello amplo totum fere abdomen tegente.

Loc.

71.

71. C. ornatus.

La Punaise rouge du chou.

Long. 4 ½ lig. Larg. 3 lig.

C. rotundato-ovatus, nigro rubroque variegatus, capite aliſque nigris.

Loc. Habitat braſſicam.

72. C. carbonarius.

La Punaise noire.

Long. 4 lig. Larg. 1 ⅔ lig.

C. ovatus, totus niger, alis pallidis.

Loc.

73. C. fumoſus.

La Punaise brune luiſante.

Long. 1 ½ lig. Larg. 1 lig.

C. ovatus, fuſco-niger, alis pallidis.

Loc.

74. C. limboſus.

La Punaise noire à bordure blanche.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. ovatus niger, elytrorum limbo exteriore albo.

Loc.

75. C. bicolor.

La Punaise noire à quatre taches blanches.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

C. ovatus niger, thoracis lateribus, elytrorumque maculis quatuor albis.

Loc.

76. C. oleraceus.

La Punaise verte à raies & taches rouges ou blanches.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

C. ovatus cœrulescenti-æneus, thorace lineolâ, scutelli apice, elytrisque puncto albo rubrove.

Loc.

77. C. cœruleus.

La Punaise verte bleuâtre.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. ovatus, viridi cœruleus æneus.

Loc.

78. C. saltator. Geoff. n°. 76.

La Punaise sauteuse.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. rotundato-ovatus niger, capite genubusque ferrugineis, pedibus saltatoriis.

Loc.

79. C. acuminatus.

La Punaise à tête allongée.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. ovatus, antice attenuatus, fasciis longitudinalibus cinereo-exalbidis, antennis extremo rufis.

Loc.

LXII. NAUCORIS. *LA NAUCORE.*

Articuli tarsorum duo.

Antennæ brevissimæ infra oculos positæ.

Rostrum inflexum.

Alæ quatuor cruciatæ.

Pedes sex, primi cheliformes.

Scutellum præsens.

1. N. cimicoides.

La Naucore.

Long. 4, 5 lig. Larg. 3 lig.

Loc. Habitat aquam.

LXIII. NOTONECTA. *LA PUNAISE A AVIRONS.*

Articuli tarſorum duo.
Antennæ breviſſimæ infra oculos poſitæ.
Roſtrum inflexum.
Alæ quatuor cruciatæ.
Pedes ſex natatorii.
Scutellum præſens.

1. N. glauca.

La grande Punaiſe à avirons.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

N. capite luteo, elytris fuſco croceoque variegatis, ſcutello atro.

Loc. Habitat aquam.

2. N. minutiſſima.

La petite Punaiſe à avirons.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

N. cinerea anelytra.

Loc. Idem.

LXIV. CORIXA. *La Corise.*

Articulus tarſorum unicus.
Antennæ breviſſimæ infra oculos poſitæ.
Roſtrum inflexum.
Alæ quatuor cruciatæ.
Pedes ſex, primi cheliformes, poſtici natatorii.
Scutellum nullum.

1. C. ſtriata.
La Coriſe.

Long. 5 ½ lig. Larg. 2 lig.
Loc. Habitat rivulos & ſtagna, fetidiſſima.

LXV. HEPA. *Le Scorpion aquatique.*

Articulus tarſorum unicus.
Antennæ cheliformes.
Roſtrum inflexum.
Alæ quatuor cruciatæ.
Pedes quatuor.

1. H. linearis.

Le Scorpion aquatique à corps allongé.

Long. 13 lig. Larg. 1 lig.

H. corpore lineari.

Loc. Habitat aquam ſtagnantem.

2. H. cinerea.

Le Scorpion aquatique à corps ovale.

Long. 8, 9 lig. Larg. 3 lig.

H. corpore ovato.

Loc. Idem.

LXVI. PSYLLA. *LA PSYLLE.*

Articuli tarſorum duo.
Roſtrum pectorale inter primum & ſecundum par femorum.
Alæ quatuor laterales.
Pedes ſaltatorii.
Abdomen acuminatum.
Ocelli tres.

1. P. ficûs.

La Pſylle du figuier.

Long. 2 lig. Larg. ½ lig.

P. fusca, antennis crassis pilosis, alarum nervis fuscis.

2. P. chermes buxi.
La Psylle du buis.
Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.
P. viridis, antennis setaceis, alis fusco-flavescentibus.

3. P. alni.
La Psylle de l'aune.

P. viridis, antennis setaceis, alis aqueis.

4. P. fraxini.
La Psylle du frêne.
Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.
P. nigro luteoque variegata; alarum oris in apice fuscis.

5. P. abietis.
La Psylle du sapin.
Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.
P. pallidè flavescens, oculis fuscis, alis aqueis.

6. P. pini.

La Psylle du pin.

Long. Larg.

P. lanata pini.

7. P. lapidum, seu lichenis.

La Psylle des pierres.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

P. fusca, nigro punctata, antennis corpore longioribus, alis nervosis fusco maculis.

8. P. fusca.

La Psylle brune à antennes sétacées & aîles nerveuses.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

P. fusca, antennis setaceis lævibus, alis nervosis.

9. P. rubra.

La Psylle rouge.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

P. rubra, alis nervosis.

Loc.

LXVII. APHIS. *Le Puceron.*

Articulus tarſorum unicus.
Roſtrum inflexum.
Alæ quatuor erectæ vel nullæ.
Pedes ambulatorii.
Abdomen bicorne.

1. A. ulmi.
Le Puceron de l'orme.
A. ulmi.

2. A. fraxini.
Le Puceron du frêne.
A. fraxini, nigro viridique variegata.

3. A. ſambuci.
Le Puceron du ſureau.
A. ſambuci tota cœruleo-atra.

4. A. roboris.
Le Puceron du chêne.
A. quercûs atro-fuſca.

5. A. aceris.
Le Puceron de l'érable.
A. aceris, viridis, maculis nigris.

6. A. tiliæ.

Le Puceron du tilleul.

A. tiliæ, alis, antennis, pedibusque nigro punctatis.

7. A. betulæ.

Le Puceron du bouleau.

A. betulæ, marginibus incisurarum abdominis punctis nigris.

8. A. tanaceti.

Le Puceron de la tanaisie.

A. tanaceti fusca, abdomine nigro-cœruleo antice viridi.

9. A. acetosæ.

Le Puceron de l'oseille.

A. acetosæ, atra fasciâ transversâ viridi.

10. A. padi.

Le Puceron du prunier.

A. pruni.

11. A. bursaria.
Le Puceron du peuplier noir.
A. populi nigra lanata.

12. A. fagi.
Le Puceron du hêtre.
A. fagi lanata.

13. A. lactucæ.
Le Puceron du laiteron.
A. sonchi caudata.

14. A. quercûs.
Le Puceron des écorces à longues trompes.
A. fusca proboscide corpore triplo longiore.

LXVIII. CHERMES *Le Kermès.*

Rostrum pectorale inter primum & secundum par femorum.
Alæ duæ masculis, erectæ.
Abdomen appendicibus setaceis.
Fæmina folliculi formam induens.

1. C. polonicus.
Le Kermès des racines.
C. radicum purpureus.
Loc. Habitat polygoni *Knawel* radices.

2. C. hesperidum.
Le Kermès des orangers.
C. hesperidum.

3. C. clematitis.
Le Kermès de la clematite.
C. clematitis oblongus.

4. C. persicæ.
Le Kermès oblong du pêcher.
C. persicæ oblongus.

5. C. amygdali.
Le Kermès rond du pêcher.
C. persicæ rotundus.

6. C. vitis.
Le Kermès de la vigne.
C. vitis oblongus.

6. C. abietis.
Le Kermès du ſapin.
C. abietis rotundus.

8. C. ulmi.
Le Kermès de l'orme.
C. ulmi rotundus.

9. C. tiliæ.
Le Kermès du tilleul.
C. tiliæ hemiſphæricus.

10. C. coryli.
Le Kermès du coudrier.
C. coryli hemiſphæricus.

11. C. quercûs.
Le Kermès rond & brun du chêne.
C. quercûs rotundus fuſcus.

12. C. roboris.
Le Kermès du chêne rond & de couleur panachée.
C. quercûs rotundus, ex albo flaveſcente nigroque variegatus.

13. C. reniformis.
Le Kermès reniforme du chêne.
C. quercûs reniformis.

14. C. fericeus.
Le Kermès ovale & cotonneux du chêne.
C. quercûs oblongus ferico albo.

15. C. carpini.
Le Kermès cotonneux du charme.
C. carpini ferico albo.

16. C. mefpili.
Le Kermès cotonneux du neflier.
C. mefpili ferico albo.

17. C. linearis.
Le Kermès en écaille de moule.
C. arborum linearis.

18. C. aceris.
Le Kermès ovale de l'érable.
C. aceris ovatus.

LXIX. COCCUS. *LA COCHENILLE.*

Roſtrum pectorale inter primum & ſecundum par femorum.
Alæ duæ maſculis, erectæ.
Abdomen appendicibus ſetaceis.
Fæmina inſecti formam ſervans.

1. C. adonidum.
La Cochenille des ſerres.
C. adonidum, corpore roſeo, farinaceo, alis ſetiſque niveis.

2. C. phalaridis.
La Cochenille du chien-dent.
C. graminis corpore roſeo.

3. C. ulmi.
La Cochenille de l'orme.
C. ulmi, corpore fuſco, ſerico albo.

Finis primæ Partis.

ENTOMOLOGIA PARISIENSIS;

SIVE

CATALOGUS Insectorum quæ in Agro Parisiensi reperiuntur;

SECUNDUM methodum Geoffræanam in sectiones, genera & species distributus:

CUI addita sunt nomina trivialia & fere trecentæ novæ Species.

Edente A. F. DE FOURCROY, Doct. Med. Paris.; è Reg. Scientiar. Academ.; è Reg. Soc. Medic. &c.

PARS SECUNDA.

PARISIIS,

VIA ET ÆDIBUS SERPENTINEIS.

M. DCC. LXXXV.

SUB PRIVILEGIO ACADEMIÆ.

1650 30/6.

ENTOMOLOGIA PARISIENSIS.

SECTIO TERTIA.

CLASSIS INSECTORUM.

Insecta tetraptera alis farinaceis.

LXX. PAPILIO. *Le Papillon.*

Antennæ clavatæ.
Chrysalis nuda.

FAMIL. I. *Tetrapi.*

§. I.

Erucis spinosis, alis angulosis.

1. P. antiopa.
Le Morio.
Longueur 1 ½ pouces. Largeur 3 pouces.

P. alis nigris, margine postico albido.

Locus. Larva habitat salicem.

2. P. jo.

Le Paon du jour, ou l'œil du Paon.

Long. 13 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ pouc.

P. alis fulvis nigro maculatis, omnibus ocello cœruleo variegato.

Loc. Larva habitat urticam majorem.

3. P. polychloros.

La grande Tortue.

Long. 15 lig. Larg. 2 pouc. 4 lig.

P. alis fulvis nigro maculatis, primariis punctis quatuor nigris.

Loc. Larva habitat ulmum.

4. P. urticæ.

La petite Tortue.

Long. 11 lig. Larg. 2 pouc.

P. alis fulvis, nigro maculatis, primariis punctis tribus nigris.

Loc. Larva habitat urticæ majoris folia.

5. P. G album.

Le Gamma ou Robert-le-Diable.

Long. 10 lig. Larg. 22 lig.

P. alis laceris fulvis nigro maculatis, secundariis subtus G albo notatis.

Loc. Larva habitat upulum & grossulariam.

6. P. atalanta.

Le Vulcain.

Long. 13 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ pouc.

P. alis nigris albo maculatis, omnibus fasciâ arcuatâ coccineâ.

Loc. Larva habitat urticam.

7. P. cardui.

La Belle-dame.

Long. 1 pouc. Larg. 2 pouc. 5 lig.

P. alis fulvis albo nigroque variegatis, secundariis ocellis quinque.

Loc. Larva habitat carduum & cirsium.

§. II.

Erucis spinosis, alis rotundatis.

8. P. paphia.

Le Tabac d'Espagne.

Long. 15 lig. Larg. 1 pouc. 7 lig.

P. alis dentatis fulvis nigro maculatis, ſubtus lineis tranſverſis argenteis.

Loc. Habitat ſylvas; larva o.

9. P. aglaia.

Le grand Nacré.

Long. 1 pouc. Larg. 2 pouc. 3 lig.

P. alis dentatis fulvis nigro maculatis, ſubtus maculis 21 argenteis.

Loc. Idem.

10. P. lathonia.

Le petit Nacré.

Long. 10 lig. Larg. 2 pouc.

P. alis dentatis fulvis nigro maculatis, ſubtus maculis 37 argenteis.

Loc. Idem.

11. P. euphroſine.

Le Collier argenté.

Long. 7 ½ lig. Larg. 18 lig.

P. alis dentatis fulvis nigro maculatis, ſubtus maculis 9 argenteis.

Loc. Idem.

12. P. cinxia.

Le Damier.

Long. 6 lig. Larg. 18 lig.

P. alis dentatis fulvis nigro variegatis, ſubtus faſciis tribus flavis.

Varietas A. Papilio alis dentatis fulvis nigro maculatis, ſubtus faſciis tribus flavis.

B. Papilio alis dentatis fulvis nigro reticulatis, ſubtus faſciis tribus flavis.

C. Papilio alis dentatis fulvis nigro reticulatis, & punctatis, ſubtus faſciis tribus flavis.

D. Papilio alis dentatis fulvis nigro reticulatis & punctatis, utrinque faſciis tribus flavis.

Loc. Habitat ſylvas: larva o.

§. III.

Erucis non spinosis, pedibus anticis brevissimis collare non efficientibus.

13. P. silene.

Silene.

Long. 14 lig. Larg. 2 pouc. 3 lig.

P. alis rotundatis dentatis nigro-fuscis, omnibus fasciâ albidâ, primariis ocello duplici, secundariis unico.

Loc. Habitat sylvas; larva o.

14. P. hyperantus.

Le Tristan.

Long. 9 lig. Larg. 18 lig.

P. alis rotundatis fuscis, subtus primariis ocello triplici, inferioribus quintuplici.

Loc. Idem.

15. C. saltator.

La Bacchante.

Long. 10 lig. Larg. 13 lig.

P. alis rotundatis fuſcis, ſingulis ſubtus ocellis quinque & limbo pallidiore.

Loc. In ſylvis undèquaque volitat; larva o.

16. P. ægeria.

Le Tircis.

Long. 8 lig. Larg. 20 lig.

P. alis rotundatis dentatis fuſcis, fulvo maculatis, primariis ocello unico, ſecundariis ſuperne quadrupli.

Loc. Habitat ſylvas; larva o.

17. P. jurtina.

Le Corydon.

Long. 9 lig. Larg. 21 lig.

P. alis rotundatis fuſcis, primariis ſubtus fulvis, ocello unico.

Loc. Idem.

18. P. mirtyllus.

Le Mirtil.

Long. 1 pouc. Larg. 2 pouc.

P. alis rotundatis dentatis ſupra fuſcis, primariis maculâ fulvâ, infra è fulvo & fuſco undulatis, primoribus utrinque ocello.

Loc. Idem.

19. P. mœra.

Le Satyre.

Long. 11 lig. Larg. 2 pouc.

P. alis rotundatis fulvo fuſcoque nebuloſis; primariis ſeſqui-ocello, ſecundariis ſuprà tribus, infrà ſeptem ocellis.

Loc. Habitat ſylvas, hortos; larva gramen Poa dictum.

20. P. amaryllis.

L'Amarylis.

Long. 7 ½ lig. Larg. 17 lig.

P. alis rotundatis fulvis oris fuſcis, primariis ocello duplici continuo, ſecundariis duobus, infrà fuſco cinereoque nebuloſis.

Loc. Habitat ſylvas; larva o.

21. P. pamphylus.

Le Procris.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouc.

P. alis rotundatis fulvis, oris fuſcis, primariis ſubtus ocello unico, ſecundariis ſubtus albo cinereoque variegatis.

Loc. Habitat erucas; larva ſocialis gramen filo intricato obveſtit.

22.

22. P. cephalus.

Le Céphale.

Long. 7 lig. Larg. 17 lig.

P. alis rotundatis, superioribus fulvis oris fuscis, subtus ocello unico; secundariis suprà fuscis, infrà cinereis, fasciâ albâ ocellisque quinis.

Loc. Habitat sylvas; larva o.

FAMIL. II. *Hexapi pedibus sex unguiculatis, chrysalide horisontali in medio filo suspensâ.*

§. I.

Caudiferi majores.

23. P. machaon.

Le grand Papillon à queue de fenouil.

Long. 28 lig. Larg. 3 pouc.

P. alis flavo nigroque variegatis, secundariis angulo subulato maculâque fulvâ.

Loc. Habitat sylvas; larva fæniculum & umbelliferas.

24. P. flammæus.

Le Flambé.

Long. 18 lig. Larg. 3 pouc. 4 lig.

P. alis pallidè flavis, rivulis transversis nigris, secundariis angulo subulato maculâque croceâ.

Loc. Habitat sylvas.

§. II.

Caudiferi minores.

25. P. pisorum.

Le Porte-queue bleu strié.

Long. 7 lig. Larg. 15 lig.

P. suprà cœruleus, subtus lineis undulatis fuscis & albicantibus striatus, alis secundariis infrà fascia albâ, maculâ duplici, nigro-auratâ, & in imo caudatis.

Loc. Habitat sylvas; larva coluteam, pisos, legumina.

26. P. quercûs.

Le Porte-queue bleu à une bande blanche.

Long. 7 lig. Larg. 15 lig.

P. ſupra cœruleus ſubtus fuſcus, lineâ undulatâ tranſverſâ albicante, alis ſecundariis infrà maculâ duplici fulvâ, & in imo caudatis.

Loc. Habitat ſylvas, larva quercûs folia.

27. P. betulæ.

Le Porte-queue fauve à deux bandes blanches.

Long. 9 lig. Larg. 17 lig.

P. ſupra fuſcus maculâ flavâ, ſubtus fulvus lineâ duplici tranſverſâ albidâ, alis ſecundariis in imo caudatis.

Loc. Habitat ſylvas, larva betulam.

28. P. pruni.

Le Porte-queue brun à deux bandes de taches blanches.

Long. 7 lig. Larg. 15 lig.

P. fuſcus, maculâ fulvâ, ſubtus faſciâ duplici tranſverſâ macularum albicantium, alis ſecundariis lunularum ferrugineârum ſerie & in imo caudatis.

Varietas A. Papilio fuſcus, ſupra puncto albido, ſubtus lineâ tranſverſâ albâ, alis ſecundariis margine fulvo angulato, & in imo caudatis.

Loc. Larva habitat prunum, ulmum.

§. III.

Ocelliferi.

29. P. jris.

Le Mars.

Long. 14 lig. Larg. 2 pouc. 10 lig.

P. alis ſubangulatis, ſupra nigro violaceis; albo faſciatis, ſubtus fulvo, fuſco albidoque variis, ſingulis ocello nigro cœruleo.

Loc. Habitat hortos.

30. P. argus.

L'Argus bleu.

Long. 6 lig. Larg. 14 lig.

P. alis rotundatis integerrimis cœruleis, ſubtus ocellis numeroſis.

Loc. Habitat prata, larva frangulam.

31. P. ſemi-argus.

Le Demi-Argus.

Long. 5 lig. Larg. 14 lig.

P. alis rotundatis integerrimis cœruleis; ſubtus ocellorum faſciâ ſolitariâ.

Loc. Habitat prata, larva frangulam.

32. P. fuſciolus.

L'Argus brun.

Long. 6 lig. Larg. 14 lig.

P. alis rotundatis integerrimis nigro-fuſcis, faſciâ marginali fulvâ, ſubtus cinereis ocellis numeroſis.

Loc. Id. rarior.

33. P. rubi.

L'Argus myope.

Long. 6 lig. Larg. 13 lig.

P. alis rotundatis integerrimis nigro fuſcis fulvo maculatis, ſubtus ocellis numeroſis.

Loc. Id. rarior; larva habitat rubum.

34. P. cæcus.

L'Argus vert, ou l'Argus aveugle.

Long. 6 lig. Larg. 14 lig.

P. alis rotundatis integerrimis, ſubtus viridibus immaculatis.

Loc. Idem.

35. P. virgaureæ.

Le Bronzé.

Long 5 lig Larg. 13 lig.

P. alis rotundatis fulvis, utrinque punctis nigris.

Loc. Habitat prata.

36. P. ſpeculifer.

Le Miroir.

Long. 6 lig. Larg. 15 lig.

P. nigro-fuſcus nitens, alis ſubtus limbo dentato fulvo, ſecundariis maculis duodecim albis.

Loc. Habitat ſylvas.

§. IV.

Divaricati.

37. P. divaricatus.

La Bande noire.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouc.

P. alis divaricatis fulvis, limbo nervisque nigris, primariis maculâ oblongâ nigrâ.

Loc. Habitat prata.

38. P. malvæ.

Le Plein-chant.

Long. 5 lig. Larg. 14 lig.

P. alis divaricatis denticulatis nigris, albo punctatis.

Loc. Larva habitat carduum fullonum & malvam.

39. P. tages.

Le Papillon grisette.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouc.

P. alis divaricatis cinereis, punctorum alborum serie duplici transversâ.

Loc. Idem.

§. V.

Brassicarii.

40. P. brassicæ.

Le grand Papillon blanc du chou.

Long. 1 pouc. Larg. 2 pouc. 4 lig.

P. alis rotundatis albis, primariis bimaculatis, apice nigris, major.

Loc. Habitat hortos; larva brassicam.

41. P. rapæ.

Le petit Papillon blanc du chou.

Long. 11 lig. Larg. 23 lig.

P. alis rotundatis albis, primariis bimaculatis, apice nigris, minor.

Loc. Larva habitat rapam, brassicam, cardamindum.

42. P. napi.

Le Papillon blanc veiné de vert.

Long. 7 lig. Larg. 19 lig.

P. alis rotundatis albis, inferioribus subtus fasciis virescentibus.

Loc. Idem.

43. P. cratægi.

Le Gasé.

Long. 13 lig. Larg. 2 ½ pouc.

P. alis rotundatis albis; venis nigris.

Loc. Larva habitat cratægum, pomum sylvestrem, padum.

44. P. cardamines.

L'Aurore.

Long. 8 lig. Larg. 19 lig.

P. alis rotundatis albis, secundariis subtus viridi-nebulosis, primariis lunulâ nigrâ, masculis maculâ croceâ.

Loc. Larva habitat thlaspim.

45. P. luctuosus.

Le Deuil.

Long. 9 lig. Larg. 23 lig.

P. alis dentatis, supra nigris, subtus fusco-rubris, utrinque maculis albis fasciatim positis.

Loc. Habitat sylvas.

46. P. leucomelanos.

Le demi-Deuil.

Long. 10 lig. Larg. 22 lig.

P. alis rotundatis albis, lineis maculisque nigris pulchrè tesselatis.

Loc. Idem.

47. P. rhamni.

Le Citron.

Long. 1 pouc. Larg. 2 pouc. 2 lig.

P. alis angulatis flavis, puncto ferrugineo.

Loc. Larva habitat rhamnum.

48. P. croceus.

Le Souci.

Long. 9 lig. Larg. 21 lig.

P. alis luteis limbo nigro, primariis maculâ nigrâ, secundariis fulvâ.

Varietas A. Papilio alis croceis limbo nigro immaculato, primariis maculâ nigrâ, secundariis fulvâ.

B. Papilio alis croceis limbo nigro flavo maculato, primariis maculâ nigrâ, secundariis fulvâ.

C. Papilio alis sulphureis, primariis limbo nigro fasciâ flavâ maculato, maculâque nigrâ, secundariis fulvâ.

Loc.

LXXI. SPHINX. *Le Sphinx.*

Antennæ prismaticæ.
Chrysalis in puppa.

FAMIL. I. *Antennæ prismaticæ ubique fere æquales, elingues.*

1. S. ocellata.

Le Demi-Paon.

Long. 17 lig.

S. elinguis alis angulatis, superioribus fuscis, inferioribus rubris ocello cœrulescente.

Loc. Larva salicem habitat.

2. S. tiliæ.

Le Sphinx du tilleul.

Long. 1 pouce.

S. elinguis, alis laceris superioribus cinereo-virescentibus, fasciâ obscuriore transversâ inæquali, inferioribus fusco-aurantiis.

Loc. Larva habitat tiliam.

3. S. populi.

Le Sphinx à aîles dentelées.

Long. 1 pouce.

S. elinguis, alis ferratis, cinereo-fuscis; superioribus fasciis obscurioribus transversis, inferioribus basi maculâ fulvâ.

Loc. Larva habitat populum.

4. S. bombyciformis.

Le Sphinx mouche.

Long. 5 lig.

S. elinguis, alis lanceolatis vitreis venis nigris, superioribus maculâ limboque nigris, fulvoque nebulosis.

Loc.

FAMILIA II. *Antennæ prismaticæ ubique fere æquales, spirilingues.*

5. S. fuciformis.

Le Sphinx vert à aîles transparentes.

Long. 10 lig.

S. spirilinguis viridis alis vitreis pellucidis, venis limboque fusco-ferrugineis.

Loc.

6. S. ſtellarum.

Le Moro-Sphinx.

Long. 13 lig.

S. ſpirilinguis, alis ſuperioribus fuſcis nebuloſis, inferioribus ferrugineis.

Loc. Larva habitat gallium.

7. S. liguſtri.

Le Sphinx du troëne.

Long. 22 lig.

S. ſpirilinguis, alis ſuperioribus fuſcis, inferioribus abdomineque faſciis tranſverſis rubris.

Loc. Larva habitat liguſtrum.

8. S. atropos.

Le Sphinx à tête de mort.

Long. 2 pouc. $\frac{1}{3}$. Larg. 9 lig.

S. ſpirilinguis, alis ſuperioribus fuſco-nebuloſis, inferioribus abdomineque faſciis tranſverſis luteis, thorace maculis caput mortuum referentibus.

Loc.

9. S. convolvuli.

Le Sphinx à cornes de bœuf.

Long. 2 pouces.

S. ſpirilinguis alis omnibus fuſcis, faſciis dentatis obſcurioribus, abdomine faſciis tranſverſis rubris.

Loc. Larva habitat convolvulum.

10. S. elpenor.

Le Sphinx de la vigne.

Long. 16 lig.

S. ſpirilinguis, alis viridi purpureoque faſciatis, faſciis linearibus tranſverſis.

Loc. Larva habitat vitem.

11. S. euphorbiæ.

Le Sphinx du tithymale.

Long. 17 lig.

S. ſpirilinguis, alis viridi fulvo purpureoque varie faſciatis & maculatis ſubtus purpureis.

Loc. Larva habitat tithymalum.

12. S. porcellus.

Le Sphinx à bandes rouges dentelées.

Long. 1 pouce.

S. ſpirilinguis, alis viridi purpureoque faſciatis faſciis ſerratis tranſverſis.

Loc. Idem.

FAMILIA III. *Antennæ priſmaticæ in medio craſſiores, ſpirilingues. Larva villoſo, non cornigera.*

13. S. filipendulæ.

Le Sphinx belier.

Long. 8 $\frac{1}{2}$ lig.

S. ſpirilinguis, alis ſuperioribus ſubcœruleis punctis ſex rubris, inferioribus rubris.

Varietas A. Sphinx ſpirilinguis, alis rubris, ſuperioribus limbo maculiſque ſex nigris.

Loc. Larva habitat filipendulam, gramen.

LXXII. PTEROPHORUS. *Le Pterophore.*

Antennæ filiformes.
Lingua ſpiralis.
Alæ ramoſæ, ramis piloſis.
Chryſalis nuda, horizontalis.

1. P. pentadactyla.
Le Pterophore blanc.
Long. 1 pouce.
P. albus, alis ſuperioribus bipartitis, inferioribus tripartitis.
Loc.

2. P. didactyla.
Le Pterophore brun.
Largeur 10 lig.
P. fuſcus, alis ſuperioribus, apice bipartitis, inferioribus tripartitis.
Loc. Larva habitat convolvulum.

3. P. hexadactyla.
Le Pterophore en éventail.
Larg. 6 lig.

P. cinereus, fusco maculatus, alis superioribus octo partitis, inferioribus quadripartitis.

Loc. Larva habitat lonyceram periclymenum.

LXXIII. PHALŒNA. *LA PHALENE.*

Antennæ à basi ad apicem decrescentes.
Chrysalis in puppa.
Larva nuda.

FAMIL. I. *Pectinicornes.*

§. I.

Elingues alis reflexis.

1. P. pavonia major.
Le grand Paon de nuit.

Larg. 5 $\frac{1}{2}$ pouc. Long. 2 pouc.

P. pectinicornis elinguis, alis cinereo-fuscis, planiusculis, singulis ocello, major.

Loc. Larva habitat prunum, malum armenam.

2. P. pavonia media.
Le Paon moyen.

P. pectinicornis elinguis, alis cinereo fuscis planiusculis, singulis ocello, minor.

Loc. Larva habitat prunum, malum armenam.

3. P. pavonia minor.

Le petit Paon.

Larg. 2 pouc. 5 lig. Long. 11 lig.

P. pectinicornis elinguis alis planiusculis ferrugineo fluteoque variis, singulis ocello fasciâque fuscâ. *Masc.*

P. pectinicornis elinguis, alis planiusculis cinereis in medio albidis, singulis ocello fasciâque fuscâ. *Fœmina.*

Loc. Larva habitat rubum & rosam.

4. P. cossus.

Le Cossus.

Long. 15 lig.

P. pectinicornis, elinguis, alis albo-cinereis, striis transversis nebulosis nigris, abdomine annulis albis.

Loc. Larva habitat lignum salicis.

5. P. vinula.

La Queue fourchue.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis albidis diaphanis, vasis obscuris.

Loc. Larva habitat salicem & populum.

6. P. purpurata.

L'Ecaille mouchetée.

Larg. 22 lig. Long. 10 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis, superioribus flavis, inferioribus rubris, nigro maculatis.

Loc. Larva habitat ranunculum.

7. P. villica.

L'Ecaille marbrée.

Long. 1 pouce.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis, superioribus atris, areis flavescentibus, inferioribus luteis nigro maculatis, abdomine rubro.

Loc. Larva habitat ulmum.

8. P. caja.

L'Ecaille martre ou hérisson.

Long. 1 pouce.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis; superioribus fuscis, rivulis albis inferioribus purpureis, punctis sex nigris.

Loc. Larva habitat ulmum.

9. P. monacha.

L'Ecaille couleur de rose.

Long. 10 lig.

P. pectinicornis elinguis alis deflexis; superioribus albis, rivulis transversis nigris, inferioribus roseis, maculâ triplici nigrâ.

Loc.

10. P. testudinaria.

L'Ecaille brune.

Long. 8 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis, superioribus fuscis, maculis luteis, inferioribus rubris maculis quatuor nigris.

Loc.

11. P. quercifolia.

La Feuille-morte.

Long. 15 lig.

P. pectinicornis elinguis, tota rufa, alarum margine ferrato.

Loc. Larva habitat gramen.

12. P. cristata.

La Crête de coq.

Long. 8 lig.

P. pectinicornis elinguis, pallido-rufâ cristâ dorsali nigrâ.

Loc.

13. P. quercûs.

Le Minime à bande.

Long. 1 pouce 9 lig.

P. pectinicornis elinguis rufa, alis rotundatis fasciâ pallidiore, superioribus puncto albo.

Loc. Larva habitat fol. quercûs, ulmi, corni, ribesiæ.

14. P. dispar.

Le Zig-zag.

Long. 1 pouce.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis albis, fasciâ quadruplici transversâ nigrâ, acute undulatâ.

Loc. Larva habitat ulmum.

15. P. pudibunda.

La Patte étendue.

Long. 1 pouce.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis, cinereo-undulatis, fasciis transversis obscurioribus, capite inter pedes porrectos.

Loc. Larva habitat prunum, &c.

16. P. annularis.

La Livrée.

Long. 8 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis pallidis, fasciâ alarum transversali saturatiore.

Loc. Larva truncos arborum habitat, abundans.

17. P. palladia.

La Phalène chouette.

Long. 5, 7 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis, superioribus fasciis pallido flavis nigrisque alternis longitudinalibus, inferioribus croceis fasciâ marginali nigrâ.

Loc.

18. P. mori.

Le Ver-à-ſoie.

P. pectinicornis elinguis tota alba, alis reflexis, bombix dicta.

Loc. Habitat provincias meridionales.

19. P. ſalicis.

L'Apparent.

Long. 11 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis albis, pedum annulis antenniſque nigris.

Loc. Larva habitat ſalicem.

20. P. chryſorrhæa.

La Phaléne blanche à cul brun.

Long. 9 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis albis, fœminæ ano piloſo ferrugineo.

Loc. Larva habitat arbores quaſcumque.

21. P. lubricipeda.

La Phaléne tigre.

Long. 9 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis albidis, punctis nigris; abdomine ordinibus quinque punctorum.

Loc. Larva habitat pomiferas arbores.

22. P. vernalis.

La Printaniere.

Long. 11 lig.

P. pectinicornis elinguis albida nigro punctata, alis deflexis, superioribus fasciâ duplici fuscâ dentatâ nigro terminatâ.

Loc.

23. P. antiqua.

L'Etoilée.

Long. 7 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis rotundatis fusco-ferrugineis superioribus maculâ albâ anguli ani; fœminâ apterâ.

Loc. Larva habitat prunum.

24. P. pomona.

La Phalène jaune à aîles vertes.

Long. 6 lig.

P.

P. pectinicornis elinguis, antennis & corpore luteis, alis deflexis viridibus.

Loc.

25. P. rosea.

La Rosette.

Long. 6 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis roseis, superioribus punctorum arcuumque ordine duplici.

Loc.

26. P. libatrix.

La Découpure.

Long. 10 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis cinereo flavoque rufis margine laceris.

Loc.

27. P. cœruleo-cephala.

Le Double-Oméga.

Long. 10 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis fuscis maculâ duplici albido flavescente geminatâ.

Loc. Larva habitat pyrum, cerasum, &c.

28. P. bucephala.

La Lunule.

Long. 11 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis tectiformibus, superioribus cinereis, fasciâ duplici ferrugineâ, & extremo circulariter pallescente, subtus omnibus flavescentibus, fasciâ undulatâ fuscâ.

Loc. Larva habitat tiliam & ulmum.

29. P. venosa.

Le Bois veiné.

Long. 7 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis exterioribus fuscis, venis plurimis, fasciâ circulari, & marginis interioris appendice nigricantibus; inferioribus albidis limbo lineari fusco.

Loc.

30. P. achatæa.

La Phalêne agathe.

Long. 9 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis superioribus cinereis fusco marmoratis, inferioribus cinereis.

Loc.

31. P. bi-punctata.

Le Double point.

Long. 8 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis cinereis, limbo nigro punctato, superioribus fasciâ duplici nigro luteâ, maculâque duplici albâ puncto nigro insignitâ.

Loc.

32. P. jaspoides.

La Phalêne jaspée.

Long. 9 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis margine sinuatis, fulvo nigro fusco roseoque marmoratis, singulis subtus puncto nigro, superioribus extremo dilatato recurvis.

Loc.

33. P. glauca.

La Phalêne-verdelet.

Long. 6 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis viridibus; limbo maculâque anguli ani cinereo fuscis.

Loc. Larva habitat ilicem

34. P. sanguinolenta.

L'Ensanglantée.

Long. 6 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis luteo rubris, fasciâ duplici transversâ sanguineâ.

Loc. Larva habitat acetosam.

35. P. minutella.

La Mignonette.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

P. pectinicornis elinguis cinerea, alis ciliatis.

Loc.

* 36. P. subrubescens.

La Phaléne briquetée.

Long. 8 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis den-

tatis ſanguineo fuſcis, faſciis pallidioribus, interioribus angulo ani nigricante.

Loc.

* 37. P. inordinata.

La Griffonnée.

Long. 7 ½ lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis cinereis, lineis tranſverſis nigris acute undulatis, faſciis alternatim pallidioribus.

Loc.

* 38. P. obſcura.

L'Obſcure.

Long. 4 ½ lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis nigro-fuſcis, ſuperioribus poſtice maculâ duplici fulvâ.

Loc.

39. P. areolata.

La Bordure à plaques.

Long. 4 ½ lig.

P. pect. el., alis def. albis, maculâ inæquali transversâ margineque interrupto fuscis.

Loc.

* 40. P. punctata.

La Nervure picotée.

Long. 6 lig.

P. pect. el., alis def. fusco-cinereis, nervis nigro punctatis.

Loc.

41. P. zona.

La Zone.

Long. 8 lig.

P. pect. el., alis patentibus angulatis fusco-luteis, fasciâ duplici transversâ.

Loc. Larva habitat ilicem.

42. P. angulata.

L'Anguleuse.

Long. 4 ½ lig.

P. pect. el., alis pat. angulatis cinereis, fasciâ duplici transversâ, punctoque obscuriore, atomis cinerascentibus.

Loc.

43. P. bicincta.

La Double ceinture.

Long. 3 ½ lig.

P. pect. el., alis pat. flavis, lineis superne tribus, inferne duabus transversis fuscis.

Loc.

* 44. P. monilifera.

La Phalène à bracelets.

Long. 5 lig.

P. pect. el., alis pat. cinereo-fuscis punctis lineisque transversis nigris, pedibus albo nigroque intersectis.

Loc.

* 45. P. simplex.

La Grisonnette.

Long. 6 lig.

P. pect. el., alis pat. cinereo-pallidis, punctis lineisque transversis nigris, pedibus albidis.

Loc.

§. II.

Linguatæ alis deflexis.

46. P. vulpinaria.

La Bordure enſanglantée.

Long. 10 lig.

P. pectinicornis ſpirilinguis, alis deflexis pallido luteis limbo roſeo, ſuperioribus maculâ, inferioribus faſciâ duplici fuſcâ.

Loc.

47. P. ſtuticus.

La Turquoiſe.

Long. 6 lig.

P. pect. ſp. viridi-cœrulea nitens, alis inferioribus fuſcis.

Loc.

48. P. triſtis.

Le Phalène brune à aîles inférieures blanches.

Long. 7 lig.

P. pect. sp. alis deflexis nigro fuscoque undulatis, inferioribus albis.

Loc.

49. P. domialla.

La Damerette.

Long. 4 ½ lig.

P. pect. sp. triangularis, alis deflexis nigro-roseis, fasciis transversis nigricantibus.

Loc.

50. P. frontana.

Le Toupet-tanné.

Long. 5 lig.

P. pect. sp., corniculis cristatis, alis deflexis ochroleucis, lineâ duplici transversâ saturatiore.

Loc.

§. III.

Linguatæ alis planis.

51. P. lactea.

La Laiteuse.

Long. 3 lig. Larg. 7 lig.

P. pect. sp. alis patentibus rotundatis niveis, corpore flavo.

Loc.

52. P. fulvicans.

La Phalène striée fauve.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouce.

P. pect. sp., alis pat. albido-luteis, omnibus fulvo transversim dense striatis.

Loc.

53. P. cinerata.

Le Damas cendré.

Long. 4 lig. Larg. 8 lig.

P. pect. sp. alis pat. cinereis, superiorum margine exteriore maculâ triplici nigro-fuscâ.

Loc.

54. P. inæqualis.

La Bande inégale.

Long. 7 lig. Larg. 13 lig.

P. pect. sp., alis pat. cin., fusco-nebulosis, lineis transversis inæqualibus.

Loc.

55. P. arrriosa.

La Bande rouge.

Long. 6 lig. Larg. 13 lig.

P. pect. sp., alis pat. luteis, fasciâ transversâ rubrâ.

Loc.

56. P. marginalis.

La Bande à point marginal.

Long. 5 lig.

P. pect. sp., alis pat. cinereo-obscuris, lineâ fasciâque alarum transversâ obscuriore, puncto marginali nigro.

Loc.

57. P. picta.

La Rayure jaune picotée.

Long. 5 lig.

P. pect. sp. alis pat. flavescentibus, fasciis plurimis transversis, nonnullis connexis atomisque fuscis.

Loc.

58. P. Bandevillæa.

La Grisaille.

Long. 11, 12, 14 lig.

P. pect. sp., alis pat. cinereis, atomis maculisque nigris.

Loc.

* 59. P. fimbriata.

La Frange pourprée.

Long. 4 ½ lig.

P. pect. sp., alis pat. angulatis flavescentibus, fasciis tribus connexis fuscis, limboque rubro, subtus punctatis.

Loc.

* 60. P. nayas.

La grande Nayade.

Long. 6 lig.

P. pect. sp. alis pat. aqueo-viridibus, lineâ duplici transversâ albâ, antennis niveis.

Loc.

* 61. P. Malletina.

La Bordure maculée.

Long. 5 lig.

P. pect. sp. alis pat. cinereis, superiorum margine extremo maculis quatuor oblongis fuscis, limbo fusco.

Loc.

* 62. P. atomifera.

Le Damas blanc.

Long. 5 ½ lig.

P. pect. sp., alis pat. albis, fasciis tribus atomisque lutescentibus, oculis nigris.

Loc.

* 63. P. geminata.

La Bimaculée.

Long. 7 lig.

P. pect. sp., alis pat. cinereis fasciis transversis obscurioribus, punctisque nigris.

Loc.

* 64. P. virginalis.

La Virginale.

Long. 5 ½ lig.

P. pect. sp., alis pat. albis inferioribus puncto nigro.

Loc.

* 65. P. carthesiana.

La Piqûure.

Long. 5 ½ lig.

P. pect. sp., alis pat. fuscis atomis obscuris.

Loc.

* 66. P. nitidula.

La Brillante.

Long. 5 ½ lig.

P. pect. sp., alis pat. albis nitentibus, atomis cinereis punctoque superiorum nigro.

Loc.

* 67. P. miliata.

La Pointillée.

Long. 3 lig.

P. pect. sp., alis pat. cinereis, fuscis margineque nigro punctatis.

Loc.

68. P. immutata.

Les Atomes à une bande.

Long. 6 lig.

P. pect. sp., alis pat. albidis, atomis cinerascentibus, & fasciâ undulatâ ferrugineâ.

Loc.

FAMIL. II. *Antennis filiformibus.*

§. I.

Linguatæ alis planis.

69. P. microcosma.

La Rayure blanche picotée.

Long. 5 lig. Larg. 13 lig.

P. seticornis, spirilinguis alis patentibus cinereis, fasciis plurimis transversis nonnullis connexis, atomisque fuscis.

Loc.

70. P. clathrata.

Les Barreaux.

Long. 5 lig. Larg. 11 lig.

P. set. sp., alis pat. fuscis, utrinque maculis albis quadranguli tesselatis.

Loc.

71. P. hortulana.

La Queue jaune.

Long. 7 lig.

P. set. sp. alis pat. albo fuscoque nebulosis, ano flavo.

Loc. Larva habitat urticam.

72. P. glyphica.

La Doublure jaune.

Long. 6 lig.

P. set. sp., alis pat. supra fuscis pone subtusque flavescentibus.

Loc.

73. P. grossulariata.

La Mouchetée.

Long. 8 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ pouce.

P. set. sp., alis pat. albis, maculis inæqualibus nigris plurimis, fasciâque transversâ luteâ.

Loc. Larva habitat grossulariam.

74. P. papilionaria.

Le Celadon.

Long. 9 lig. Larg. 21 lig.

P. set. sp., alis pat. sinuatis, pallido-glaucis, fasciâque transversâ obscuriore.

Loc. Larva habitat ilicem.

75. P. ſambucaria.

La Souffrée à queue.

Long. 10 lig.

P. ſet. ſp. alis pat. ſulphureis, lineâ duplici tranſvertâ obſcuriore, inferioribus caudatis.

Loc. Larva habitat ſambucum.

76. P. luteola.

La Citronelle rouillée.

Long. 7 lig. Larg. 15 lig.

P. ſet. ſp., alis pat. luteis, duplici punctorum cinereorum ordine, ſuperioribus maculis duabus & rachi croceo-ferrugineis.

Loc.

77. P. marginata.

La Bordure entrecoupée.

Long. 6 lig. Larg. 11 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albis, margine undique interrupte fuſcis.

Loc.

78. P. panthera.

La Phalène panthère.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouce.

P. set. spiril., alis pat. flavis, maculis numerosis fuscis.

Loc.

79. P. atomosa.

Les Atômes à deux bandes.

Long. 5 ½ lig. Larg. 1 pouce.

P. set. spiril., alis pat. albidis, atomis cinerascentibus, & fasciâ duplici undulatâ ferrugineâ.

Loc.

* 80. P. herbacea.

L'Herbacée.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., alis pat. viridibus dentatis, lineâ duplici transversâ albâ.

Loc.

81. P. bolonienſis.

La Phalène blanche à tache & bande noires.

Long. 4 lig. Larg. 9 lig.

P. set. spiril., alis pat. albis, superioribus maculâ nigrâ & fasciâ duplici in extremo undulatâ.

Loc.

82. P. intersecta.

La Bande interrompue.

Long. 4 ½ lig. Larg. 8 lig.

P. set. spiril., alis pat. niveis, omnibus pone fasciâ undulatâ fuscâ, superiorum margine externo maculis nigris.

Loc.

83. P. stratiolata.

La Phalêne grise à lignes brunes & point noir.

Long. 3 ½ lig. Larg. 9 lig.

P. set. sp. alis pat. cinereis, fasciis linearibus fuscis, punctoque nigro.

Loc. Larva aquatica habit. stratiot. & Potomageton.

84. P. strigata.

La Phalêne blanche à lignes brunes sans points.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouce.

P. set. spiril., alis pat. albis, lineâ duplici undulatâ subfuscâ.

Loc.

85. P. brocatella.

La Brocatelle d'or.

Long. 5 lig. Larg. 11 lig.

P. set. spiril., alis pat. luteis, lineolis fuscis & albidis undulatis limbo dentato.

Loc. Larva habitat ilicem & ulmum.

86. P. alabastrina.

La Brocatelle d'argent.

Long. 5 lig. Larg. 10 lig.

P. set. spiril., alis pat. albis, lineolis fasciisque plurimis undulatis fuscis, limbo subdentato.

Loc.

87. P. fuscata.

La Brocatelle brune.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., alis pat. cinereis, fasciis plurimis fuscis undulatis transversis, limbo subdentato.

Loc.

88. P. circulifera.

Les quatre Omicrons.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., alis pat. albis, singulis fasciâ undulatâ serratâ, & omicro albis.

Loc.

89. P. plebeia.

La Nervure brune.

Long. 3 ½ lig.

P. set. spiril., alis pat. cinereis, margine exteriore fusco, punctoque alarum nigro.

Loc.

90. P. virgata.

La Phalêne à bandes vertes.

Long. 5 lig. Larg. 11 lig.

P. set. spiril., alis pat. viridi fuscoque variegatis, fasciâ triplici undulatâ obscuriore.

Loc.

* 91. P. alternata.

La Veinée.

Long. 5 ½ lig.

P. set. spiril., alis pat. fasciis transversis albis fuscisque alternis.

Loc.

92. P. hieroglyphica.

L'Hyéroglyphe.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., alis pat. dentatis cinereis, superioribus litteris duabus & margine fuscis.

Loc.

93. P. undulosa.

L'Ondoyante.

Long. 3 lig.

P. set. spiril., alis pat. albido-glaucis, fasciis arcuatis obscurioribus.

Loc.

94. P. syrene.

La petite Nayade.

Long. 3 ½ lig.

P. set. spiril., alis pat. è viridi glaucis, fasciâ duplici albidâ.

Loc.

* 95. P. humeralis.

L'Humérale.

Long. 5 lig.

P. set. spiril., alis pat. albis, humeris fasciâque transversâ nigro fulvis.

Loc.

* 96. P. pilosellæ.

L'Auripeau.

Long. 5 ½ lig.

P. set. spiril., alis. pat. flavescentibus, fasciis inæqualibus obscuris punctoque nigro.

Loc.

* 97. P. aurantiaca.

La Bande orangée.

Long. 6 lig.

P. set. spiril., alis pat. flavescentibus, fasciis aurantiis, circumflexis.

Loc.

* 98. P. lunularis.

La Phalène en croissant.

Long. 4 lig.

P. set. spiril. alis pat. cinereis nitentibus, superiorum puncto nigro, fasciâque marginali arcuatâ albâ.

Loc.

99. P. prolongata.

L'Apostrophe.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril., alis pat. albis, superioribus puncto prolongato atro.

Loc.

100. P. asparagi.

La Damassée à points.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril. alis pat. albidis nitentibus singulis puncto nigro, fasciisque undulatis obscuris.

Loc.

101. P. cordigera.

La Ceinture brune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril., alis pat. albidis, fasciis obscuris singulis puncto nigro fasciâque latâ undulatâ fuscâ.

Loc

* 102. P. eremitica.

La Zone blanche.

Long. 3 lig.

P. set. spiril., alis pat. nigris, maculis fasciàque transversâ arcuatâ albâ, margine alarum albido.

Loc.

* 103. P. albeola.

La Blanchette à points.

Long. 3 ½ lig.

P. set. spiril., alis pat. albidis, singulis punctulo nigro.

Loc.

§. II.

Linguatæ, alis deflexis.

104. P. plantaginis.

La Phaléne chinée.

Long. 11 lig.

P. set. spiril., alis deflexis, superioribus atris rivulis flavis, inferioribus rubris maculis nigris.

Loc. Larva habitat plantaginem.

105. P. jacobeæ.

La Phalêne carmin du ſéneçon.

Long. 8 lig.

P. ſet. ſpiril. alis ſuperioribus fuſcis, lineâ punctiſque duobus rubris, inferioribus rubris.

Loc. Larva habitat ſenecionem & jacobæam.

106. P. pronuba.

La Phalêne hibou.

Long. 1 pouce.

P. ſet. ſpiril., alis incumbentibus, exterioribus cæſiis nebuloſis, inferioribus luteis faſciâ atrâ marginali.

Loc. Larva habit. thlaſp. & cruciferas.

107. P. altica.

La Phalêne brune à tache jaune aux aîles inférieures.

Long. 5 lig.

P. ſet. ſpiril., alis deflexis, ſuperioribus nebuloſo-fuſcis, inferioribus nigris, maculâ margineque luteis.

Loc.

108. P. triplicata.

La Rayure à huit lignes.

Long. 8 lig.

P. set. spiril., alis def. cinereis, fasciis transversis fuscis e triplici lineâ compositis.

Loc.

109. P. rubricollis.

La Veuve.

Long. 8 lig.

P. set. spiril., alis def. nigricantibus, collari purpureo, abdomine flavo.

Loc.

110. P. leucormelas.

L'Alchymiste.

Long. 10 lig.

P. set. spiril., alis def. undulato nigris, inferioribus basi albis.

Loc.

111. P. chrysitis.

Le Vert doré.

Long. 8 lig.

P. set. spiril., alis def. ferrugineo-fuscis fasciâ duplici transversâ viridi-aureâ.

Loc.

112. P. pacta.

La Likenée rouge.

Long. 18 lig.

P. set. spiril. alis def. superioribus cinereo fuscoque nebulosis, inferioribus rubris, fasciâ duplici transversâ nigrâ.

Loc. Larva habitat arbores.

113. P. fraxini.

La Likenée bleue.

Long. 2 pouc.

P. set. spiril., alis def., superioribus cinereo fuscoque undulatis, inferioribus nigris, fasciâ transversâ cœruleâ.

Loc. Larva habitat fraxin. rarissima.

114. P. meticulosa.

La Meticuleuse.

Long. 10 lig.

P. set. spiril., alis def., margine erosis, cinereo-fuscis, superioribus triangulo marginali fuscescente incarnatum includente; thorace gibbo.

Loc. Larva habit. pimpriſellam, absinthium, &c.

115. P. mediata.

L'Aîle brune à base fauve.

Long. 7 lig.

P. set. spiril., alis def. fuscis, superioribus lineis rufis, basique maculâ fulvâ.

Loc.

116. P. fluctuans.

Le Flot.

Long. 1 pouce.

P. set. spiril., alis def. cinereo-fuscis, superioribus fasciâ undosâ triplici, punctoque obscuro marmoratis.

Loc.

117. P. tripartita.

La Phaléne blanchâtre à deux bandes brunes.

Long. 7 lig.

P. set. spiril., alis def. albo-flavescentibus, fasciâ duplici transversâ fuscâ.

Loc.

118. P. inchoata.

La Tache marginale.

Long. 5 lig.

P. set. spiril., alis def. albido-flavescentibus, fasciâ marginali oblongâ fuscâ.

Loc.

119. P. quatrilis.

La Phaléne jaune à quatre points.

Long. 6 lig.

P. set. spiril., alis def. flavescentibus, superioribus singulis punctis duobus fuscis.

Loc. Larva habitat ulmum.

120. P. decolorata.

La Décolorée.

Long. 7 lig.

P. set. spiril., alis def. albido fulvis immaculatis.

Loc.

121. P. psi.
Le Psi. ψ.
Long. 9 lig.
P. set. spiril., alis def. canis, maculis psiformibus nigris.
Loc. Larva habitat poma.

122. P. gamma.
Le Lambda.
Long. 9 lig.
P. set. spiril., alis def. exterioribus fuscis, lambda græco inscriptis.
Loc. Larva habitat acetosellam, &c.

123. P. omicron.
L'Omicron nébuleux.
Long. 11 lig.
P. set. spiril., alis def., superioribus cinereo fuscoque nebulosis, lineis undulatis & omicro nigris, inferioribus cinereis.
Loc. Larva habitat ilicem, betulam, &c.

124. P. graphica.
L'Omicron géographique.
Long. 7 lig.

P. set. spiril., alis def. superioribus fuscis, lineis undulatis & omicro albis, inferioribus cinereis.

Loc.

125. P. iota.

L'Iota.

Long. 9 lig.

P. set. spiril., alis def. albido-cinereis, lineis longis nigris.

Loc. Larva habitat absinthium, abrotanum, santolinam.

126. P. verbasci.

La Striée brune de verbascum.

Long. 9 lig.

P. set. spiril., alis def., fusco-cinereis, superioribus fuscis longitudinaliter striatis.

Loc. Larva habitat verbascum, scrophulariam, amygdalum.

* 127. P. zonata.

La Double zone.

Long. 5 ½ lig.

P. set. spiril., alis def. lutescentibus, fasciâ duplici transversâ fuscâ.

Loc.

128. P. herminata.

La Phalêne petit gris.

Long. 6 lig.

P. set. spiril., alis def. fusco-nebulosis, superioribus maculis irregularibus albis.

Loc.

129. P. navicularis.

La Brunette à aîles inférieures rougeâtres.

Long. 11 lig.

P. set. spiril., alis def., superioribus fuscis, lineis transversis undulatis nigris, inferioribus ferrugineis.

Loc.

130. P. serrata.

La Dent de scie.

Long. 8 lig.

P. set. spiril., alis subdeflexis, exterioribus cœsio purpureis, fasciis transversis undulatis, interioribus pallidis, omnibus margine serrato.

Loc. Larva habitat humum.

131. P. bimaculata.

La Double tache.

Long. 8 lig.

P. set. spiril., alis def., superioribus ferrugineo cinereis, maculâ duplici longâ rotundâque nigrâ, inferioribus albidis.

Loc.

132. P. tessellata.

La Frange bigarrée.

Long. 7 lig.

P. set. spiril., alis def. fusco-nebulosis, limbo tessellato, superioribus maculâ duplici punctoque albis.

Loc. Larva habitat linariam.

133. P. xi.

L'Ix.

Long. 6 lig.

P. set. spiril. alis def. cinereis, superioribus fasciâ decussatâ fuscâ, puncto nigro, lineisque transversis albidis.

Loc.

134. P. astroites.

La Phalène noire à une tache blanche sur chaque aîle.

Long. 6 lig.

P. set. spiril., alis def. atris, singulis maculâ albâ.

Loc.

135. P. constellata.

La Phalène noire à deux taches blanches sur chaque aîle.

Long. 7 lig.

P. set. spiril., alis def. nigris, singulis duabus maculis, & lineis undulatis albis.

Loc.

136. P. funebris.

La Phalene noire à lignes blanches.

Long. 6 lig.

P. set. spiril., alis def. nigris, lineis punctis albis.

Loc.

137. P. bifasciata.

La Phalène brune à deux bandes blanches.

Long. 3 ½ lig.

P. set. spiril., alis def. fuscis, superioribus fasciâ duplici obliquâ albâ.

Loc.

138. P. nacarata.

Le Nacarat.

Long. 6 lig.

P. set. spiril., alis roseo purpureoque variegatis, superioribus maculâ duplici marginali albâ.

Loc. Larva habitat ulmum.

139. P. incarnata.

L'Incarnat.

Long. 7 lig.

P. set. spiril., alis def. roseis, superioribus fasciâ duplici limboque albidis.

Loc.

140. P. areolata.

La Plaque dorée.

P. set. spiril., alis def. nigro fuscis, maculis plurimis albido-flavescentibus.

Loc. Larva habitat brassicam.

141. P. forficalis.

La Bande esquissée.

Long. 6 lig.

P. set. spiril. triangularis, alis deflexis flavis, lineis duabus ferrugineis obliquis.

Loc. Larva habitat brassicam.

142. P. inversa.

La Bande à l'envers.

Long. 7 lig.

P. set. spiril. triangularis, alis def. albo-virescentibus, subtus lineis duabus transversis nigris.

Loc.

143. P. erecta.

La Phalène à ventre relevé.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril. triangularis, alis superioribus fusco-purpureis, fasciâ transversâ albido-ferrugineâ, abdomen suprà protendens.

Loc.

144. P. lemopicta.

La Phalène quadrille.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril., alis def., superioribus nigris, punctis quatuor albis, inferioribus flavis fusco marginatis.

Loc.

145. P. virginea.

L'Albâtre.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril. alba, oculis nigris, antennis pedibusque subflavescentibus.

Loc.

146. P. verrucosa.

Le Toupet à points.

Long. 6 lig.

P. set. spiril., corniculis magnis cristatis alis fusco-fumosis, medietate posticâ albidiore, punctis verrucosis eminentibus.

Loc.

147. P. argyrata.

La Phalène à trois bandes argentées.

Long. 1 lig.

P. set. spiril., alis def. nigris, fasciis tribus argenteis transversis, tertiâ interruptâ.

Loc. Larva habitat cerefolium sylvestre.

148. P. cappata.

La Chappe brune.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., humeris latis, ferrugineo-fusca, fasciis tribus transversis saturatioribus.

Loc.

149. P. umbratilis.

La Chappe à bande & tache brune.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., humeris latis, aurato-flavescens, alarum fasciâ transversâ maculâque duplici fuscâ.

Loc.

150. P. densata.

La Chappe brune au sautoir.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., humeris latis, alis anticè pallidis fasciâ obliquâ fuscâ, pone fuscis fasciâ maculâque cinereis.

Loc. Larva habitat acerem.

151. P. angulosa.

La Chappe jaune à bande brune.

Long. 2 ½ lig.

P. set. spiril., hum. latis, flava, fasciâ transversâ fuscâ.

Loc.

152. P. nitens.

La Chappe bronzée.

Long. 3 lig.

P. set. spiril., hum. latis, fusco-aurea, fasciâ duplici auratâ, maculâ purpureâ.

Loc.

153. P. flavipes.

La Chappe verte.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., hum. latis, antennis flavescentibus, alis dilute virescentibus.

Loc. Larva habitat folia ilicis.

154. P. nacellaris.

La Chappe verte à bande.

Long. 9 lig.

P. set. spiril., hum. latis, alis viridibus, lineâ duplici transversâ albidâ.

Loc. Idem.

155. P. fulvicornis.

La Phaléne verte ondée.

Long. 7 lig.

P. set. spiril., alis def. viridibus, fasciâ duplici transversâ saturatiore.

Loc.

156. P. culiciformis.

La Phalêne culiciforme de l'éclaire.

Long. 2, 3 lig.

P. set. planilinguis, corpore roseo alis rotundatis planiusculis niveis, singulis puncto cinereo.

Loc. Larva habitat chelidonium majus.

* 157. P. duplicata.

La Phalêne à nervures noires.

Long. 7, 8 lig.

P. set. spiril. alis def. albis inferne nervis nigris.

Loc.

* 158. P. hilaris.

La Coquette.

Long. 13 lig.

P. set. spiril., dense villosa alis albis, maculis nigro-cœruleis conspersa.

Loc.

159. P. irregularis.

La Clair-obſcure.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis ſuperioribus maculis irregularibus nigro-fuſcis, limbo pallido; inferioribus fuſcis, macularum albidarum ſerie duplici tranſversâ.

Loc.

160. P. fuſcoptera.

La Phalêne à trois points.

Long. 3 ½ lig.

P. ſet. ſpiril., corpore flavo, oculis nigris, alis fuſcis ſuperioribus punctis tribus albis, inferioribus baſi flavis.

Loc.

161. P. dianæa.

La Lunaire.

Long. 9 lig.

P. ſet. ſpiril., alis cinereis, margine interiore, & exteriore fuſcis, interne lunulâ.

Loc.

* 162. P. circulata.

Le Cerceau pointillé.

Long. 9 lig.

P. set. spiril., alis fusco-cinereis punctis nigris fasciatim dispositis, & maculâ circulari.

Loc.

* 163. P. hesperidea.

L'Orangère.

Long. 6 lig.

P. set. spiril., alis aurantiis, inferioribus basi fasciâque nigrâ.

Loc.

* 164. P. graminea.

Le Lampas vert.

Long. 5 ½ lig.

P. set. spiril., alis viridescentibus, fasciis irregularibus albis nigro terminatis.

Loc.

* 165. P. usta.

La Phalène brûlée.

Long. 1 lig.

P. set. spiril., alis cinereo-nigris, & veluti deustis.

Loc.

* 166. P. millesima.

La Millerage.

Long. 7 lig.

P. set. spiril., alis albis, nervis longitudinalibus lutescentibus densis.

Loc.

* 167. P. heraclitæa.

Le Funéraire.

Long. 6 lig.

P. set. spiril. fusca, alis superioribus maculis albidis longitudinaliter & transversim positis.

Loc.

* 168. P. pulchella.

La Mignogne.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., alis def. albis, lineis undulatis nigris, maculâ triplici obscurâ, pedibus nigro intersectis.

Loc.

* 169. P. marina.

La Phaléne ondée.

Long. 6 lig.

P. set. spiril. alis def. fuscis, fasciâ latâ transversâ, punctoque obscuriore.

Loc.

* 170. P. chryso-pallida.

La Damassée jaune.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., alis pallidis, fasciis undulatis luteis, mediâ latiore fuscâ, puncto nigro.

Loc.

* 171. P. antrorum.

La Damassée brune.

Long. 7 lig.

P. set. spiril., alis def. fuscis, fasciis undulatis albis, subtus puncto nigro.

Loc.

* 172. P. nocturna.

La Nocturne.

Long. 5 lig.

P. set. spiril., alis def. fuscis, supra lineis quatuor undulatis obscurioribus.

Loc.

* 173. P. mandarina.

La Mandarine.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. set. spiril., alis def. fuscis, omnibus inferne, inferioribus supra fasciâ transversâ croceâ.

Loc.

* 174. P. ocularis.

L'Oculaire.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., alis corporis circumvolutis cinereis, albicantibus, maculâ internâ connexâ fulvâ.

Loc.

* 175. P. pomacea.

L'Omicron vert.

Long. 8 lig.

P. set. spiril., alis def. fuscis superioribus maculâ albâ fasciis undulatis, omicro viridibus inferioribus cinereis.

Loc.

* 176. P. columbina.

La Gorge de Pigeon.

Long. 7 lig.

P. set. spiril. alis def. albido-roseis nitentibus fasciis undulatis fuscis.

Loc.

* 177. P. littorea.

La Brunette à taches en bordure.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., alis def. fuscis, parte anticâ obscuriore, posticâ maculâ duplici fuscâ.

Loc.

* 178.

* 178. P. multicolor.

La Marbrure brune.

Long. 5 lig.

P. set. spiril., alis deflexis, superioribus fusco fulvo albidoque marmoratis, inferioribus fuscis.

Loc.

* 179. P. fenestralis.

Le Grillage.

Long. 3 ½ lig.

P. set. spiril., alis def. fuscis antice fasciis transversis confertis albidis.

Loc.

* 180. P. donzella.

La Donzelle.

P. set. spiril., capite nigro, alis def. pallidis, superioribus fasciis albis striisque lutescentibus minute marmoratis.

Loc.

* 181. P. pretiosa.

Le Jaspe brun.

Long. 6 lig.

P. set. spiril., alis def. cinereis, fusco nigroque marmoratis nitentibus.

Loc.

* 182. P. opalæa.

L'Opale.

Long. 6 lig.

P. set. spiril., alis def. cinereo-fuscis, limbo albido fasciâ latâ sinuatâ subcœruleâ nitente.

Loc.

* 183. P. focorum.

Le Bord enfumé.

Long. 5 ½ lig.

P. set. spiril., alis def. albidis, subflavescentibus margine infimo fucescente.

Loc.

* 184. P. vinosa.

La Vineuse.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., alis def. antice albidis, posticè rubescentibus, maculâ albicante punctoque nigro.

Loc.

* 185. P. pellicea.

L'Herminée.

Long. 4 ½ lig.

P. set. spiril., alis def. fuscis, maculis latis albis numerosis connexis.

Loc.

* 186. P. doliata.

La Phalène à cerceaux jaunes.

Long. 3 lig.

P. set. spiril., alis def. fuscis, fasciis transversis flavis nonnullis connexis.

Loc.

* 187. P. franciscana.

La Brunette à ceinture.

Long. 3 lig.

P. sect. spiril. alis def. fuscis, superioribus maculis aliquot obscuris, inferioribus transversâ flavâ.

Loc.

* 188. P. ferruginea.

La Rouillée.

Long. 6 lig.

P. set. spiril., alis def. fuscis, superioribus maculis obscuris subferrugineis.

Loc.

* 189. P. arcuata.

La Grisette à zig-zag.

Long. 6 lig.

P. set. spiril., oculis nigris, antennis fulvis, alis deflexis albidis, fasciis arcuatis nigricantibus.

Loc.

* 190. P. Kermesina.

Le Velours cramoisi.

Long. 7 lig.

P. set. spiril. alis def., superioribus rubescentibus, inferioribus rubris, puncto margineque nigris.

Loc.

* 191. P. hispana.

La Doublure brune.

Long. 4 ½ lig.

P. set. spiril. alis def. infra fuscis, supra lineis undulatis fuscis.

Loc.

* 192. P. citrella.

La Jonquille.

Long. 5 lig.

P. set. spiril. alis def. flavis, areis pallidioribus.

Loc.

* 193. P. sinuosa.

La Sinuée.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., alis def. utrinque flavis, lineis undulatis fuscis.

Loc.

* 194. P. mediata.

La Ceinture grise.

Long. 4 ½ lig.

P. set. spiril. alis def. fuscis, medietate posticâ cinereâ, margine fusco.

Loc.

* 195. P. ovata.

La Tache brune.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., alis def. flavescentibus, maculâ ovatâ fuscâ.

Loc.

* 196. P. modesta.

La Modeste.

Long. 5 ½ lig.

P. set. spiril., alis def. albidis lineis transversis maculâque duplici externâ oblongâ fuscis.

Loc.

* 197. P. circumscripta.

L'Agathe brune.

Long. 6 ½ lig.

P. set. spiril., alis def. fusco-nigricantibus, alarum superiorum basi & apice pallidioribus, lineâ duplici circumscriptis.

Loc.

* 198. P. auriculata.

La Phalène à panaches.

Long. 6 ½ lig.

P. set. spiril., alis def. subrubescentibus, fasciâ transversâ lutescente, margine alarum externo intersecto.

Loc.

* 199. P. rosacea.

La Chappe couleur de rose.

Long. 3 ½ lig.

P. set. spiril., humeris latis, alis roseis, maculâ externâ margineque flavis.

Loc.

* 200. P. anglica.

La Chappe grise.

Long. 3 ½ lig.

P. sect. spiril. humeris latis, cinerea; penicillis plurimis alarum elevatis.

Loc.

* 201. P. bidella.

La Chappe bedeaude.

Long. 4 lig.

P. set. spiril., humeris latis, alis antice albis, postice fulvis.

Loc.

LXXIV. TINEA. *LA TEIGNE.*

Antennæ filiformes à basi ad apicem decrescentes.

Frons prominula.

Larva involucro tecta.

Chrysalis in involucro larvæ.

1. T. hirondinella.

La Teigne à queue d'hirondelle.

Long. 3 ½ lig. Larg. 2 lig.

T. corniculis duobus subulatis recurvis, cinerea, alis maculâ fuscâ.

Loc.

2. T. radiata.

La Teigne à bandes rayonnées.

Long. 5 lig.

T. corniculis duobus ſubulatis, alis flaveſcentibus nitidis, ſtriarum albidarum ordine duplici tranſverſo.

Loc.

3. T. corniculata.

La Teigne à rayure d'argent.

Long. 4 lig.

T. cinerea, corniculis duobus criſtatis, faſciâ alarum longitudinali argenteâ.

Loc.

4. T. evonymella.

La Teigne blanche à points noirs.

Long. 4 ½ lig.

T. alis ſuperioribus albis punctis nigris inferioribus fuſcis.

Loc. Larva ſocialis habitat folia pomorum.

5. T. arlequinetta.

L'Arlequinette jaune.

Long. 4 ½ lig.

T. alis flavis faſciis maculiſque nigris.

Loc.

6. T. pellionella.

La Teigne commune.

Long. 2 lig.

T. plumbæa nitida, puncto nigro in medio alarum.

Loc. Larva habitat vestes laneas.

7. T. plumbæa.

La Teigne plombée nébuleuse.

Long. 2 lig.

T. atro-plumbea, alis superioribus fusco-nebulosis.

Loc.

8. T. melanopis.

La Teigne blanche.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. tota alba oculis nigris.

Loc.

9. T. marginatella.

La Teigne à bordure de points.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. cinerea, alarum margine inferiore punctis nigris.

Loc.

10. T. crucifera.
La Teigne à croix de S. André.
Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig.
T. aurata, alis ſuperioribus cruce decuſſatâ fuſco rubrâ.
Loc.

11. T. granella.
La Teigne brune à tête blanchâtre.
Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig.
T. tota fuſco-nebuloſa, capite albido.
Loc. Larva habitat domos.

12. T. equeſtris.
La Teigne à croix de Chevalier.
Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.
T. fuſca, cruce dorſi decuſſatâ albâ.
Loc.

13. T. tapetzella.
La Teigne bedeaude à tête blanche.
Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.
T. nigra capite niveo, alis pone albidis.
Loc. Larva lanam, pennas avium devorat, muſæis infeſta.

14. T. bidella.

La Teigne bedeaude à tête brune.

Long. 4 lig.

T. fusca capite fusco, alis pone albidis.

Loc.

15. T. bicolorata.

La Teigne bedeaude à trois triangles.

T. nigra, alis ponè albidis, maculâ triplici triangulari nigrâ.

Loc. Larva habitat glandes.

16. T. quadratella.

La Teigne à quarrure.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis nigris, superioribus maculâ quadratâ albâ ex quatuor lineolis albis transversis compositâ.

Loc. Larva habitat sylvas.

17. T. inversella.

La Teigne à quadrille.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig.

T. nigra, alis antice albidis, maculis quatuor nigris; pone nigris, maculis duabus albis.

Loc.

18. T. monilifera.

La Teigne à deux rangs de points blancs.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

T. alis atris, punctorum alborum lineâ duplici transversâ.

Loc.

19. T. nebulosella.

La Teigne marbrée à plaques brunes.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

T. cinerea, alarum maculis nigro-nebulosis.

Loc. Larva habitat domos.

20. T. undulatella.

La Teigne à quatre bandes brunes ondulées.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis delute cinereis, fasciis tribus fuscis transversis undulatis.

Loc.

21. T. circumvoluta.

Le Manteau à points.

Long. 8 lig.

T. alis argenteis, corpori circumvolutis fasciâ duplici transversâ punctorum nigrorum.

Loc.

22. T. ochrocephala.

Le Manteau à tête jaune.

Long. 7 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. alis albis corpori circumvolutis, capite collarique flavis.

Loc.

23. T. viridella.

Le Manteau à bandes verdâtres.

Long. 6 $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis corpori circumvolutis albido-roseis, fasciis tribus obscurè virescentibus.

Loc.

24. T. crocella.

Le Manteau jaune.

Long. 7 lig.

T. alis corpori circumvolutis croceis, oculis pedibusque nigris.

Loc.

25. T. rosella.

Le Manteau couleur de rose.

Long. 7 lig.

T. alis corpori circumvolutis abescentibus margine roseo.

Loc.

26. T. rhomboidella.

Le Lozange cendré.

Long. 3 lig.

T. fusco-cinerea, alarum maculâ rhomboideâ albidâ oblongâ.

Loc.

27. T. nervosa.

La Teigne à nervures.

Long. 5 lig.

T. alis cinereis, ſuperioribus nitentibus nervis multifidis fuſcis.

Loc.

28. T. Reaumurella.

La Teigne noire bronzée.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, alis exterioribus deauratis, antennis corpore duplo longioribus.

Loc. Larva habitat arbores.

29. T. de Geerella.

La Coquille d'or.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, alis ſuperioribus lineis longitudinalibus, faſciâ latâ tranſversâ infernèque radiis plurimis, antennis corpore triplo longioribus.

Loc. Larva habitat ſalicem.

30. T. intermediata.

L'Entre-ligne.

Long. 5 lig.

T. alis flaveſcentibus, lineis duabus &

maculâ intermediâ fuſcis in extremo ſuperiorum.

Loc.

31. T. bimaculoſa.

La Teigne à deux taches jaunes en bordure.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. fuſco-rubra, alarum ſuperiorum margine exteriore maculis duabus flavis.

Loc.

32. T. funigera.

La Teigne Cordelière.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, faſciâ tranſversâ albâ.

Loc.

33. T. mays.

La Teigne à deux taches blanches en bande.

Long. 3 lig.

T. fuſco-rubra, alis ſuperioribus maculis duabus croceis tranſverſim poſitis.

Loc. Larva habitat ſemina mays.

34. T. marmorella.

La Teigne à marbrure.

Long. 5 lig.

T. nigro-fusca, rivulis flavescentibus marmorata.

Loc.

34. T. xilostella.

La Teigne à bandelette blanche.

Long. 3 lig.

T. cinerea, dorso vittâ longitudinali albâ.

Loc.

36. T. trifasciata.

La Teigne grise à trois sautoirs bruns.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. cinerea, alarum fasciâ triplici obliquâ undulatâ fuscâ.

Loc.

37. T. thoracica.

La Teigne à corcelet rayé.

Long. 4 lig.

T. capite thoraceque flavo lineis longitudinalibus fuſcis, alis albo-flaveſcentibus, faſciis tranſverſis fuſcis.

Loc.

38. T. intermittens.

La Teigne à bande interrompue.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. albo flaveſcens, faſciis duabus obliquis ferrugineis, poſteriore interruptâ.

Loc.

36. T. ternatella.

La Teigne à triangle marginal.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. alba margine alarum exteriore maculis tribus fuſcis, triangulum referentibus.

Loc.

40. T. quinnata.

La Teigne blanche à cinq bandes brunes.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

T. alba, alis ſuperioribus lineis quinque tranſverſis fuſcis.

Loc. Larva habitat ſepes.

41. T. herminata.

La Teigne à bordure herminée.

Long. 2 lig.

T. fuſca, lineâ duplici tranſversâ flavâ, margine alarum undique flavo interſecto.

Loc. Larva habitat lichenem ſcriptum.

42. T. annulifera.

La Teigne à bande dorée & anneau blanc aux antennes.

Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig.

T. alis ſuperioribus nigris, faſciâ longitudinali maculiſque duabus aureis, antennis medio albis.

Loc.

43. T. Merianella.

La Teigne dorée à bandes d'argent.

Long. 1 lig.

T. nigro-aurata, lineis argenteis transversis tribus antennis extremo albis.

Varietas A. T. Wilkella.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

T. nigro-aurata, lineis argenteis transversis quatuor, antennis nigris.

Loc. Habitat folia ulmi.

44. T. Malletella.

La Teigne dorée à bande & toupet jaunes.

Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig.

T. nigra, alis exterioribus deauratis, capitis vertice alarumque fasciâ transversâ flavis.

Loc.

45. T. Linnæanella.

La Teigne dorée à quatre points d'argent.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. flavo-aurata, punctis quatuor argenteis, antennarumque apice albo.

Loc.

46. T. plumbæa.

La Teigne crayonnée.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. crocea, lineis transversis fusco-argenteis interruptis, alarum medio maculâ albâ punctisque plumbeis.

Loc.

47. T. mucosa.

La Teigne moisie.

Long. 4 lig.

T. albida, lineis longitudinalibus reticulatis fuscis, involucro villoso-abescente.

Loc. Larva habitat gramen.

48. T. pedifera.

La Teigne à fourreau en crosse.

Long. 4 lig.

T. alis cinereis, lineis albis fasciâque longitudinali fuscâ, involucro fusco pediformi.

Loc. Larva habitat ilicem.

49. T. lamellifera.
La Teigne à fourreau à deux lames.
Long. 3 lig.
T. nigro-cinerea, involucro fusco recurvo lamina duplici foliosâ tectâ.
Loc. Larva habitat folia arborum.

50. T. palearis.
La Teigne à fourreau de paille simple.
T. involucro palearam ordine unico tecto.
Loc. Idem.

51. T. fasciculifera.
La Teigne à fourreau de paille composé.
T. involucro palearum longitudinalium ordine multiplici composito.
Loc. Larva habitat herbam pratorum.

52. T. graminifera.
La Teigne à fourreau de pailles transverses.

T. involucro ex paleis transversis composito.

Loc. Larva habitat herbam pratorum.

53. T. lichenosa.

La Teigne des pierres à fourreau rond en capuchon.

T. lapidum, involucro conico recurvo.

Loc. Larva habitat lichenem parietinum.

54. T. lapidosa.

La Teigne des pierres à fourreau triangulaire à pans.

T. lapidum, involucro triangulari.

Loc. Idem.

* 55. T. cincta.

La Teigne d'or à anneaux.

Long. 4 lig.

T. fusca, alis superioribus flavis; punctis margine externo, circuloque infra croceis.

Loc.

* 56.

* 56. T. punctulata.

La Teigne à points noirs.

Long. 3 lig.

T. cinerea, alis superioribus punctorum nigrorum tribus paribus.

Loc.

* 57. T. atratella.

La Teigne jaune.

Long. 2 lig.

T. tota atra.

Loc.

* 58. T. virgata.

La Teigne à bande noire.

Long. 2 lig.

T. fusco-cinerea, fasciâ transversâ pilisque flavo-aureis.

Loc.

* 59. T. vittata.

La Teignè à ceinture blanche.

Long. 2 lig.

T. nigro-fusca, fasciâ transversâ albâ.

Loc.

* 60. T. ſignatella.

La Teigne brochée d'or.

Long. 3 lig.

T. alba, ſignaturis fulvis aureiſque marmorata, margine alarum externo albo interſecto.

Loc.

* 61. T. lucidula.

La Mine de plomb.

Long. 3 ½ lig.

T. fulva, fuſco lineiſque plumbeis marmorata punctis plumbeis.

Loc.

* 62. T. radiatella.

Le Manteau rayone.

Long. 5 lig.

T. fuſca, alis corpori circumvolutis fuſcis, faſciis longitudinalibus radiatis albis.

Loc.

* 63. T. ſcapulata.

La Teigne à mantelet.

Long. 2 ½ lig.

T. cinerascens, fasciis transversis fuscis, capite collarique albo, oculis nigris.

Loc.

* 64. T. turcica.

L'Ottomane.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

T. nigra, alarum basi maculâ duplici lunulari albâ.

Loc.

* 65. T. crassicornis.

La Teigne à grosses antennes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, antennis crassis, alarum basi, fasciâque transversâ luteâ.

Loc.

* 66. T. purpuratella.

La Purpurine.

Long. 4 lig.

T. nigro-violacea, alis antice-flavis postice maculâ marginali flavâ, lineis cœruleis nitentibus, pedibus annulis albis.

Loc.

* 67. T. cinerata.

Le Manteau cendré.

Long. 4 lig.

T. alis corpori circumvolutis albidis, margine cinereo.

Loc.

* 68. T. antennulata.

La Lozange jaune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. atra, alarum basi maculâ longitudinali, margine externo puncto medio, maculâ rhomboidæâ flavis, antennis medio albis.

Loc.

* 69. T. citrinella.

La Citrine.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis superioribus flavis, maculis aliquot aurantiis.

Loc.

* 70. T. pallidula.

La Paillette.

Long. 4 lig.

T. corpore fuſco, oculis nigris, alis pallido-flavis.

Loc.

* 71. T. tan.

Le Tan.

Long. 4 lig.

T. cinereo fuſcoque marmorata, alarum apice lineâ albâ acutè circumflexâ.

Loc.

* 72. T. argentinetta.

La Teigne brochée d'argent.

Long. 3 $\frac{1}{3}$ lig.

T. fuſco-violacea, lineis punctiſque argenteo-violaceis.

Loc.

* 73. T. ſtellata.

La Tache de neige.

Long. 3 lig.

T. crocea ſubviolacea, margine externo maculâ albidiſſimâ.

Loc.

* 74. T. aurantiaca.

La Teigne orangée.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. corniculis duobus cristatis nigro-cœrulea, alarum parte superiore maculisque duabus flavis.

Loc.

SECTIO QUARTA

CLASSIS INSECTORUM.

Insecta tetraptera alis nudis.

ARTICULUS PRIMUS.

Tarsorum articuli tres.

LXXV. LIBELLULA. *LA DEMOISELLE.*

Antennæ brevissimæ.
Os maxillosum.
Cauda masculis forcipata.
Ocelli tres ante aut inter oculos.

FAMILIA I. *Alis erectis.*

1. L. ludovicea.
La Louise.
Long. 21 lig.

L. corpore viridi cœruleo nitido, alis medio cœrulescentibus, basi & apice albidis margine immaculato.

Loc. Habitat prata & stagnorum ripas.

2. L. virgo.
L'Ulrique.

Long. 20 lig.

L. corpore viridi sericeo, alis subfuscis puncto marginali albo.

Loc. Idem.

3. L. puella.
L'Amélie.

Long. 14 lig.

L. corpore cœruleo cinereoque alterno, alis puncto marginali nigro.

Loc. Idem.

4. L. dorothæa.
La Dorothée.

Long. 14 lig.

L. corpore infra cœruleo-viridi supra fusco, thorace fasciis fuscis cœrulescentibusque alternis, puncto alarum marginali nigro.

Varietas A. L. corpore infra fulvo, ſupra nigro, thorace fulvo fuſcoque variegato, puncto alarum marginali fuſco.

Loc. Habitat prata & ſtagnorum ripas.

5. L. ſophia.
La Sophie.
Long. 16 lig.
L. corpore viridi pallide incarnato, thorace faſciis tribus longitudinalibus nigris, alis puncto marginali fuſco.
Loc. Idem.

6. L. adelais.
L'Adélaide.
Long. 17 lig.
L. corpore viridi ſericeo, alis albis, puncto marginali.
Loc. Idem.

FAMILIA II. *Alis patentibus.*

7. L. quadrimaculata.
La Françaiſe.
Long. 19 lig.

L. alis maculâ duplici marginali.

Loc. Id. rariſſima.

8. L. flaveola.

L'Eléonore.

Long. 16 lig.

L. alis albis, baſi luteis abdomine luteſcente.

Loc. Habitat amnium ripas.

9. L. philintha.

La Philinthe.

L. alis albis, baſi luteis; abdomine ſupra pulvere cinereo-cœruleſcente conſperſo.

Loc. Idem.

10. L. ſylvia.

La Sylvie.

Long. 2 pouces.

L. thorace viridi nitido, lineis flavis; alis albis abdomine nigro cœruleſcente.

Loc. Idem.

11. L. Ænea.
L'Aminthe.
Long. 18 lig.
L. viridi-inaurata, alis pallidis, pedibus nigris.
Loc. Habitat omnium ripas.

12. L. vulgatissima.
La Justine.
Long. 17 lig.
L. lateribus flava, alis albis.
Loc. Idem.

13. L. grandis.
La Julie.
Long. 28 lig.
L. fulva alis flavescentibus, thoracis lateribus lineis duabus flavis, fronte flavescente, caudâ diphyllâ.
Loc. Idem.

14. L. forcipata.
La Caroline.
Long. 23 lig.

L. thorace luteo virescente lineis nigris, abdomine nigricante caracteribus flavis.

Loc. Habitat amnium ripas.

15. L. cecilia.
La Cécile.

L. thorace virescente abdomine fusco caracteribus flavis.

Loc. Idem.

16. L. victoria.
La Victoire.

Long. 15 lig.

L. corpore flavo, abdomine cylindrico, alarum basi flavicante.

Loc. Idem.

LXXVI. PERLA. *LA PERLE.*

Antennæ filiformes.
Alæ incumbentes, cruciatæ æquales.
Os tentaculis quatuor.
Cauda biseta.
Ocelli tres.

1. P. bicaudata.

La Perle brune à raies jaunes.

Long. 8 lig.

P. fusca, capite thoraceque lineâ longitudinali flavâ alis fusco reticulatis.

Loc. Habitat amnium ripas.

2. P. flavipes.

La Perle brune à pattes jaunes.

P. fusca, abdominis lateribus pedibusque pallido flavis, alis fusco-venosis.

Loc. Idem.

3. P. nebulosa.

La Perle brune à aîles pâles.

Long. 5 ½ lig.

P. nigro-fusca, alis subcinereis pallidis, caudæ setis truncatis.

Loc. Idem.

4. P. flava.

La Perle jaune.

Long. 2 lig.

P. flava, alis albis oculis nigris.

Loc. Idem.

ARTICULUS SECUNDUS.

Tarsorum articuli quatuor.

LXXVII. RAPHIDIA. *La Rafidie.*

Antennæ filiformes.
Alæ incumbentes.
Os tentaculis quatuor.
Cauda nauda.
Ocelli tres.

1. R. ophiopsis.
La Rafidie.
Long. 6 lig.
Raphidia.
Loc. Habitat sylvas, rara.

ARTICULUS TERTIUS.

Tarsorum articuli quinque.

LXXVIII. EPHEMERA. *L'Ephémère.*

Antennæ brevissimæ.
Alæ inferiores multo breviores.
Cauda setosa.
Ocelli tres magni ante oculos.

1. E. vulgata.

L'Ephémère à trois filets & aîles tachetées.

Long. 8, 9 lig.

E. alis nebuloso-maculatis, caudâ trisetâ.

Loc. Habitat rivulorum ripas.

2. E. reticulata.

L'Ephémère à trois filets & aîles réticulées.

Long. 5 lig.

E. lutea, alis albis reticulatis, caudâ trisetâ.

Loc. Idem.

3. E. virideſcens.

L'Ephémère à trois filets & aîles brunes.

E. luteo-fuſca, alis fuſco-viridibus, caudâ triſetâ.

Loc. Idem.

4. E. nigra.
L'Ephémère noire à trois filets.
Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.
E. nigra, caudâ trisetâ.
Loc.

5. E. lutea.
L'Ephémère jaune à deux filets & aîles réticulées.
Long. 4 lig.
E. lutea, alis albis reticulatis, caudâ bisetâ.
Loc.

6. E. culiciformis.
L'Ephémère à deux filets & aîles blanches.
Long. 2 lig.
E. fusca, caudâ bisetâ, alis albis.
Loc.

7. E. bioculata.
L'Ephémère à deux filets & aîles brunes.

E. thorace fusco, abdomine albo, caudâ bisetâ, alis fuscis striatis.

Loc. Habitat aquatica prata.

8. E. horaria.

L'Ephémère à deux filets & aîles marginées.

Long. 3 lig.

E. alis albis, margine crassiore, nigricantibus, caudâ bisetâ.

Loc. Habitat domos.

LXXIX. PHRYGANEA. *LA FRIGANE.*

Antennæ filiformes.
Alæ laterales, tectiformes, pone assurgentes.
Os tentaculis quatuor.
Cauda nuda.
Ocelli tres.

1. P. striata.

La Frigane de couleur fauve.

Long. 11 lig.

P. alis testaceis, nervoso-striatis.

Loc. Habitat amnium ripas.

2. P. rhombica.

La Frigane panachée.

Long. 7 lig.

P. alis deflexo compressis flavescentibus maculâ rhombeâ laterali albâ.

Loc. Habitat amnium ripas.

3. P. vulgata.

La Frigane brune à aîles fauves.

Larg. 5 lig.

P. nigro-fusca, alis pedibusque testaceis.

Loc. Idem

4. P. plumbea.

La Frigane plombée à aîles fauves.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

P. atra, alis plumbeis pedibus fulvis.

Loc. Idem.

5. P. intersecta.

La Frigane à antennes panachées.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

P. cinereo-fusca, suturâ alarum maculâ albâ, antennis albo fuscoque intersectis corpore duplo longioribus.

Loc. Idem.

6. P. maculata.

La Frigane à aîles tachetées & courtes antennes.

Long. 4 lig.

P. alis ſuperioribus nebuloſis, antennis longitudine corporis.

Loc. Habitat amnium ripas.

7. P. longicornis.

La Frigane à aîles tachetées & longues antennes.

Long. 3, 3 ½ lig.

P. alis ſuperioribus nebuloſis nigro-punctatis, antennis corpore triplo longioribus.

Loc. Idem.

8. P. venoſa.

La Frigane noire à aîles pâles & veinées.

Long. 5 lig.

P. atra, pedibus albis, alis pallidis venoſis.

Loc. Idem.

9. P. viridis.

La Frigane verte.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. viridis, oculis nigris, alis niveis.

Loc. Habitat amnium ripas.

10. P. sex-punctata.

La Frigane à aîles ponctuées.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

P. fusca, alis albis fusco maculatis.

Loc. Idem.

11. P. funerea.

La Frigane mouche en deuil.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

P. tota atra, corpore rotundiore, antennis corpore brevioribus.

Loc. Idem.

12. P. musciformis.

La Frigane-mouche de couleur pâle.

P. fusca, corpore rotundiore, antennis corpore brevioribus, alis pallidis venosis.

Loc. Habitat amnium ripas.

13. P. variegata.

La Frigane marbrée à pattes panachées.

Long. 8 lig. Larg. 2 lig.

P. nigro-fusca, maculis cinereis, pedibus nigro cinereoque intersectis.

Loc. Idem.

14. P. lugubris.

La Frigane enfumée.

Long. 2 ½ lig. Larg. ½ lig.

P. tota atra, alis fuscis, venis nigris.

Loc. Idem.

15. P. nervosa.

La Frigane à nervures.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

P. pallida, alis albis, nervis fusco punctatis.

Loc. Idem.

16. P. atra.

La Frigane ſavoyarde.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

P. tota atra oblonga, alis nigris.

Loc. Habitat amnium ripas.

17. P. gallata. Phryg. bifasciata Phil. Encycl. VI

La Frigane demi-deuil.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

P. nigra, faſciâ duplici albâ interruptâ, antennis albo interſectis.

Loc. Idem.

LXXX. HEMEROBIUS. *L'HÉMEROBE.*

Antennæ filiformes.
Alæ ſæpe æquales.
Os prominens tentaculis quatuor.
Cauda nuda.
Ocelli nulli.

1. H. perla.

Le Lion des pucerons.

Long. 6 lig.

H. luteo-viridis, alis aqueis vasis viridibus.

Loc. Habitat arbores, rosam.

2. H. chrysops.

L'Hémerobe à aîles ponctuées.

Long. 3 lig.

H. luteus, alis aqueis, vasis fusco punctatis.

Loc. Habitat hortos.

3. H. flavilater.

L'Hémerobe aquatique.

Long. 7 lig.

H. ater, alis fuscis nigro-reticulatis, margine exteriore dilatato.

Loc. Habitat rivulorum ripas.

LXXXI. FORMICALEO. *Le Fourmilion.*

Antennæ breves, clavatæ, crassæ.
Alæ æquales.
Os prominens tentaculis quatuor.
Cauda nuda.
Ocelli nulli.

1. F. nostras.

Le Fourmilion.

Long. 12 lig.

Loc. Habitat arenam.

LXXXII. PANORPA. *LA MOUCHE-SCORPION.*

Antennæ longæ filiformes.
Alæ æquales.
Rostrum corneum cylindraceum.
Cauda chelifera forficibus armata.
Ocelli tres.

1. P. communis.

La Mouche-Scorpion.

Long. 7, 8 lig.

Loc. Habitat prata ad amnes.

LXXXIII. CRABRO. *Le Frélon.*

Antennæ clavatæ.
Alæ inferiores breviores.
Os maxillosum.
Aculeus ani dentatus.
Abdomen ubique æquale thoraci connatum.
Ocelli tres.

1. C. humeralis.
Le Frélon à épaulettes.
Long. 10 lig. Larg. 3 lig.
C. niger, subhirsutus, fronte, thorace superne, abdomineque flavis, segmento 1°, 2° & 4° ex parte nigris.
Loc.

2. C. maculatus.
Le Frélon à échancrure & ventre jaune.
Long. 10 lig. Larg. 3 lig.
C. niger, abdomine flavo, segmentis tribus superioribus nigris maculis flavis.
Loc.

3. C. lunulatus.

Le Frélon noir à échancrure.

Long. 1 pouc. Larg. 3 ½ lig.

C. totus niger, abdominis segmento primo ovatim margine inciso lunulâ flavâ.

Loc.

4. C. annulatus. Cimbex lutea (F.) Olivier Encycl. V.

Le Frélon à anneau noir.

Long. 10 lig. Larg. 3 ½ lig.

C. ferrugineus, thorace superne abdominisque segmento primo nigris.

Loc.

LXXXIV. UROCERUS. *L'UROCERE.*

Antennæ filiformes.

Alæ inferiores breviores.

Os maxillosum.

Aculeus ani dentatus prominens corniculo tectus.

Abdomen ubique æquale thoraci connatum.

Ocelli tres.

1. U. gigas.

L'Urocère.

Long. 13 lig. Larg. 3 lig.

Loc.

LXXXV. TENTHREDO. *LA MOUCHE-A-SCIE.*

Antennæ filiformes.
Alæ inferiores breviores.
Os maxillosum.
Aculeus ani dentatus non prominens.
Abdomen ubique æquale thoraci connatum.
Ocelli tres.

FAMIL. I. *Antennis novem-nodiis.*

1. T. hebraica.

La Lettre hébraïque verte.

Long. 5 lig. Larg. 1 ½ lig.

T. viridis, capite thoraceque ſupra caracteribus nigris.

Loc. Habitat flores.

2. T. crocea.

La Mouche-à-ſcie ſafranée.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. crocea, antennis oculiſque nigris.

Loc. Habitat flores.

3. T. melanocephala.

La Mouche-à-ſcie ſafranée à tête noire.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. crocea, capite, pedibus, thoraciſque apice nigris.

Loc. Idem.

4. T. roſæ.

La Mouche-à-ſcie du roſier.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. crocea, capite thorace ſupra, alarumque margine exteriore nigris.

Loc. Habitat roſam.

5. T. ochroptera.

La Mouche-à-ſcie noire à aîles jaunes.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. nigro-cœruleſcens; pedibus, tibiis aliſque exterioribus croceis, maculâ marginali fuſcâ.

Loc.

6. T. maculata.

La Mouche-à-ſcie noire, à ventre jaune noir en haut & en bas.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, thorace maculis flavis, abdomine luteo baſi & apice nigro, pedibus variegatis.

Loc.

7. T. unifaſciata.

La Mouche-à-ſcie à une bande jaune.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, thoracis apice flavo, ſegmentis abdominalibus quarto & quinto luteis.

Loc.

8. T. punctata.

La Mouche-à-ſcie noire marquée de jaune ſur le premier & dernier anneau du ventre.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigro-cœrulea, alis pedibuſque flavis, ſegmentis abdominalibus primo & ultimo maculâ luteâ.

Loc.

9. T. bifaſciata.

La Mouche-à-ſcie à deux bandes jaunes.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, ſegmentis abdominalibus primo & quinto luteis.

Loc. Habitat plantas umbelliferas.

10. T. trifaſciata.

La Mouche-à-ſcie à trois bandes jaunes.

Larg. 4 $\frac{2}{3}$ lig. Long. 1 lig.

T. nigra, pedibus abdominisque segmentis primo, quinto, sexto & ultimo margine flavis.

Loc.

11. T. rustica.

La Mouche-à-scie à quatre bandes jaunes.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, segmentorum abdominalium marginibus, excepto secundo, tertio & sexto, flavis, pedibus ferrugineis.

Loc. Habitat salicem.

12. T. virgata.

La Mouche-à-scie à deux bandes noires sur le ventre.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, pedibus segmentorumque abdominalium marginibus, excepto secundo, tertio & quinto, flavis.

Loc.

13. T. scrophulariæ.

La Mouche-à-scie de la scrofulaire.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, ſegmentorum abdominalium marginibus, excepto ſecundo & tertio, flavis.

Loc. Habitat ſcrophulariam.

14. T. multi-faſciata.

La Mouche-à-ſcie à ventre rayé.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

T. nigra, ſegmentorum abdominalium omnibus flavis.

Loc.

15. T. cordata.

La Mouche-à-ſcie porte-cœur.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, thoracis apice maculis albis, pedibus anticis abdominiſque poſticâ parte ferrugineis.

Loc.

16. T. bimaculata.

La Mouche-à-ſcie à deux taches blanches au corcelet.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

T. nigra, thoracis apice maculis albis, pedibus anticis abdominiſque medio ferrugineis.

Loc.

17. T. ſtellata.

La Mouche-à-ſcie noire à ventre bordé de taches jaunes.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, thoracis apice maculâ flavâ, ſegmentis abdominalibus utrinque maculis luteis.

Loc.

18. T. labiata.

La Mouche-à-ſcie noire à pattes & corcelet variés de jaune.

Long. 4 ½ lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, thoracis maculis tribus abdominiſque apice flavis, pedibus flavo nigroque variis.

Loc.

19. T. multicolor.

La Mouche-à-ſcie noire à pattes rouges & bandes du ventre fauves.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, thoracis abdominiſque apice maculis flavis, abdominis medio fulvo, pedibus rubris.

Loc.

20. T. ſalicis.

La Bedeaude du ſaule.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. flava, capite thoraceque ſupra nigro.

Loc. Habitat ſalicem.

21. T. litterata.

La Mouche-à-ſcie à ventre & pattes fauves & corcelet panaché.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. capite thoraceque nigro caracteribus flavis, pedibus abdomineque ferrugineis.

Loc.

22. T. albicornis.

La Mouche-à-ſcie à antennes blanches au bout.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, antennarum apice albo, abdominis baſi maculâ utrinque albâ, apice fulvo.

Loc.

23. T. albipes.

La Mouche-à-ſcie noire à pattes argentées.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra pedibus albo variegatis.

Loc.

24. T. liguſtrina.

La Mouche-à-ſcie à pattes argentées & milieu du ventre fauve.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

T. nigra, femoribus maculis albis, abdominis medio ferrugineis.

Loc.

25. T. atra.

La Mouche-à-ſcie noire à pattes fauves.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, pedibus ferrugineis.

Loc.

26. T. flavipes.

La Mouche-à-ſcie noire à pattes jaunes & milieu du ventre fauve.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, pedibus flavis, abdominis medio ferrugineis.

Loc.

27. T. rufipes.

La Mouche-à-ſcie noire, à pattes & milieu du ventre fauves.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. nigra, pedibus abdominiſque medio ferrugineis.

Loc.

28. T. dumetorum.

La Mouche-à-ſcie noire, à points de devant jaunes & milieu du ventre fauve.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

T. nigra, pedibus quatuor anticis flavis, femoribus poſticis abdominiſque medio ferrugineis.

Loc.

29. T. annulata.

La Mouche-à-ſcie noire, avec le milieu du ventre fauve.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. nigra, abdominis medio ferrugineo.

Loc.

30. T. cœruleſcens.

La Mouche-à-ſcie noire bleuâtre.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

T. tota nigro-cœrulea, alis nigricantibus, margine exteriore nigro.

Loc.

31. T. geniculata.

La Mouche-à-ſcie noire à genoux fauves.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

T. nigra, geniculis ferrugineis.

Loc.

32. T. ceraſi.

La Mouche-à-ſcie noire à pattes jaunes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

T. nigra, pedibus flavis.

Loc.

33. T. pectinicornis.

La Mouche-à-ſcie noire, à antennes pectinées.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. nigra, antennis uno verſu pectinatis, tibiis tarſiſque flavis.

Loc.

34. T. cordigera. Emphytus lorgatus

La Mouche-à-ſcie cordelière.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, segmento abdominali quinto albo, pedibus pallidis, genubus albis.

Loc.

* 35. T. Astroites. Scathredo crassula? Nl.
L'Etoile d'or.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, humeris, thoracis apice, tibiisque luteis.

Loc.

* 36. T. palmata. cf. histrio Schff nom.
La Mouche-à-scie aux pieds blancs.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. nigra, humeris thoracisque apice flavis, pedibus abdominisque medio ferrugineis, palmis posticis albis.

Loc.

* 37. T. perlata. cf. histrio fœm. Schff. nom.
La Mouche-à-scie perlée.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. nigra, thoracis apice flavo, pedibus abdominisque medio ferrugineis, palmis posticis albo maculatis.

Loc.

38. T. apicaris. cf. nassata Schff. nom.
La Mouche-à-ſcie fauve à point jaune.
Long. 5 lig. Larg. 1 lig.
T. ferruginea, thoracis apice flavo, oculis nigris.
Loc.

39. T. thoracica. cf. variegata Schff. nom.
La Mouche-à-ſcie à pattes fauves & taches blanches.
Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.
T. nigra, thoracis apice maculis albis, pedibus ferrugineis.
Loc.

FAMILIA II. *Antennis undecimnodiis.*

40. T. vernalis.
La Mouche-à-ſcie noire à corcelet rouge.
Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.
T. nigra, thorace rubro.
Loc.

41. T. viridescens.

La Mouche-à-scie noire à ventre bordé de vert.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, pedibus, lateribus thoracis abdominisque viridescentibus.

Loc.

FAMIL. III. *Antennis octodecim-nodiis.*

42. T. cynosbati.

La Mouche-à-scie à jambes variées.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. nigra, pedibus ferrugineis, tibiis posticis albo nigroque annulatis.

Loc.

43. T. rubi.

La Mouche-à-scie à point jaune au corcelet & milieu du ventre fauve.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, puncto thoracis luteo, pedibus abdominisque medio ferrugineis.

Loc.

44. T. longicornis.

La Mouche-à-ſcie à longues antennes.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. nigra, ſegmentis abdominalibus margine flavis, antennis duas tertias corporis partes æquantibus.

Loc.

* 45. T. longicollis. Cephus Tabidus Schff. Nom.

La Mouche-à-ſcie à col allongé.

Long. 10 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, utrinque luteo-maculata, collo elongato.

Loc.

* 46. T. ſertifera. Lophyrus piceae Lep.

La Mouche-à-ſcie à bouquet.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

T. nigra, antennis utrinque pectinatis, pedibus flavis. *Maſc.*

Long. 3 $\frac{1}{2}$, 4, 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. tota ferruginea, antennis nigris thorace brevioribus ſubſerratis. *Femin.*

Loc.

* 47. T. prolongata. Cephus compressus

La Mouche-à-ſcie à prolongement.

Long. 5, 6 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

T. nigra, pedibus abdominiſque medio fulvis collo elongato.

Loc.

LXXXVI. CYNIPS. *LE CINIPS.*

Antennæ cylindraceæ fractæ.

Alæ inferiores breviores.

Os maxillóſum.

Aculeus ani conicus intra valvas abdominis.

Abdomen ſubovatum ad latera compreſſum, ſubtus acutum, petiolo thoraci connexum.

Ocelli tres.

FAMIL. I. *Antennarum articuli undecim.*

1. C. bedeguaris.

Le Cinips doré à queue, du bedeguar liſſe.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. thorace viridi-æneo, abdomine aureo, ſetis ani corpore longioribus.

Loc. Habitat tumorem roſæ *Bedeguar* dictum, & gallam quercinam.

2. C. viridis.

Le Cinips doré ſans queue.

C. thorace viridi æneo, abdomine aureo, ſetis ani non exſertis.

Loc. Idem.

3. C. auratus.

Le Cinips porte-or.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

C. punctatus ſericeo-auratus, ſetis ani corpore brevioribus.

Loc.

4. C. fungoſus.

Le Cinips de la galle fongueuſe du chêne.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

C. nigro-viridis, tibiis flavis, gallæ fungoſæ quercûs.

Loc. Habitat gallam quercinam.

5. C. pomaceus.

Le Cinips de la galle lisse & ronde du chêne.

Long. 1 ½ lig.

C. nigro-cupreus, pedibus fuscis, gallæ rotundæ, glabræ, duræ, foliorum quercûs.

Loc. Habitat minorem gallam foliorum quercûs, solitarius.

6. C. punctatus.

Le Cinips noirâtre à point marginal.

C. nigro-cupreus, pedibus fuscis alarum puncto fusco.

Loc.

7. C. foliaceus.

Le Cinips de la galle du chêne qui vient de la substance même de la feuille.

Long. 1 lig.

C. viridi-ſericeus, abdomine aurato, pedibus albis, gallæ intra foliorum quercûs ſubſtantiam deliteſcentis.

Loc. Habitat gallam intra foliorum quercûs laminas quaſi inſufflatam.

8. C. gemmæ quercûs.

Le Cinips de la galle en roſe du chêne.

Long. 1 lig.

C. nigro-cupreus, pedibus fuſcis, gallæ imbricatæ quercûs.

Loc. Habitat gallam quercûs in roſæ formam expanſam & extùs diſſectam.

9. C. baccarum quercûs.

Le Cinips de la galle en chapeau du chêne.

C. niger, pedibus fulvo flavis, gallarum fungiformium quercûs.

Loc. Habitat gallam quercûs pediculo foliis inhærentem, fungiformem.

10. C. fimbriatus.

Le Cinips de la galle platte & frisée du chêne.

Long. 1 lig.

C. nigro-aureus, pedibus fusco-variegatis, gallæ planæ rubræ fimbriatæ quercûs.

Loc. Habitat gallam quercûs compressam, orbicularem, & fimbriatam.

11. C. racemosus.

Le Cinips de la galle en grappe du chêne.

C. fuscus nitens, capite nigro, abdominis apice villoso, gallæ racemosæ quercûs.

Loc. Habitat gallam quercûs duram in racemos super foliorum pediculis dispositam.

12. C. minutus.

Le Cinips de la galle tête d'épingle du chêne.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. viridis nitens, pedibus pallidis gallæ globosæ vix sensibilis foliorum quercûs.

Loc. Habitat gallam acutam & minutissimam, quercûs.

13. C. scaber.

Le Cinips de la galle raboteuse des feuilles de chêne.

C. gallæ scabræ foliorum quercûs.

Loc. Insectum incognitum, Galla sola noscitur.

14. C. tuberculatus.

Le Cinips de la galle à tubercules du chêne.

C. gallæ tuberculatæ quercûs.

Loc. Idem.

15. C. numismalis.

Le Cinips de la galle en écusson de chêne.

C. gallæ numismatis quercûs.

Loc. Idem.

16.

16. C. pedunculi quercûs.

Le Cinips de la galle en pomme des extrémités des branches du chêne.

C. gallæ pomiformis extremitatis ramorum quercûs.

Loc. Insectum incognitum. Galla sola noscitur.

17. C. radicum.

Le Cinips de la galle ligneuse des racines.

C. gallæ ligneæ radicum.

Loc. Idem.

18. C. salicis strobili.

Le Cinips de la galle des feuilles de saule.

C. nigro-viridis nitens, pedibus pallidis, gallæ foliorum salicis.

Loc. Habitat gallam salicis folia vestientem.

19. C. graminis.

Le Cinips de la galle à filets du chiendent.

C. gallæ graminis filamentosæ.

Loc. Habitat gallam capillarem, quæ circà basim foliorum graminis nascitur.

20. C. glechomæ.

Le Cinips de la galle du lierre terrestre.

C. totus fuscus, thorace subvilloso, gallæ hederæ terrestris.

Loc. Habitat gallam duram & orbicularem folia glechomæ hederaceæ occupantem.

21. C. aurantii.

Le Cinips fauve & le sauteur de l'oranger.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. aurantii, ferrugineus, alarum basi albâ puncto nigro, antennis nigris, pedibus saltatoriis.

Loc.

22. C. saltator.

Le Cinips sauteur noir.

Long. $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger nitens, pedibus saltatoriis.

Loc.

23. C. cruciatus.

Le Cinips sauteur noir à pieds fauves.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. ater, pedibus saltatoriis fulvis.

Loc.

24. C. pupparum.

Le Cinips des chrysalides de papillons.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. viridi-sericeus, abdomine aureo, pedibus pallidis, chrisalidum papilionum.

Loc. Habitat puppas papilionis brassicæ.

25. C. ovulorum.

Le Cinips des œufs des insectes.

Long. $\frac{1}{3}$ lig.

C. niger, pedibus pallidis, ovorum insectorum.

Loc. Larva habitat ova papilionum, &c.

26. C. aphidum.

Le Cinips de l'ichneumon des pucerons.

Long. $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger nitens, pedibus pallidis, ichneumonum aphidum.

Loc. Larva habitat aphides & ichneumonem aphidum.

* 27. C. bifasciatus.

Le Cinips à bandes sur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. nigro-viridis nitens, pedibus fuscis, alarum fasciis duabus transversis nigris.

Loc.

FAMIL. II. *Antennarum articuli septem.*

28. C. foliorum.

Le Cinips des feuilles sans galle.

Long. $\frac{3}{4}$ lig.

C. foliorum sine gallâ, totus nigro-viridis nitens.

Loc. Larva vel chrysalis foliis adhæret.

29. C. gregarius.

Le Cinips du rosier, sans galle.

Long. $\frac{2}{3}$ lig.

C. rosæ, sine gallâ, totus niger.

Loc. Chrysalis fol. rosæ subtus adhæret.

30. C. circularis.

Le Cinips du chêne, sans galle.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. quercûs sine gallâ, totus viridi-aureus pedibus flavis.

Loc. Chrysalis fol. ilicis subtus adhæret.

31. C. eulophus.

Le Cinips à antennes rameuses, sans galle.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. viridis nitens, antennis ramosis pallidis.

Loc. Chrysalis foliis tiliæ subtus adhæret.

32. C. tripunctatus.

Le Cinips à ailes pointillées.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. nigro-viridis nitens, alis punctis tribus nigris.

Loc.

33. C. antiquus.

Le Cinips vert bronzé à pattes blanches.

Long. $\frac{3}{5}$ lig.

C. viridis nitens, pedibus albido flavis.

Loc.

34. C. albipes.

Le Cinips noir à pattes blanchâtres.

Long. 1 lig.

C. nigro nitens, pedibus pallidis.

Loc.

35. C. crassipes.

Le Cinips brun à grosses cuisses.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. fuscus, femoribus clavatis.

Loc.

LXXXVII. DIPLOLEPIS. *LE DIPLOLÈPE.*

Antennæ filiformes longæ articulis quatuordecim.
Alæ inferiores breviores.
Os maxillosum.
Aculeus ani conicus intra valvas abdominis.
Abdomen ovatum, ad latera compressum, subtus acutum, petiolo brevi thoraci connexum.

1. D. quercus.
Le Diplolèpe de la galle ronde & dure du chêne.
Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.
D. fuscus, gallæ, globosæ, glabræ & duræ foliorum quercûs.
Loc. Habitat gallam rotundam & glabram inferioris foliorum quercûs superficiei.

2. D. rosæ.
Le Diplolèpe du bedeguar.
Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. bedeguaris niger, abdomine ferrugineo apice nigro, pedibus rufis.

Loc. Habitat bedeguarem rosæ.

3. D. bedeguaris.

Le Diplolèpe de la galle fongueuse & lisse du rosier.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

D. bedeguaris levis fungosi, fuscus oculis nigris.

Loc. Idem.

4. D. niger.

Le Diplolèpe noir à ventre brun & antennes noires.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{5}$ lig.

D. niger, abdomine fusco lucido, pedibus rufis, antennis nigris.

Loc.

5. D. fuscus.

Le Diplolèpe brun à ventre luisant & antennes brunes.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. fuscus, abdomine lucido, pedibus rufis, antennis fuscis.

Loc.

6. D. flavipes.

Le Diplolèpe à pattes jaunes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

D. totus niger, pedibus flavis.

Loc.

LXXXVIII. ICHNEUMON. *L'ICHNEUMON.*

Antennæ filiformes, longæ vibratiles.
Alæ inferiores breviores.
Os maxillosum.
Aculeus ani triplex.
Abdomen petiolo tenui longo thoraci connexum.
Ocelli tres.

1. I. globatus.

L'Ichneumon à coton blanc.

Long. 1 lig.

I. ſerico conglobato albo.

Loc. Habitat ſericum album herbis pratorum inhærentem.

2. I. glomeratus.

L'Ichneumon à coton jaune.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

I. ſerico conglobato flavo.

Loc. Habitat larvam papilionis braſſicæ.

3. I. alveariformis.

L'Ichneumon à coques en forme de rayons de ruche.

I. ſerico alveari-formi.

Loc. Habitat ſericum alveariformem.

4. I. aphidum.

L'Ichneumon des pucerons.

Long. 1 lig.

I. aphidum.

Loc. Larva aphides perforat & occidit, ipſam cynips terebrat.

5. I. manifeſtator.

L'Ichneumon à longue queue.

Long. 10 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

I. ater, pedibus rufis, setis ani corpore duplo longioribus.

Loc. Habitat sylvas.

6. I. serosus.

L'Ichneumon noir à queue de la longueur du corps & ventre lisse.

Long. 7 lig. Larg. 1 ½ lig.

I. ater, pedibus rufis; setis ani longitudine corporis, abdomine lævi.

Loc. Habitat arbores.

7. I. tuberculatus.

L'Ichneumon à queue de la longueur du corps & ventre à tubercules.

Long. 6 lig. Larg. ⅔ lig.

I. ater, pedibus rufis, setis ani longitudine corporis, abdomine tuberculis lateralibus.

Loc. Idem.

8. I. compunctor.

L'Ichneumon à pattes fauves & courte queue.

Long. 6 lig. Larg. ½ lig.

I. ater, pedibus rufis, setis ani corpore triplo brevioribus, abdomine fere sessili.

Loc. Habitat chrysalides papilionum.

9. I. petiolatus.

L'Ichneumon à pattes fauves & ventre en filet.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. ater, pedibus rufis, setis ani corpore triplo brevioribus, abdominis basi tenui longa petiolatu.

Loc.

10. I. frontalis.

L'Ichneumon noir à pattes fauves & devant de la tête jaune.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, fronte flava.

Loc.

11. I. femoralis.

L'Ichneumon noir à pattes brunes & grosses cuisses.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, femoribus posticis crassis globosis.

Loc. Habitat vitra domorum.

12. I. ruspator.

L'Ichneumon à pattes brunes & grosses cuisses dentelées.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, femoribus posticis crassis denticulo armatis.

Loc.

13. I. geniculatus.

L'Ichneumon noir à pattes fauves & genoux blancs.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, genibus annulo albo.

Loc.

14. I. inguinalis.

L'Ichneumon noir à pattes fauves & point blanc à la base des cuisses.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, femorum basi puncto albo.

Loc.

15. I. albipes.

L'Ichneumon noir à pattes blanchâtres.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, pedibus albidis, alarum puncto nigro.

Loc. Habitat flores cirsii.

16. I. jaculator.

L'Ichneumon tout noir à pattes postérieures très-longues & grosses.

Long. 6 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. totus niger, tibiis posticis clavatis abdomine longo, tenui, falcato.

Loc.

17. I. annularis.

L'Ichneumon noir à pattes postérieures grosses & milieu du ventre fauve.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, tibiis posticis clavatis, abdomine tenui falcato circa medium fulvo.

Loc.

18. I. crassipes.

L'Ichneumon noir à pattes fauves très-grosses & tachetées.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger; femoribus posticis crassissimis fulvis puncto albido.

Loc.

19. I. falcatus.

L'Ichneumon noir à pattes fauves; à cuisses postérieures grosses & ventre en faucille.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, tibiis rufis, femoribus posticis clavatis, abdomine longo falcato.

Loc.

20. I. crocatus.

L'Ichneumon jaune à tête & corcelet noirs avec la pointe jaune.

Long. 10 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

I. luteus, capite thoraceque fusco apice flavo.

Loc.

21. I. luteus.

L'Ichneumon jaune à ventre en faucille.

Long. 10 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

I. luteus totus.

Loc.

22. I. melanocephalos.

L'Ichneumon à tête & corcelet noirs, & à ventre jaune en faucille.

Long. 9 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. capite thoraceque nigris, antennis pedibus abdomineque falcato, luteis.

Loc.

23. I. ramidulus.

L'Ichneumon jaune à corcelet noir en dessous & extrêmité du ventre noire.

Long. 8 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

I. luteus, oculis, thorace infra, abdominisque falcati apice nigris.

Loc.

24. I. pugillator.

L'Ichneumon noir à pattes & milieu du ventre citron.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdomine falcato, pedibus abdominisque medio flavis.

Loc.

25. I. virgatus.

L'Ichneumon jaune à corcelet rayé.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

I. luteus, thoracis fasciis tribus longitudinalibus fuscis.

Loc. Habitat ilicem.

26. I. obscurus.

L'Ichneumon brun à tête & bout du ventre noirs.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. fuscus, capite adominisque apice nigris.

Loc.

27. I. apicarius.

L'Ichneumon jaune à pointe du corcelet noire.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. flavo-ferrugineus, apice thoracis nigro.

Loc.

28. I. ſcutellatus.

L'Ichneumon fauve à taches noires & pointe du corcelet jaune.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

I. flavo, rufo, nigroque variegatus, thoracis apice flavo.

Loc. Habitat larvas papilionum.

29. I. melanopteros.

L'Ichneumon brun à taches noires & aîles noirâtres.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. fuſcus, nigro maculatus, alis nigris.

Loc.

30. I. linearis.

L'Ichneumon fauve à taches noires & aîles croisées.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

I. linearis rufus nigro maculatus, alis albis cruciatis.

Loc.

31. I. punctatus.

L'Ichneumon noir à petites taches jaunes.

Long. 7 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, fronte punctisque humerorum flavis.

Loc.

32. I. citratus.

L'Ichneumon noir à ventre tacheté de citron sur les côtés.

Long. $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. atro-cœrulescens, abdominalibus segmentis utrimque maculâ flavâ.

Loc.

33. I. binarius.

L'Ichneumon noir chagriné à pattes fauves & deux taches jaunes sur le ventre.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. ater, punctatus, pedibus rufis, abdominis basi utrinque maculâ flavâ.

Loc.

34. I. tertiarius.

L'Ichneumon noir à cuisses postérieures fauves & deux taches blanches sur le ventre.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, femoribus posticis rufis abdominis medio utrinque maculâ albâ.

Loc.

35. I. multicolor.

L'Ichneumon noir à pattes rougeâtres, à corcelet & ventre tacheté de blanc.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, thoracis basi linea, apice puncto, albis abdominis segmento 1°. punctis duobus, 2°. margine albis.

Loc.

36. I. globulifer.

L'Ichneumon noir à plaque de poils bruns sur le ventre.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

I. ater, alis extremo fuscis, abdominis apice villoso ferrugineo.

Loc. Habitat larvas phalænarum.

37. I. bifasciatus.

L'Ichneumon noir à deux bandes sur les aîles.

Long. 3 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, alis fasciâ duplici transversâ nigrâ.

Loc.

38. I. niger.

L'Ichneumon tout noir.

Long. 1 lig.

I. totus niger.

Loc.

39. I. comitator.

L'Ichneumon noir à anneaux blancs aux antennes.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

I. totus niger, antennis medio albis.

Loc. Larva habitat nidum vesparum.

40. I. funereus.

L'Ichneumon noir, avec la pointe du corcelet & le milieu des antennes blancs.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

I. niger, thoracis apice antennarumque medio albis.

Loc.

41. I. dumetorum.

L'Ichneumon noir à cuisses rougeâtres & anneau blanc aux antennes.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. ater, femoribus testaceis, antennis medio albis.

Loc. Habitat dumeta.

42. I. spiralis.

L'Ichneumon noir à pattes rougeâtres & anneau blanc aux antennes.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. ater, pedibus rufis, tibiis posticis apice nigris, antennis medio albis.

Loc.

43. I. punctulatus.

L'Ichneumon à points.

Long. 6 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

I. niger, pedibus abdominisque anticâ parte superne rufis, antennis medio albis.

Loc.

44. I. tibialis.

L'Ichneumon noir à pattes rougeâtres, à taches blanches sur les jambes & anneau blanc aux antennes.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, tibiis antenniſque medio albis.

Loc.

45. I. tarſoſus.

L'Ichneumon à pattes rougeâtres avec le milieu des tarſes & des antennes blanc.

Long. 4 lig.

I. niger, pedibus rufis, tarſis poſticis antenniſque medio albis.

Loc.

46. I. articulatus.

L'Ichneumon noir, à pattes rougeâtres, avec les genoux & le milieu des antennes blancs.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, geniculis antennarumque medio albis.

Loc.

47. I. abdominalis.

L'Ichneumon noir à ventre & jambes fauves, & anneau blanc aux antennes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

I. niger, abdomine toto ferrugineo antennis annulo albo.

Loc.

48. I. ani.

L'Ichneumon noir à ventre fauve vers le bas & anneau blanc aux antennes.

Long. 6 $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, abdomine pone ferrugineo antennis medio albis.

Loc.

49. I. upsaliensis.

L'Ichneumon noir à pattes fauves & anneau blanc aux antennes.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, abdomine ferrugineo apice nigro, antennis annulo albo.

Loc.

50. I. tripunctatus.

L'Ichneumon noir à bande fauve sur le ventre avec la pointe du corcelet & anneau des antennes blancs.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

I. niger, abdomine antice ferrugineo, postice nigro punctis tribus albis, thoracis apice annuloque antennarum albo.

Varietas A. I. femoribus omnibus nigris.

B. I. femoribus nigris, tibiisque omnibus basi albis, apice nigris.

Loc. Habitat sylvas.

51. I. dictator.

L'Ichneumon noir à ventre fauve en devant & à anneaux blancs aux pattes & aux antennes.

Long. 2 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, abdomine ferrugineo, apice nigro, tibiis antennisque annulo albo.

Loc.

52. I. peregrinator.

L'Ichneumon noir à ventre fauve en devant, noir postérieurement & terminé de blanc, & à anneau blanc aux antennes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. abdomine ferrugineo, pone nigro, apice albo; antennis medio albis.

Loc.

53. I. vorax.

L'Ichneumon panaché de noir & citron à anneau blanc aux antennes.

Long. 7 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, thoracis apice, abdominis medio pedibusque flavo variegatis, antennis medio albis.

Loc.

54. I. palmarius.

L'Ichneumon à pointe du corcelet blanche & pattes panachées de blanc.

Long. 7 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, fronte, thoracisque apice albis, tibiis palmisque albo variegatis.

Loc.

55. I. constellatus.

L'Ichneumon noir à pointe du corcelet & taches du ventre blanches.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, thoracis apice maculisque abdominis quauor albis, antennarum medio albo.

Loc.

56. I. fuscipes.

L'Ichneumon noir à pieds rougeâtres & pointe du corcelet blanche.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, apice thoracis albo.

Loc.

57. I. ſcirpi.

L'Ichneumon noir à pointe du corcelet & bout du ventre blancs.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, thoracis abdominiſque apice albo.

Loc. Larva habitat ſcirpum paluſtrem.

58. I. junci.

L'Ichneumon noir à pointe du corcelet jaune avec les pattes & le milieu du ventre fauves.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

I. niger, fronte thoraciſque apice flavis, pedibus abdominiſque medio ferrugineis.

Loc. Larva habitat juncum.

59. tiphæ.

L'Ichneumon noir à antennes pattes & milieu du ventre fauves.

Long. 5 lig.

I. niger, fronte flavâ, antennis pedibus abdominiſque medio ferrugineis.

Loc. Larva habitat tipham.

60. I. compressus.

L'Ichneumon noir à pointe du corcelet, partie des pattes & milieu du ventre fauves.

Long. 4 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, fronte, thoracis apice, tibiis ex parte abdominisque medio flavis.

Loc.

61. I. marginalis.

L'Ichneumon noir à pointe du corcelet jaune & partie antérieure du corcelet fauve.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, thoracis apice flavo, humeris pedibusque ferrugineis, segmentis abdominalibus margine albidis.

Loc.

62. I. intersectus.

L'Ichneumon arlequin.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, fronte, thoracis apice pedibus abdomineque supra flavis, thorace flavo maculato.

Loc.

62. I. curtatus.

L'Ichneumon noir à ventre fauve en devant & court pédicule.

Long. 5 ½ lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdomine antice fulvo, petiolo brevi.

Loc.

63. I. Frischii.

L'Ichneumon noir à ventre fauve en devant & à long pédicule.

Long. 10 lig. Larg. 1 ¾ lig.

I. niger, abdomine fulvo, postice nigro petiolo longissimo.

Loc.

65. I. constrictus.

L'Ichneumon noir à ventre fauve en devant & tarses antérieurs blancs.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdomine antice rufo, postice nigro, palmis anticis albis.

Loc.

66. I. nemoralis.

L'Ichneumon noir à ventre fauve au milieu & pieds de derrière blancs.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, abdominis medio pedibusque anterioribus rufis, palmis posticis albis.

Loc.

67. I. trochantericus.

L'Ichneumon noir à pattes & milieu du ventre fauves, & pieds de derrière noirs.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdominis medio, pedibusque rufis, palmis posticis nigris.

Loc.

68. I. scanicus.

L'Ichneumon noir à pattes postérieures panachées.

Long. 3 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, tibiis posticis albo nigroque variegatis.

Loc. Habitat sylvas.

69. I. Plæsseus.

L'Ichneumon à anneaux du ventre rougeâtres & pattes postérieures panachées.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, pedibus segmentorumque abdominis margine ferrugineis, tibiis posticis albo nigro fulvoque variegatis.

Loc.

70. I. coccineus.

L'Ichneumon noir à ventre couleur de cerises.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdomine coccineo.

Loc. Habitat sylvas.

71. I. rubicundus.

L'Ichneumon noir à corcelet & ventre rouges.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, thorace abdomineque rubris.
Loc.

72. I. cruentatus.
L'Ichneumon à corcelet tacheté de rouge en devant.
Long. 4 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.
I. niger punctatus, capite thoraceque antice rubro maculatis, pedibus fuscis.
Loc.

73. I. fumosus.
L'Ichneumon noir à pattes & corcelet en devant de couleur brune.
Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.
I. niger lævis, thorace antice pedibusque fuscis.
Loc. Larva devorat ova aranearum.

74. I. sessilis.
L'Ichneumon noir avec les deux anneaux antérieurs du ventre rougeâtres & les aîles noires.
Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.
I. ater, abdomine subsessili segmentis duobus anticis rufis, alis nigricantibus.
Loc.

75. I. viaticus.

L'Ichneumon noir avec les trois anneaux antérieurs du ventre rougeâtres & les aîles noires.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

I. ater, abdomine subsessili segmentis tribus anticis rufis, alis nigricantibus.

Loc. Habitat larvas papilionum quas in terram deponit.

76. I. ochrocephalos.

L'Ichneumon noir à ventre & tête jaunes.

Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. nigro, abdomine capiteque flavis alis nigricantibus.

Loc.

77. I. posticus.

L'Ichneumon noir à pattes & partie supérieure du ventre rougeâtres.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, pedibus abdominisque posticâ parte ferrugineis.

Loc.

78. I. anticus.

L'Ichneumon noir à pattes & partie antérieure du ventre rougeâtres.

Long. $\frac{3}{4}$ lig.

I. niger, pedibus abdominisque anticâ parte ferrugineis.

Loc.

79. I. labialis.

L'Ichneumon noir à ventre & pattes fauves & lèvre jaune.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger fronte flavâ, pedibus ferrugineis, abdomine rufo apice nigro.

Loc.

80. I. teniola.

L'Ichneumon noir à long filet, à pattes & partie antérieure du ventre fauves.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger fronte flavâ, pedibus ferrugineis, abdomine rufo, postice nigro, petiolo tenui longo.

Loc.

81. I. inculcator.

L'Ichneumon noir à pattes & ventre fauves.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

I. niger, pedibus abdomineque ferrugineis.

Loc.

82. I. urticæ.

L'Ichneumon noir à antennes, pattes & ventre fauves.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, antennis pedibus abdomineque ferrugineo-fuscis, setis ani corpore paulo longioribus.

Loc.

83. I. cepæ.

L'Ichneumon noir à pattes & milieu du ventre fauves.

Long. 3 lig.

I. niger, pedibus abdominisque medio ferrugineis.

Loc Habitat cepam, porrum, allia.

84. I. pupparum.

L'Ichneumon noir à pattes antérieures pâles, postérieures & milieu du ventre fauves.

Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. ater, pedibus anticis pallidis, femoribus posticis abdominisque medio ferrugineis.

Loc. Habitat puppas papilionum.

85. I. inversus.

L'Ichneumon noir à pattes antérieures citronnées & ventre fauve en dessous.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, pedibus quatuor anticis luteis, abdomine subtus fulvo.

Loc.

86. I. cinctus.

L'Ichneumon à deux bandes sur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, alis albis, fasciâ duplici nigrâ, posteriore majore.

Loc. Habitat vitra domorum.

87. I. extensor.

L'Ichneumon brun à filet.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

I. linearis, antennis longitudine corporis tentaculis setaceis, femoribus clavatis.

Loc. Idem.

88. I. albus.

L'Ichneumon blanc.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. linearis albus, fusco maculatus, abdominis petiolo tenui longo.

Loc. Habitat folia quercûs, rarus.

89. I. acicularis.

L'Ichneumon à aiguillette.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{6}$ lig.

I. linearis fuſcus, capite abdominiſque apice nigris, antennis corpore longioribus.

Loc.

90. I. aranearum.

L'Ichneumon à anneaux ſur le ventre & femelle ſans aîles.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, pedibus abdominiſque annulo duplici ferrugineis. *Maſc.*

I. apterus fulvus, capite antennarum apice abdominiſque faſciâ duplici transversâ nigris. *Femina.*

Loc. Habitat nidos aranearum.

91. I. carpini.

L'Ichneumon à pattes variées de fauve & femelle ſans aîles.

Long. 1 lig.

I. niger, pedibus rufis geniculis fuscis; fæminâ apterâ.

Loc. Habitat dumeta.

92. I. apterus.

L'Ichneumon noir à pattes & base des antennes fauves & femelle sans aîles.

Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

I. niger, pedibus antennarumque basi ferrugineis; fæminâ apterâ.

Loc.

93. I. bedeguaris.

L'Ichneumon du bedeguar.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

I. bedeguaris niger, pedibus abdominisque medio ferrugineis.

Loc. Habitat bedeguarem rosæ.

94. I. vittatus. braeon nigropedat? Lett. non

L'Ichneumon à bande jaune.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. fulvus, antennis pedibusque nigris, alis atris fasciâ transversâ luteâ.

Loc.

* 95. I. rusticus. Cryptus (Ichnoi) id. Schf. nom.

L'Ichneumon à pattes fauves & pieds noirs.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig

I. niger, pedibus rufis, setis ani corpore duplo brevioribus, tibiis posticis nigris.

Loc.

* 96. I. quadripes.

L'Ichneumon chaussé de blanc.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, abdomine falcato, palmis quatuor anticis albis.

Loc.

* 97. I. basilaris.

L'Ichneumon basilaire.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, humeris thoracis apice pedibus abdominisque basi flavo maculatis, antennis medio albis.

Loc.

* 98. I. poplitæus.

L'Ichneumon à jarretières.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdomine ferrugineo, pedibus geniculis albis, antennis annulo albo.

Loc.

* 99. I. cœlestis.

L'Ichneumon céleste étoilé.

Long. 7 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

I. niger, abdomine ferrugineo basi nigrâ, tibiis fulvis thoracis apice antennarumque medio albis.

Loc.

* 100. I. flavipes.

L'Ichneumon à ventre fauve & pattes jaunes.

Long. 4 lig. Long. 1 lig.

I. niger, abdomine ferrugineo pedibus flavis.

Loc.

* 101. I. arlequinatus.

L'Ichneumon à pattes arlequinées.

Long. 3 ½ lig. Larg. ⅔ lig.

I. niger, segmentis abdominalibus margine fulvis, pedibus ferrugineis annulis albis.

Loc.

* 102. I. ſignatus.

L'Ichneumon à raies blanches.

Long. 4 ½ lig. Larg. ⅔ lig.

I. fulvus, capite thoraceque ſupra nigris, albis ſetis corpus æquantibus.

Loc.

* 103. I. ſegmentoſus.

L'Ichneumon à baſe du ventre rouge.

Long. 4, 5 lig. Larg. ¾, 1 lig.

I. ater, alis nigris ſegmentis abdominalibus 1°, 2° & 3° rubris margine luteis.

Loc.

104. I. petiolatus.

L'Ichneumon à bande tranſverſe.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

I. fulvo fuſcoque variegatus, abdominis petiolo tenui, alis faſciâ tranſversâ fuſcâ.

Loc.

* 105. I. faſciatus.

L'Ichneumon faſcié.

Long. 9 lig. Larg. 1 ½ lig.

I. ater, antennis pedibusque flavis, segmentis abdominalibus margine luteis.

Loc.

106. I. bipartitus.

L'Ichneumon à ventre mi-parti.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, antennarum medio, thoracisque apice flavis, pedibus fulvis, abdomine antice fulvo fasciâ nigrâ, postice nigro fasciâ flavâ.

Loc.

LXXXIX. VESPA. *LA GUEPE.*

Antennæ fractæ, articulo primo longiore.

Alæ inferiores breviores.

Os maxillosum, lingua membranacea inflexa.

Aculeus ani simplex subulatus.

Abdomen petiolo brevissimo thoraci connexum.

Ocelli tres.

Corpus glabrum.

1. V. crabro.

La Guêpe-frelon.

Long. 1 pouce. Larg. 4 lig.

V. thorace nigro, antice rufo immaculato, abdominis incisuris puncto nigro duplici contiguo.

Loc. Nidificat in truncis cavis arborum.

2. V. vulgaris.

La Guêpe commune.

Long. 8 lig. Larg. 2 ½ lig.

V. thorace lineolis trium parium differentium flavescentium *

* Punctis incisurarum nullis. *Masc.*

* Punctis nigris incisurarum liberis. *Fœmina.*

Varietas A. V. thorace lineolis trium parium differentium flavescentium, punctis nigris incisurarum connexis.

B. V. thorace lineolis quatuor parium differentium flavescentium, punctis nigris incisurarum connexis.

C. V. thorace lineolis quinque parium differentium flavescentium, punctis nigris incisurarum connexis.

D. V. thorace lineolis duorum parium differentium flavescentium, punctis nigris incisurarum connexis.

Loc. Habitat domos.

3. V. arvensis.

La Guêpe à anneaux bordés de noir.

Long. 5 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

V. nigra, abdomine flavo, segmentis margine nigris.

Varietas A. V. nigra, thorace punctis octo luteis, singulis segmentis abdominalibus fasciis transversis luteis, primis interruptis.

B. V. nigra, thorace punctis decem luteis, singulis segmentis abdominalibus fasciis transversis luteis.

C. V. nigra, thoracis basi lineolis duabus flavis apice lineâ flavâ, singulo segmento abdominali fasciâ transversâ luteâ, secundâ & tertiâ interruptâ.

D. V. nigra, thoracis basi lineolis duabus flavis, apice lineâ flavâ, singulo segmento abdominali fasciâ transversâ luteâ, quatuor primis interruptis.

E. V. nigra, thoracis basi lineolis duabus flavis, apice lineâ flavâ, singulo segmento abdominali excepto 1° & 3°, fasciâ transversâ luteâ.

Loc. Habitat arva.

4.

4. V. fasciata.

La Guêpe à anneaux bordés de jaune.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

V. nigra, segmentis abdominalibus margine flavis.

Loc. Habitat flores in hortis.

5. V. bimaculata.

La Guêpe à anneaux bordés de jaune, & deux taches jaunes.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

V. nigra, thoracis maculis quindecim flavis, segmentis abdominalibus margine luteis, secundo maculâ utrinque flavâ.

Loc. Habitat alveos confertim petiolis arborum adhærentes.

6. V. longicornis.

La Guêpe à longues antennes, & quatre bandes noires sur le ventre.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

V. thorace nigro maculis flavis, abdomine flavo, fasciis quatuor nigris, antennis longis.

Loc.

7. V. infundibuliformis.

La Guêpe à premier anneau du ventre en poire & trois bandes jaunes.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, abdomine fasciis tribus flavis, tertiâ remotissimâ, primo articulo infundibuliformi.

Loc.

8. V. globulosa.

La Guêpe à premier anneau du ventre en poire & cinq bandes jaunes.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

V. nigra, abdomine fasciis quinque flavis, primo articulo infundibuliformi.

Loc.

9. V. parietum.

La Guêpe à cinq bandes jaunes sur le ventre, la première éloignée des autres.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, abdomine fasciis quinque flavis, primâ remotissimâ.

Loc. Habitat parietes.

10. V. coarctata.

La Guêpe à premier anneau du ventre en poire, & le second en cloche.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, abdominis articulo primo infundibuliformi, secundo campanulato maximo.

Loc. Habitat nidum terreum ericis inhærentem.

11. V. ordinata.

La Guêpe noire à raies de points jaunes sur le ventre.

Long. 3 ½ lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, abdomine punctorum flavorum ordine quadruplici longitudinali.

Loc.

12. V. quadri-punctata.

La Guépe noire à premier anneau du ventre bordé de jaune avec deux points sur le second & le troisième.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

V. nigra, abdominis segmento primo margine flavo, secundo & tertio puncto duplici luteo.

Loc.

13. V. guttata.

La Guépe noire à quatre points blancs sur le ventre.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

V. nigra, abdominis segmentis primo & secundo utrinque puncto albo, pedibus ferrugineis.

Loc.

14. V. pratensis.

La Guêpe noire à lèvre supérieure & base du corcelet jaunes.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

V. nigra, fronte, thoracisque basi flavis.

Varietas A. V. nigra, fronte flava.

Loc. Habitat flores.

15. V. femoralis.

La Guêpe noire à cuisses postérieures fort grosses.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

V. nigra, femoribus posticis globosis serratis, tibiis arcuatis, alarum basi genubusque flavis.

Loc. Idem.

16. V. dearticulata.

La Guêpe deginguendée.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

V. femoribus posticis crassis, globosis, serratis, denticulo donatis; abdominis globosi petiolo tenui longo.

Loc. Habitat aquatica loca.

17. V. nigra.

La Guêpe noire.

Long. 3 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

V. tota nigra cœrulescens.

Loc.

18. V. rubra.

La Guêpe rouge à bandes noires sur le corcelet & points jaunes sur le ventre.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

V. rubra, thorace lineolis longitudinalibus nigris, abdomine maculis flavis.

Loc.

* 19. V. sinuata.

La Guêpe sinuée.

Long. 7 lig. Larg. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

V. nigra, pedibus flavis, thoracis basi lineâ viridi, abdomine fasciis quatuor undulatis viridibus, primâ interruptâ.

Loc.

* 20. V. interſecta.

La Guêpe entrecoupée.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

V. nigra, pedibus flavis, thorace faſciis quatuor baſi & apice lineis flavis, abdomine faſciis ſeptem undulatis flavis interruptis.

Loc.

* 21. V. petiolata. cf. Mullerus arvensis

La Guêpe à cordons.

Long. 4 ½ lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, thoracis baſi & apice flavis, abdomine petiolato faſciis tribus luteis, tertiâ remotiſſimâ.

Loc.

* 22. V. fulvipes.

La Guêpe à pattes fauves.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, pedibus flavis, thorace punctis quatuor luteis, ſegmentis abdominalibus faſciis luteis, primis duabus interruptis.

Loc.

✱ 23. V. capitata.

La Guêpe à grosse tête.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

V. nigra, pedibus flavis, abdomine fasciis luteis, capite quadrato thorace latiori.

Loc.

24. V. carbunculus.

La Guêpe dorée à corcelet mi-parti de rouge & de vert.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

V. viridi-cœrulea, abdomine thoracisque anticâ parte ruberrimis.

Loc.

25. V. ignita.

La Guêpe dorée à corcelet vert & derniers anneaux du ventre épineux.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

V. thorace viridi cœruleo, abdomine inaurato, pone cupreo dentato.

Loc. Habitat lapidum intervalla.

26. V. aurata.

La Guêpe dorée à corcelet vert & derniers anneaux du ventre lisses.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

V. thorace viridi-cœruleo, abdomine aurato-cupreo, pone inermi.

Loc. Idem.

27. V. cuprea.

La Guêpe dorée bleue.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

V. cœrulea nitens.

Loc.

28. V. viridis.

La Guêpe dorée verte.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

V. viridis nitens.

Loc.

29. V. rufescens.

La Guêpe dorée cuivreuse à ventre fauve & noir.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

V. capite thoraceque rubro cupreo, abdomine rufo pone nigro.

Loc.

XC. APIS. *L'ABEILLE.*

Antennæ fractæ articulo primo longiore.
Alæ inferiores breviores.
Os maxillosum, linguâ membranaceâ inflexâ.
Aculeus ani simplex subulatus.
Abdomen petiolo brevissimo thoraci connexum.
Ocelli tres.
Corpus villosum.

FAMILIA I. *Corpore villoso, apis proprie dicta.*

1. A. mellifera.

L'Abeille domestique ou des ruches.

Long. 6 lig. Larg. 1 ½ lig.

A. gregaria.

Loc.

2. A. nitida.

L'Abeille brune à ventre lisse & pattes velues.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

A. subhirsuta fusca, abdomine nitido pedibus villosis.

Loc.

3. A. manicata.

L'Abeille à cinq crochets.

Long. 7 lig. Larg. 2 $\frac{2}{3}$ lig

A. abdomine fasciis flavis interruptis; apice spinâ quintuplici recurvâ armato.

Loc. Habitat flores.

4. A. parietina.

L'Abeille maçonne à poils roux.

Long. 7 lig. Larg. 2 $\frac{2}{3}$ lig.

A. nigra, thorace abdominisque basi superne lanâ rufâ.

Loc. Habitat parietes euro oppositos.

5. A. centuncularis.

L'Abeille charpentière à ventre velu & roux en dessous.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. nigra, abdomine ſupra lineis albis ſubtus lanâ flavâ.

Loc. Habitat lignum, arbores exæſas.

6. A. hirta.

L'Abeille fauve à ventre cuivreux.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

A. nigra, hirſutie-flava, abdomine ſupra glabro nitente cupreo.

Loc.

7. A. fodiens.

L'Abeille mineuſe à corcelet roux & velu.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. nigra, thorace hirſuto fulvo, abdomine glabro inciſuris albis.

Loc. Terram fodit.

8. A. cinerea.

L'Abeille griſe.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

A. nigra hirſutie cinerea.

Loc. Habitat terræ ſectiones verticales.

9. A. incisa.

L'Abeille grise à lèvre jaune & à houppe aux pattes du milieu.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

A. nigra, hirsutie cinerea, fronte flavâ incisuris abdominalibus albis.

Loc.

10. A. longicornis.

L'Abeille à longues antennes.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. hirsutie flavescens, fronte flavâ, antennis articulatim compressis corpus æquantibus.

Loc.

11. A. terrestris.

L'Abeille à lèvre jaune & anneaux du ventre blanchâtres.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. subhirsuta cinerea, abdomine nigro, segmentis albidis, fronte flavescente.

Loc. Terram fodit horisontaliter.

12. A. agreſtis.

L'Abeille à lèvre & pattes jaunes & anneaux du ventre fauves.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

A. hirſutie cinerea, pedibus labioque ſuperiore flaveſcentibus; abdomine glabro nigro inciſuris rufis.

Loc.

13. A. hortenſis.

L'Abeille à pattes jaunes & anneaux du ventre blancs.

Long. 7 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

A. hirſuta, pedibus croceis, abdomine nigro, inciſuris albis.

Loc. Habitat flores in hortis.

14. A. crocipes.

L'Abeille à pattes jaunes & ventre un peu cuivreux.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. nigra, pedibus croceis, abdomine leviter cupreo.

Loc. Idem.

15. A. cuprea.

L'Abeille verdâtre & cuivreuse.

Long. 3 ½ lig. Larg. 1 lig.

A. tota viridi-cuprea.

Loc.

16. A. muraria.

L'Abeille bleuâtre à aîles nébuleuses.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

A. nigro - cœrulescens, alis nebulosis, fronte femoribusque posticis hirsutie flavis.

Loc. Nidificat in vetustis muris.

17. A. rufescens.

L'Abeille noire à ventre brun & lisse.

Long. 4 ½ lig. Larg. 1 ⅓ lig.

A. nigra, abdomine rufo nitido, apice nigro.

Loc.

18. A. obscura.

L'Abeille noire à ventre brun & anneaux noirs.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

A. nigra, abdomine rufo nitido, incisuris nigris.

Loc.

* 19. A. interrupta.

L'Abeille à houppes blanches.

Long. 4 lig. Larg. 1 ½ lig.

A. nigra, segmentis abdominalibus fasciis albis, pilosis interruptis, alis nigris punctis albis.

Loc.

FAMILIA II. *Corpore hirsutissimo, apis bombilius.*

20. A. violacea.

L'Abeille perce-bois.

Long. 10 lig. Larg. 3 ½ lig.

A. hirsuta atra, alis violaceis.

Loc. Habitat ligna exæsa.

21. A. subterranea.

L'Abeille noire à ventre brun vers l'extrêmité.

A. hirsuta atra, ano fusco.

Loc. Terram fodit.

22. A. lapidaria.

L'Abeille noire avec les derniers anneaux du ventre fauves.

A. hirsuta atra, ano fusco.

Loc. Habitat lapidem.

23. A. coronata.

L'Abeille noire à couronne du corcelet citron, & extrémités du ventre fauves.

Long. 6 lig. Larg. 2 ½ lig.

A. nigra, fronte basique thoracis flavis, ano fulvo.

Loc.

24. A. regalis.

L'Abeille noire à couronne du corcelet & haut du ventre citron & l'extrémité du ventre fauve.

Long. 6 lig. Larg. 2 ½ lig.

A. nigra, thoracis abdominisque basi flavâ, ano fulvo.

Varietas. A. flava, abdominis medio nigro, ano fulvo.

Loc.

25. A. virginalis.

L'Abeille à couronne du corcelet & haut du ventre citron, & l'extrémité du ventre blanche.

Long. 7 lig. Larg. 4 lig.

A. nigra, thoracis abdominisque basi flavâ, ano ~~fulvo.~~ albo.

Loc.

26. A. hypnorum.

L'Abeille à couronne & extrêmités du corcelet & haut du ventre citron, & l'extrémité du ventre blanche.

Long. 7 lig. Larg. 3 lig.

A. nigra, thoracis basi & apice, abdominisque basi flavis, ano albo.

Loc.

27. A. vestalis.

L'Abeille à couronne du corcelet citron & extrémité du ventre mi-partie de citron & de blanc.

Long. 10 lig. Larg. 4 lig.

A. nigra, thoracis basi flavâ, ano supra flavo, apice albo.

Loc.

28. A. rustica.

L'Abeille noire à ventre fauve.

Long. 5 ½ lig. Larg. 2 lig.

A. nigra, abdomine fulvo.

Loc.

29. A. muscorum.

L'Abeille fauve à ventre jaune & extrémité fauve.

Long. 5 lig. Larg. 2 ½ lig.

A. thorace fulvo, abdomine fulvo, ano fulvo.

Loc. Nidum pilis intus paleis extus ædificat.

XCI. FORMICA. *LA FOURMI.*

Antennæ fractæ, articulo primo longiore.

Alæ inferiores breviores, neutris nullæ.

Os maxillosum.

Abdomen petiolo brevi thoraci connexum cum squamâ intermediâ.

Ocelli tres.

1. F. fuſcoptera.

La grande Fourmi à ailes à moitié brunes.

Long. 7 lig. Larg. 1 lig.

F. nigra, alarum dimidio fuſco.

Loc. Habitat ſylvas.

2. F. flavipes.

La Fourmi noire à antennes & pattes jaunes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

F. nigra, antennis pedibuſque flavis.

Loc. Habitat hortos.

3. F. maculata.

La Fourmi brune à pattes fauves.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

F. fuſca, pedibus rufis, thorace maculâ flavâ.

Loc. Idem.

4. F. rufa.

La Fourmi brune à corcelet fauve.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

F. fuſca, thorace fulvo.

Loc. Idem.

5. F. fusca.

La Fourmi toute brune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

F. fusca.

Loc.

6. F. nigra.

La Fourmi toute noire.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

F. atra.

Loc.

SECTIO QUINTA.

INSECTA DIPTERA.

XCII. OESTRUS. *L'OESTRE.*

Antennæ ſetaceæ è globulo prodeuntes.

Os nullum, puncta tantum tria.

Ocelli tres.

1. O. hæmorrhoidalis.

L'Oeſtre du fondement des chevaux.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

O. villoſus, pallido-flaveſcens, abdominis medio cingulo nigro, apice fulvo.

Loc. Larva habitat inteſtinum rectum equi.

2. O. ovis.

L'Oeſtre des moutons.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

O. cinereus, nigro maculatus & punctatus.

Loc. Larva habitat ſinum frontalem ovium.

3. O. bovis.

L'Oestre des bœufs.

O. thorace flavo, cingulo nigro; alis nigrâ fasciâ, pedibus pallidis.

Loc. Larva habitat cutem boum.

XCIII. TABANUS. *LE TAON.*

Antennæ setaceo conicæ è quatuor partibus.

Os proboscide dentibusque conniventibus.

Ocelli tres.

1. T. bovinus.

Le Taon à ventre jaunâtre & taches triangulaires blanches.

Long. 11 lig. Larg. 4 lig.

T. thorace cinereo; abdomine flavescente segmentis singulis triangulo albo.

Loc. Idem.

2. T. triangularis.

Le Taon gris à taches blanches triangulaires sur le ventre.

Long. 7 lig. Larg. 1 ½ lig.

T. cinereus thorace fasciis longitudinalibus albis, abdominis segmento singulo triangulo maculisque albis.

Loc. Habitat prata.

3. T. albipes.

Le Taon brun à jambes blanchâtres.

Long. 7 lig. Larg. 3 lig.

T. fuscus, tibiis albido-pallidis.

Loc. Idem.

4. T. dichotomus.

Le Taon noir à antennes fourchues.

Long. 7 lig. Larg. 3 lig.

T. totus niger, antennis diochotomis.

Loc. Idem.

5. T. pluvialis.

Le Taon à aîles brunes piquées de blanc.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. fuscus, alis cinereis punctis minutissimis albis.

Loc. Idem.

6.

6. T. interſectus.

Le Taon noir à anneaux du ventre bordés de blanc.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

T. niger, thorace lineis duabus longitudinalibus cinereis, abdominis ſegmentis limbo cinereo.

Loc. Habitat ſylvas.

7. T. bromius.

Le Taon gris à jambes fauves.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. cinereus, tibiis flavis.

Loc.

8. T. cœcutiens.

Le Taon brun à côtés du ventre jaunes & aîles tachetées de noir.

Long. 4 ½ lig. Larg. 1 lig.

T. fuſcus, abdominis lateribus pedibuſque flavis, alis maculis flavis.

Loc.

9. T. lateralis.

Le Taon brun à côtés du ventre jaunes & aîles blanches.

T. fuſcus, abdominis lateribus pedibuſque flavis, alis immaculatis albis.

Loc.

10. T. biſaſciatus.

Le Taon à deux bandes noires ſur les aîles.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. fuſcus abdomine antice luteo, alarum margine exteriore, faſciiſque duabus tranſverſis nigris.

Loc. Habitat ſylvas humidas.

11. T. marmoratus.

Le Taon à une ſeule bande panachée.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. cinereus, abdomine flavo maculis triangularibus nigris, alarum margine exteriore, faſciâque tranſversâ marmoratâ fuſcâ.

Loc. Habitat prata.

XCIV. ASILUS. *L'ASILE.*

Antennæ ſetaceo-conicæ quadripartitæ.

Os roſtro ſubulato acuto.

Ocelli tres.

1. A. lanigerus.

Le Bichon.

Long. 4, 5 lig. Larg. 2 lig.

A. lanigerus, alarum baſi fuſcâ.

Loc. Habitat flores.

2. A. fulvus.

L'Aſile velu de couleur.

Long. 9 lig. Larg. 3 lig.

A. hirſutus ferrugineus, alis fulvis femoribus nigris.

Loc. Habitat prata.

3. A. crabroniformis.

L'Aſile brun à ventre à deux couleurs.

Long. 1 pouce. Larg. 2 ½ lig.

A. ferrugineus, abdominis articulis tribus prioribus atris, posterioribus quatuor flavis.

Loc. Habitat prata humida.

4. A. gilvus.

L'Asile noir à tache fauve sur le ventre.

Long. 10 lig. Larg. 2 ½ lig.

A. niger, abdominis segmentis tribus à tergo rufis.

Loc. Idem.

5. A. ater.

L'Asile tout noir.

Long. 8 lig. Larg. 1 ½ lig.

A. totus niger, subhirsutus, alis atris.

Loc. Habitat ripas amnium.

6. A. undulatus.

L'Asile noir velu à pattes & balanciers fauves & aîles noires ondées.

Long. 7 lig. Long. 1 ½ lig.

A. niger hirſutus, tibiis halteribuſque ferrugineis, alis nigro undulatis.

Loc. Habitat prata.

7. A. marmoratus.

L'Aſile noir liſſe, à antennes, cuiſſes & balanciers fauves & aîles ondées de brun.

Long. 7 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

A. niger glaber, antennis, femoribus, halteribus, tibiiſque ſecundi & poſtici paris rufis, alis fuſco undulatis.

Loc. Habitat Fontem-Bellaquæum.

3. A. ælandicus.

L'Aſile noir liſſe à pattes & balanciers fauves, & aîles toutes noires.

Long. 6 ½ lig. Larg. 1 lig.

A. niger glaber, femoribus halteribuſque ferrugineis, alis nigris.

Loc. Habitat ſylvas humidas.

9. A. venosus.

L'Asile noir lisse, à pattes & balanciers fauves & aîles blanches veinées.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

A. niger glaber, femoribus halteribusque ferrugineis, alis albis venis nigris.

Loc. Habitat hortos.

10. A. tarsosus.

L'Asile noir lisse, à pattes fauves & tarses noirs.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. niger glaber, femoribus tibiisque rufis, alarum puncto marginali nigro.

Loc. Idem.

11. A. marginatus.

L'Asile noir lisse à balanciers blancs & aîles bordées de noir.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. niger glaber, halteribus albis, alis subrotundis obscuris margine nigro.

Loc. Idem.

12. A. gibbosus.

L'Asile à antennes en massue & aîles brunes.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. antennis capite longioribus clavatis acuminatis, nigro rufoque varius, glaber, segmentis abdominalibus secundo & tertio margine flavis, alis fusco nebulosis.

Loc. Habitat prata.

13. A. clavicornis.

L'Asile à antennes en massue, & aîles brunes bordées de blanc.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. antennis capite longioribus clavatis acuminatis, nigro rufoque varius, glaber, segmentis abdominalibus omnibus margine flavis, alis fuscis margine albo.

Loc. Idem.

14. A. Schæfferi.

L'Asile panaché de fauve & de noir à aîles noires.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. antennis capite brevioribus clavatis setosis, nigro rufoque varius, glaber, alis nigris, oris aculeo in medio incurvato.

Loc. Habitat prata.

15. A. armatus.

L'Asile noir lisse à pattes & devant de la tête fauves.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

A. niger glaber, fronte pedibusque rufis, oris aculeo in medio incurvato.

Loc. Idem.

16. A. forcipatus.

L'Asile cendré.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

A. cinereus hirsutus.

Loc. Habitat arva & prata.

17. A. tipuloïdes.

L'Asile à pattes fauves allongées.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. lividus, thoracis lineis dorsalibus tribus nigris.

Loc. Idem.

18. A. reticulatus.

L'Asile fauve à aîles réticulées.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. pallido fulvus, thorace lineis dorsalibus tribus nigris, alis incumbentibus reticulatis.

Loc. Habitat arva & prata.

19. A. viridis.

L'Asile vert doré.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. viridis nitens pedibus albis.

Loc. Habitat flores.

20. A. crassipes.

L'Asile noir à pieds de devant en massue.

Long. $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. niger, pedibus anticis articulo tarsi primo crasso clavato.

Loc. Idem.

21. A. lacrymosus.

L'Asile larmoyant.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. thorace nigro lineis cinereis, abdomine fulvo, maculis nigris longitudinaliter positis.

Loc.

* 22. A. fulvopterus.

L'Asile à aîles fauves.

Larg. 5 lig. Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. niger, thorace lineis cinereis, alis fuscis basi fulvis.

Loc.

XCV. STRATIOMYS. *LA MOUCHE-ARMÉE.*

Antennæ setaceæ fractæ.
Os proboscide absque dentibus.
Thoracis apex aculeatus.
Ocelli tres.

FAMIL. I. *Thoracis aculeis duobus.*

1. S. chamæleon.

La Mouche-armée à ventre plat chargé de six lunules.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

S. fusca, thorace subhirsuto ferrugineo, abdomine glabro ovato plano, lunulis sex luteis.

Loc. Larva habitat aquam.

2. S. Schæfferi.

La Mouche-armée à ventre plat & brun.

S. fusca, thorace hirsuto ferrugineo, abdomine glabro ovato plano immaculato.

Loc. Idem.

3. S. coccinea.

La Mouche-armée à corcelet rouge satiné.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

S. nigra, thorace sericeo rubro utrinque spinoso.

Loc.

4. S. hydroleon.

La Mouche-armée à ventre vert.

Long. 3 ½ lig. Larg. 1 lig.

S. fusca, abdomine viridi fasciâ longitudinali nigrâ.

Loc.

5. S. albipes. Entomyia ligurica (F) volgens Olivier.

La Mouche-armée noire à pattes blanches.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. nigra, tibiis albidis, alarum margine exteriore nigro.

Loc.

6. S. maculata.

La Mouche-armée noire à taches jaunes.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

S. atra, thorace abdomineque maculis flavis.

Loc. Habitat Fontem-Bellaquæum.

7. S. fasciata.

La Mouche-armée jaune à bandes noires.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

S. luteo-virescens, thorace lineis tribus longitudinalibus, abdomine tribus transversis arcuatis nigris.

Loc. Habitat prata.

FAMILIA II. *Thoracis aculeis sex.*

8. S. nigroptera.

La Mouche-armée noire à ventre & cuisses jaunes.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. nigra, alis nigris, femoribus abdomineque luteis.

Loc. Idem.

XCVI. MUSCA. *LA MOUCHE.*

Antennæ è patellâ planâ solidâ, setâ laterali seu pilo.

Os proboscide absque dentibus.

Ocelli tres.

FAMILIA I. *Alis variegatis.*

1. M. grossificationis.

La Mouche à aîles noires & tache blanche à l'extrémité.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, alis nigris, apice maculâ rotundâ albâ.

Loc. Habitat hortos.

2. M. morio.

La Mouche à aîles noires bordées de blanc ondé.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

M. atra hirsuta, margine alarum tenuiore sinuato albicante.

Loc. Idem.

3. M. stellata.

La Mouche à l'étoile.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. cinerea, alis albis apice maculâ rotundâ radiatâ.

Loc. Idem.

4. M. vibrans.

La Mouche à aîles vibrantes ponctuées.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. alis albis, apice nigris.

Loc. Habitat arbores.

5. M. grossa.

La Mouche noire à base des aîles jaune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

M. atra, basi alarum ferrugineâ.

Loc. Habitat prata.

6. M. vivipara.

La Mouche noire à ventre brun & base des aîles fauve.

M. thorace atro, abdomine fusco, basi alarum ferrugineâ.

Loc. Habitat hederam arboream.

7. M. cardui.

La Mouche à zig-zag sur les aîles.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. alis albis, lineâ undulatâ fuscâ sigmoïdæâ.

Loc. Larva habitat cirsium.

8. M. sigmoïdæa.

La Mouche à aîles réticulées avec une tache en zig-zag.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. alis unguiculatis, albo fuſcoque reticulatis, lineâ undulatâ ſigmoïdeâ nigriore.

Loc.

9. M. duplicata.

La Mouche à aîles réticulées avec deux taches noires.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. alis unguiculatis, albo fuſcoque reticulatis, maculâ duplici nigrâ.

Loc. Larva habitat capita helenii.

10. M. reticulata.

La Mouche à aîles réticulées à bandes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, alis albo nigroque reticulatis, faſciis tranſverſis obſcurioribus.

Loc. Habitat hortos.

11. M. trimaculata.

La Mouche à aîles jaunes chargées de points & de trois taches brunes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. flava, alis fulvis, maculâ triplici, punctiſque plurimis fuſcis.

Loc.

12. M. punctifera.

La Mouche à aîles blanches chargées de points & de trois taches brunes.

M. cinerea, alis albis, maculâ triplici, punctiſque plurimis fuſcis.

Loc.

13. M. ſolſtitialis.

La Mouche des têtes de chardon.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. alis unguiculatis albis, faſciis tribus fuſcis, thoracis apice flavo.

Loc. Larva habitat cirſium & carduos.

14. M. 4-faſciata.

La Mouche jaune à quatre bandes brunes ſur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. flavescens, alis albis, fasciis quatuor transversis fuscis, nonnullis connexis, thorace punctis nigris.

Loc.

15. M. 5-fasciata.

La Mouche noire, à cinq bandes noires sur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. nigra, alis albis, fasciis quinque transversis nigris, nonnullis connexis.

Loc. Habitat hortos.

16. M. marmorata.

La Mouche à aîles marbrées.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

M. fulva, alis unguiculatis fulvis fusco marmoratis maculis albis.

Loc.

17. M. conferta.

La Mouche noire à aîles picotées.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. atra, alis rotundatis nigris punctis confertis albis.

Loc.

18. M. aſelliformis.

La Mouche noire à deux bandes blanches ſur les aîles.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. nigra, alis fuſcis faſciâ duplici transversâ albâ.

Loc. Habitat ſylvas.

*19. M. vitrata.

La Mouche à aîles vitrées.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

M. thorace fuſco lineis pallidis, abdomine baſi luteâ punctis nigris; alis nigris maculis albis.

Loc.

FAMILIA II. *Ore larvato.*

20. M. larvata.

La Mouche cendrée à quatre bandes noires ſur les aîles dont la troiſième eſt diviſée en deux.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. cinerea, alis ſubfulvis, faſciis quatuor tranſverſis nigris, tertiâ interruptâ.

Loc. Habitat prata.

21. M. perſonata.

La Mouche cendrée à points & aîles marbrées.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. cinerea, nigro punctata, alis albo fuſcoque marmoratis.

Loc.

22. M. teſſellata.

La Mouche à aîles réticulées de brun.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. alis fuſco teſſelato-reticulatis.

Loc.

23. M. claviformis.

La Mouche à corcelet noir à gros ventre jaune & aîles enfumées.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. thorace nigro, abdomine fulvo clavato, alis fusco nebulosis.

Loc. Habitat hortorum humum recentem.

24. M. cingulata.

La Mouche à zone.

Long. 8 lig. Larg. 3 lig.

M. fulva, abdomine flavo, segmenti primi & secundi margine nigro, alis fulvo nebulosis.

Loc.

25. M. longicornis.

La Mouche à tache brune sur le bord de l'aîle & point noir au milieu.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. cinerea, thorace fasciis nigris, alarum margine externo maculis fuscis, medio puncto nigro.

Loc.

26. M. aquatica.

La Mouche à bord des aîles jaunâtre, & trois points noirs sur chacune.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. cinerea, thorace fasciis fuscis, alarum margine externo flavescente singulo punctis tribus nigris.

Loc. Larva habitat lentem palustrem.

27. M. geographica.

La Mouche à aîles géographiques.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, abdomine fulvo fasciâ longitudinali nigrâ, alis albo fuscoque variegatis.

Loc.

FAMILIA III. *Variegatæ.*

28. M. vespiformis.

La Mouche imitant la guêpe, à courtes antennes.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

M. nigra, flavo variegata, alis fuſcis, antennis capite brevioribus.

Loc. Habitat flores.

29. M. feſtiva.

La Mouche imitant la guêpe, à longues antennes.

M. nigra, flavo variegata, alis fuſcis, antennis capite longioribus.

Loc.

30. M. interſecta.

La Mouche à corcelet noir taché de jaune, & ventre jaune à bandes noires.

Long. 5 ½ lig. Larg. 2 ½ lig.

M. thorace nigro, flavo maculato, abdomine flavo, faſciis tranſverſis nigris.

Loc. Habitat ſylvas.

31. M. bombyliformis.

La Mouche velue noire & fauve imitant le bourdon.

M. hirsuta nigra, thorace antice, abdomineque supra flavis.

Loc. Larva habitat radicem narcissi.

32. M. saltatrix.

La Mouche jaune à bande noire.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

M. lutea; thorace lineis tribus longitudinalibus, abdomine plurimis transversis nigris.

Loc. Habitat folia plantarum.

33. M. hemisphærica.

La Mouche noire, à ventre hémisphérique roux tacheté de noir.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. nigra, abdomine hemisphærico rufo, punctorum nigrorum ordine longitudinali.

Loc.

34. M. caudata.

La Mouche noire à ventre jaune noir dans le milieu.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M.

M. nigra, abdomine hemisphærico luteo, fasciâ longitudinali nigrâ.

Loc. Larva habitat aquas stagnantes.

35. M. hortensis.

La Mouche brune à bandes transverses blanchâtres sur le ventre.

Long. 4 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

M. fusca, marginibus incisurarum abdominis cinereis, alis ferrugineis.

Loc. Habitat flores.

36. M. aphidivora.

La Mouche noire à bandes transverses jaunes sur le ventre.

Long. 3 lig. Larg. ⅓ lig.

M. nigra, marginibus incisurarum abdominis flavis, alis fuscis.

Loc. Habitat flores, aphides devorat.

37. M. nemorum.

La Mouche cendrée à bandes blanches sur le ventre, & deux grandes taches jaunes sur le premier anneau.

Long. 4 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

M. thorace cinereo, abdominis basi fasciâ luteâ interruptâ marginibus incisurarum exalbidis.

Loc.

38. M. ribesii.

La Mouche à quatre bandes jaunes sur le ventre, dont la première est interrompue.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. abdomine ovato nigro, lunularum pari singulisque tribus flavescentibus.

Loc. Habitat ribesium.

39. M. interrupta.

La Mouche brune à deux taches jaunes à la base du ventre.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

M. fusca, abdominis basi fasciâ luteâ interruptâ.

Loc. Habitat flores.

40. M. pendula.

La Mouche à corcelet ſtrié & bandes jaunes interrompues ſur le ventre.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

M. thorace ſtriis quatuor flavis; abdominalibus ſegmentis tribus interrupto-flavis.

Loc. Habitat flores.

41. M. inæqualis.

La Mouche à bandes jaunes alternativement plus larges ſur le ventre.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

M. thorace nigro-viridi, apice flavo, abdomine nigro faſciis tranſverſis luteis, alternis majoribus.

Loc. Habitat horros.

42. M. transfuga.

La Mouche à pointe du corcelet & bande ſur le ventre de couleur jaune.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. thorace nigro-viridi, apice flavo; abdomine nigro fasciis luteis transversis æqualibus.

Loc. Habitat flores.

43. M. orbiculata.

La Mouche à points jaunes ronds sur le ventre.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

M. thorace nigro; abdomine atro, paribus tribus macularum rotundarum lutescentium.

Loc. Larva aphides devorat.

44. M. mellina.

La Mouche à points jaunes triangulaires sur le ventre.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. thorace nigro-viridi apice flavo; abdomine oblongo, paribus tribus trigonorum lutescentium.

Loc. Idem.

45. M. tetragona.

La Mouche à six points jaunes quarrés sur le ventre.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. thorace nigro-viridi; abdomine oblongo, paribus tribus tetragonorum lutescentium.

Loc. Larva aphides devorat.

46. M. quadrata.

La Mouche à quatre points jaunes sur le ventre.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. nigro-viridis, abdomine paribus duobus tetragonorum lutescentium.

Loc. Habitat hortos.

47. M. pyrastri.

La Mouche à six taches blanches en croissant sur le ventre.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

M. thorace nigro-viridi, abdomine atro ovato, tribus paribus lunularum albicantium.

Loc. Habitat hortos; larva aphidivora.

48. M. lineata.

La Mouche dorée à trois paires de raies blanches sur le ventre.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. aurata abdomine nigro, tribus paribus linearum albicantium.

Loc. Habitat hortos.

49. M. vorax.

La Mouche brune à huit taches jaunes oblongues sur le ventre.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

M. thorace nigro-viridi apice flavo; abdomine atro, quatuor paribus macularum oblongarum flavescentium.

Loc. Larva aphidivora.

50. M. pipines.

La Mouche à grosses cuisses.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. oblonga femoribus posticis majoribus.

Loc. Idem.

51. M. coalescens.

La Mouche à antennes réunies.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

M. nigra, abdominis medio ferrugineo antennis basi coalitis.

Loc.

* 52. M. turcica.

La Mouche aux croissans d'or.

Long. 4 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

M. nigra thoracis lateribus & apice flavis, abdominis fasciis tribus arcuatis luteis interruptis, alarum margine lutescente.

Loc.

53. M. cruentata.

La Mouche noire à bande rouge transverse sur le ventre.

Long. 2 lig. Larg. ½ lig.

M. atra, abdominis fasciâ transversâ rubrâ.

Loc. Rara in hortis.

* 54. M. doliata.

La Mouche à cerceaux.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

M. thorace hirsuto fulvo, abdomine nigro, cingulis quatuor flavis.

Loc.

55. M. apiformis.

La Mouche apiforme.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

M. fusca; segmentis abdominalibus tribus margine albidis primo latere flavo, thorace vix maculato.

Loc. Larva habitat aquam stagnant. & mucum vegetabilem ex quo papyrus extrahitur.

* 56. M. adunata.

La Mouche à antennes en y-grec.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

M. nigra, flavo variegata, alarum parte externâ nigrâ, antennis basi coalitis.

Loc.

FAMILIA IV. *Auratæ.*

57. M. cæsar.

La Mouche dorée commune.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

M. thorace abdomineque viridi nitente pedibus nigris.

Loc. Larva habitat cadavera, undèquaque.

58. M. ſericea.

La Mouche cuivreuſe à pattes blanches.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. thorace, abdomineque viridi ſericeo pedibus pallidis, alis albis.

Loc. Habitat hortos.

59. M. cuprea.

La Mouche verte cuivreuſe à aîles mi-parties de brun & de blanc.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. thorace abdomineque viridi ſericeo, pedibus pallidis, alarum medio fuſco.

Loc. Habitat ſuperficiem aquæ & loca humida.

60. M. trinervis.

La Mouche dorée à trois nervures ſur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. thorace abdomineque viridi nitenti pedibus ferrugineis, alis trinervis.

Loc. Habitat ſylvas.

61. M. cadaverina.

La Mouche dorée à corcelet bleu & ventre vert.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. thorace cœruleo nitente, abdomine viridi nitente.

Loc. Larva habitat cadavera.

62. M. putris.

La Mouche à corcelet vert & ventre bleu.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. thorace viridi nitente, abdomine cœruleo nitente.

Loc. Idem.

63. M. vomitoria.

La Mouche bleue de la viande.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

M. thorace nigro, abdomine cœruleo.

Loc. Habitat carnes apud laniones, &c. frequentissima.

64. M. hederacea.

La Mouche bleue à base des aîles fauve.

M. cœrulea, basi alarum ferrugineâ.

Loc. Larva habitat hederam, vivipara.

65. M. cupraria.

La Mouche dorée à tache brune sur les aîles.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. oblonga, capite viridi, thorace aureo, abdomine cupreo, alis maculâ fuscâ.

Loc. Habitat hortos.

66. M. contracta.

La Mouche dorée à ventre brun & noir.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

M. oblonga, thorace æneo; abdomine anterius flavo, posterius nigro.

Loc. Habitat sylvas.

67. M. annulata.

La Mouche verdâtre à anneau blanc aux tarses.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. thorace viridi nitente abdomine æneo tarsorum annulo albo.

Loc. Habitat humum recentem, gallice (*les couches*).

68. M. plumbea.

La Mouche brune bronzée.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. tota plumbea.

Loc.

* 69. M. smaragdina.

La Mouche à tête verte.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. capite viridi, capite plumbeo nitente, pedibus flavis, alis nervosis.

Loc.

FAMIL. V. *Vulgares.*

70. M. carnaria.

La grande Mouche à extrêmité du ventre rougeâtre.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, abdomine nitido tessellato; thorace lineolis pallidioribus longitudinalibus; ano fulvâ.

Loc. Habitat carnes & hortos; vivipara.

71. M. domestica.

La Mouche commune.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. nigra, abdomine nitido tessellato, thorace lineolis pallidioribus longitudinalibus, ano concolore.

Loc. Habitat domos, frequentissima.

72. M. cinerascens.

La Mouche cendrée à poils noirs.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. cinerea tota, pilis nigris.

Loc. Larva habitat fimeta.

73. M. pluvialis.

La Mouche cendrée à points noirs.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. cinerea, thorace quinque maculis nigris, abomine maculis tridentatis.

Loc. Larva habitat folia humida.

74. M. ſtercoraria.

La Mouche merdivore.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. hirſuta cinerea, alis puncto obſcuro.

Loc. Habitat fæces bovinas.

75. M. ſpiniſera.

La Mouche noire à pattes épineuſes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. nigra, alis fuſcis, pedibus ſpinoſis.

Loc. Habitat arbores.

76. M. caracteriſtica.

La Mouche à caractères noirs.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. thorace nigro, lineolis quatuor longitudinalibus albidis; abdomine fuſco, medio caracteribus nigris.

Loc. Habitat flores.

77. M. fulvipes.

La Mouche noire à pattes fauves.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, alis incumbentibus pedibus ferrugineis.

Loc. Habitat folia humida.

78. M. guttata.

La Mouche noire à tache blanche sur le ventre.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, alis incumbentibus halteribus abdominisque maculâ albis.

Loc.

79. M. divaricata.

La Mouche toute noire.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, alis divaricatis pedibus nigris.

Loc. Habitat hortos.

80. M. globulipes.

La Mouche à tarses antérieurs très-gros.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, tarsis anticis clavatis crassis.

Loc. Habitat hortos; rarior.

81. M. fallax.

La Mouche noire avec un trait noir sur la moitié du bord extérieur de l'aîle.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. atra; alis albis, marginis exterioris medietate supernâ lineâ nigrâ.

Loc. Habitat flores.

82. M. fimetorum.

La Mouche noire à ailes brunes & yeux rouges.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, alis fuscis oculis rubris.

Loc. Habitat fimeta.

83. M. lateralis.

La Mouche noire avec le devant de la tête blanc, & les côtés du ventre fauves.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. nigra fronte albâ, abdominis lateribus ferrugineis.

Loc. Habitat hortos & arva.

84. M. marginalis.

La Mouche à point marginal brun sur les aîles.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. fusca, alis maculâ marginali fuscâ.

Loc. Habitat hortos.

85. M. longipes.

La Mouche à point marginal sur les aîles & pattes jaunes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. fusca, alis puncto marginali fusco, pedibus flavescentibus.

Loc. Habitat flores.

86. M. tipulæa.

La Mouche grise à pattes longues & jaunes.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. cinerea, pedibus flavescentibus.

Loc. Idem.

87. M. Ichneumonoides.

La Mouche noire à pattes jaunes & ventre allongé, semblable à un ichneumon.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, pedibus flavis, antennis abdomineque tenuibus productis.

Loc. Habitat hortos, rarissima.

88. M. pulicaria.

La Mouche noire à pattes jaunes & bord exterieur des aîles noir.

Long. 1 lig. Long. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, pedibus flavis alarum margine externo nigro.

Loc. Habitat flores.

89. M. libatrix.

La Mouche à aîles vibrantes sans taches.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. nigra, pedibus rufis, alis vibrantibus immaculatis.

Loc. Habitat folia arborum in sylvis.

90. M. cellaris.

La Mouche du vinaigre.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. ferrugineo-fusca, subpilosa, oculis ferrugineis, alis trinervis.

Loc. Habitat vinum & acetum, frequentissima.

91. M. flava.

La Mouche jaune aux yeux noirs.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. flava, oculis nigris.

Loc. Habitat flores & domos.

92. M. pigra.

La Mouche jaune à bandes noires sur le corcelet.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

M. flava, abdomine supra fusco, thorace tribus striis nigris.

Loc. Habitat flores.

93. M. cruciata.

La Mouche jaune à aîles bleuâtres & croisées.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. flavescens, oculis nigris, alis incumbentibus glaucis.

Loc. Habitat flores.

XCVII. STOMOXYS. *Le Stomoxe.*

Antennæ patellatæ setâ laterali pilosâ.

Os rostro subulato simplici acuto.

Ocelli tres.

1. S. calcitrans.

Le Stomoxe.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

Loc. Habitat prata, autumnalis; equos lacessit.

XCVIII. VOLUCELLA. *La Volucelle.*

Antennæ patellatæ setâ laterali pilosâ capiti insidentes.

Os proboscide vaginâ acutâ seu rostro reconditum.

Ocelli tres.

1. V. pelluceus.

La Volucelle à ventre blanc en devant.

Long. 5 ½ lig. Larg. 3 lig.

V. abdomine antice albo, postice nigro; alis albis, nigrâ maculâ.

Loc. Habitat rosam.

2. V. nigra.

La Volucelle à ventre tout noir.

Long. 5 ½ lig. Long. 3 lig.

V. tota nigra, pilis fulvis; alis albis maculâ nigrâ.

Loc. Idem.

3. V. flavescens.

La Volucelle à ventre jaunâtre.

Larg. 4 lig. Long. 1 ½ lig.

V. thorace nigro, apice fulvo; abdomine flavescente.

Loc. Habitat hortos, rara.

4. V. maculata.

La Volucelle à tache noire.

Long. 5 ½ lig. Larg. 2 ⅓ lig.

V. nigra pilosa, abdominis apice pilis fulvis, alis albis maculâ nigra.

Loc. Habitat flores umbellatos & aquaticos.

XCIX. NEMOTELUS. *La Nemotele.*

Antennæ moniliformes, stylo terminatæ rostro insidentes.

Os proboscide, vaginâ acutâ seu rostro reconditum.

Ocelli tres.

1. N. fasciatus.

La Nemotèle à bande.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

N. niger, abdomine niveo fasciis duabus nigris.

Loc. Habitat flores.

2. N. punctatus.

La Némotèle noire à ventre tacheté de blanc.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

N. niger, abdomine punctis albis.

Loc. Habitat prata humida.

3. N. ſtellaris.

La Némotèle à points d'argent.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

N. niger, hirſutie flava conſperſus, alarum baſi puncto argenteo.

Loc.

C. SCATHOPSE. *LE SCATOPSE.*

Antennæ filiformes.

Os proboſcide abſque dentibus.

Ocelli tres.

1. S. nigra.

Le Scatopſe noir.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

S. nigra.

Loc. Habitat loca humida & latrinas.

2. S. buxi.

Le Scatopſe du bouis.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. flava, alis albis.

Loc. Habitat folia buxi, quæ ſubtùs contorquet.

CI. HIPPOBOSCA. *L'HIPPOBOSQUE.*

Antennæ ſetaceæ breviſſimæ ex unico pilo.
Os roſtro cylindrico obtuſo.
Ocelli tres.

1. H. equina.
La Mouche à chien.
Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.
H. pedibus tetradactylis, alis cruciatis.
Loc. Habitat cutem canis, equi, &c.

2. H. hirundinis.
La Mouche araignée.
Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.
H. pedibus ſexdactylis, alis divaricatis.
Loc. Habitat nidos hirundinum.

CII. TIPULA. *LA TIPULE.*

Antennæ filiformes, ſubpectinatæ (maribus ſæpe plumoſæ) capite multo longiores.
Os tentaculis incurvis articulatis.
Ocelli tres.

FAMILIA

FAMIL. I. *Alis patentibus.*

1. T. crocata.

La Tipule variée de brun, de jaune & de noir.

Long. 7 lig. Larg. 1 lig.

T. corpore nigro, fulvo, flavoque variegata.

Loc. Larva habitat exæsas arbores.

2. T. rivosa.

La Tipule à aîles panachées.

Long. Mâle 10 lig. Femelle 14 lig.

T. alis albis fusco variegatis.

Loc. Habitat prata.

3. T. oleracea.

La Tipule à bords des aîls bruns.

Long. 8, 9 lig. Larg. 1 lig.

T. alis exalbidis, lineâ marginali fuscâ.

Loc. Idem.

4. T. lunata.

La Tipule à aîles cendrées avec une tache blanche marginale.

Long. 8 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. alis cinerascentibus, lunulâ albâ marginali.

Loc. Habitat prata.

5. T. cornicina.

La Tipule jaune à points noirs rangés en trois bandes sur le ventre.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

T. alis subfuscis, thorace flavo caracteribus nigris, abdomine luteo punctorum nigrorum lineis tribus longitudinalibus.

Loc. Idem.

6. T. caracteristica.

La Tipule jaune à tache marginale sur les aîles, & à bande brune sur le ventre.

Long. 5 lig. Long. 1 lig.

T. flava, alis subfuscis, puncto marginali fusco, thorace caracteribus nigris, abdomine lineâ longitudinali nigrâ.

Loc. Habitat prata.

7. T. melanopis.

La Tipule jaune aux yeux noirs.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. flava oculis nigris.

Loc. Idem.

8. T. contaminata.

La Tipule noire à taches jaunes & aîles maculées.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, pedibus abdominisque maculis utrinque lividis, alis nigro maculatis.

Loc. Idem.

9. T. duplicata.

La Tipule brune à double poine marginal.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. fusca, alis albis puncto marginali duplici fusco.

Loc. Habitat prata.

10. T. nigra.

La Tipule noire à aîles brunes.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis fuscis, corpore atro.

Loc. Idem.

11. T. atra.

La Tipule toute noire.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

T. tota atra lævis.

Loc. Idem.

12. T. marginata.

La Tipule noire à ventre bordé de jaune.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

T. atra abdomine utrinque limbo ferrugineo.

Loc. Idem.

13. T. plumbea.

La Tipule de couleur plombée à aîles blanches.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

T. plumbea, alis albis.

Loc. Habitat prata.

14. T. marginalis.

La Tipule jaune à point marginal de couleur cendrée.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

T. flavescens, puncto marginali alarum cinereo.

Loc. Idem.

FAMIL. II. *Alis incumbentibus.*

15. T. tesselata.

La Tipule à aîles en damier.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis albo fuscoque tesselatis corpore fusco.

Loc. Idem.

16. T. plumosa.

La Tipule à corcelet vert & point marginal noir sur les aîles.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. fusca, thorace virescente; alis pellucidis puncto nigro.

Loc. Habitat ripas aquarum.

17. T. littoralis.

La Tipule brune à ventre de couleur verte en devant.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

T. fusca, abdomine anterius viridi.

Loc Habitat folia in hortis, & vitra domorum.

18. T. motatrix.

La Tipule à pattes en forme d'antennes ornées d'un anneau blanc.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

T. pedibus anticis maximis antenniformibus motatoribus, annulo albo.

Loc. Habitat prata.

19. T. vibratrix.

La Tibule à pattes en forme d'antennes sans anneaux.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

T. pedibus anticis maximis antenniformibus motatoribus immaculatis.

Varietas A. Corpore viridi.

B. Corpore fusco, abdomine annulis pallidis octo.

Loc. Idem.

20. T. monilis.

La Tipule à pattes d'arlequin.

Long. 1 $\frac{1}{5}$ lig. Long. $\frac{3}{4}$ lig.

T. pedibus albis annulis nigris, alis albis cinereo-maculatis.

Loc. Habitat prata & vitra domorum.

21. T. riparia.

La Tipule verte à aîles blanches sans taches ni points.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig Larg. $\frac{1}{5}$ lig.

T. viridis, alis albis immaculatis.

Loc. Habitat undèquaque.

22. T. fasciata.

La Tipule verte à bande transverse sur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

T. viridis, alarum fasciâ transversâ fuscâ.

Loc.

23. T. punctata.

La Tipule brune à quatre points bruns sur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{6}$ lig.

T. fusca, alis albidis, puncto quadruplici fusco.

Loc. Habitat vitra domorum.

24. T. reticulata.

La Tipule à aîles réticulées.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. fusca, alis albis fusco reticulatis.

Loc. Habitat loca aquatica.

25. T. immaculata.

La Tipule brune à aîles blanches.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

T. fusca, alis albis immaculatis.

Loc.

26. T. atra.

La Tipule noire à aîles blanches.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{6}$ lig.

T. atra, alis niveis.

Loc. Habitat hortos.

27. T. variegata.

La Tipule à pattes noires & jambes blanches.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{5}$ lig.

T. luteo fuscoque variegata, pedibus nigris, tibiis albis.

Loc. Habitat sylvas & hortos.

28. T. conica.

La Tipule noire à aîles noires.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

T. atro-fusca, alis nigris abdomine conico acuto.

Loc. Habitat loca humida domorum, & hortorum,

CIII. BIBIO. *Le Bibion.*

Antennæ taxiformes perfoliatæ, capite vix longiores.
Os tentaculis incurvis articulatis.
Ocelli tres.

1. B. marginalis.
Le Bibion noir à pattes jaunâtres & point marginal.
Long. 3 lig. Larg. 1 lig.
B. atro fuſcus, pedibus lividis, alarum puncto marginali fuſco.
Loc.

2. B. febrilis.
Le Bibion de S. Marc noir.
Long. 4 ½ lig. Larg. 1 lig.
B. ater hirſutus, alis albis margine exteriore nigro.
Loc. Habitat arbores æſtivo tempore.

3. B. hortulanus.
Le Bibion de S. Marc rouge.
Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

B. alis albis margine exteriore nigro, thorace abdomineque rubris.

Loc. Larva fæces bovinas habitat.

4. B. phalænoides.

Le Bibion à aîles frangées & sans taches.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

B. alis deflexis cinereis, ovato lanceolatis, ciliatis immaculatis.

Loc. Habitat humida loca, & muros latrinarum.

3. B. ciliatus.

Le Bibion à aîles frangées & couvert de taches nébuleuses.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. alis deflexis cinereis, ovato-lanceolatis, ciliatis, nebuloso maculatis.

Loc. Habitat arbores in sylvis umbrosis.

CIV. CULEX. *Le Cousin.*

Antennæ pectinatæ (maribus plumosæ.

Os siphone filiformi.

Ocelli nulli.

1. C. pipiens.

Le Cousin commun.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. cinereus, abdomine annulis fuscis octo.

Loc. Habitat prata aquatica.

2. C. pulicaris.

Le Cousin à trois taches sur les aîles.

Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{8}$ lig.

C. alis maculis tribus obscuris, antennis apice bifurcis.

Loc. Habitat sylvas & loca excelsa.

* 3. C. annulatus. Culex variegatus (Schrank) Oliv. Enc. VI

Le Cousin à pattes panachées.

Long. 3 1/2 lig.

C. fuscus, alis nervosis, pedibus albo intersectis.

Loc. Habitat adonides horti regii Parisiensis.

SECTIO SEXTA.

INSECTA APTERA.

CV. PEDICULUS. *Le Pou.*

Pedes sex.
Oculi duo.
Antennæ filiformes.
Abdomen simplex.

1. P. humanus.
Le Pou ordinaire.
P. humanus.

2. P. pubis.
Le Morpion.
P. inguinalis.

3. P. bovis.
Le Pou du bœuf à ventre chargé de huit bandes transverses.

P. bovis, abdomine lineis transversis octo ferrugineis.

4. P. vituli.

Le Pou du bœuf à ventre de couleur plombée.

P. bovis abdomine plumbeo.

5. P. circi.

Le Pou du busard.

P. circi, fuscus oblongus, abdomine flavescente, medio lateribusque fuscis.

6. P. passeris.

Le Pou du moineau franc.

Long. $\frac{3}{4}$ lig.

P. subflavescens, abdomine ovato, medio diaphano, maculâ fuscâ, lateribus punctato-ferrugineis.

7. P. columbæ.

Le Pou du pigeon.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{5}$ lig.

P. oblongus, filiformis, albicans, corporis lateribus utrinque ferrugineis.

8. P. corvi.
Le Pou du corbeau.
Long. 1 lig.
P. albo nigroque varius, abdomine ovato oblongo, utrinque incisuris nigris.

9. P. meleagridis.
Le Pou du dindon.
P. galli-pavonis.

10. P. caponis.
Le Pou de la poule à ventre bordé de noir.
P. gallinæ, abdominis margine nigro.

11. P. gallinæ.
Le Pou de la poule à tête & corcelet pointus des deux côtés.
P. gallinæ, thorace capiteque utrinque mucronato.

12. P. pulsatorius.
Le Pou du bois.
P. ligni antiqui.

Pediculi Rhedi & Linnæi.

1°. Pediculus accipitris, abdomine oblongo.

2°. P. accipitris, abdomine ovato.

3°. P. gruis.

4°. P. fulicæ.

5°. P. picæ.

6°. P. ardeæ.

7°. P. ardeolæ.

8°. P. cygni, abdomine oblongo immaculato.

9°. P. cygni, abdomine ovato utrinque lineis fuſcis notato.

10°. P. lari.

11°. P. anſeris, capite ovato, abdomine oblongo, inciſuris utrinque maculatis.

12°. P. anſeris, capite triangulari, abdomine immaculato.

13°. P. pluvialis, abdomine margine ſimplici.

14°. P. pluvialis, abdomine margine dentato ſerrato.

15°. P. querquedulæ.

16°. P. falconis tinnunculi.

17°. P. pavonis, antennis dichotomis capite longioribus, abdomine utrinque immaculato.

18°. P. pavonis, antennis ſimplicibus capite brevioribus, abdomine immaculato.

19°. P. ſturni.

20°. P. ſternæ.

21°. P. recurviroſtræ.

22°. P. hæmathopi.

23°. P. lagopi.

24°. P. aſini.

25°. P. cervi, abdomine fuſco, medio albo.

26°. P. cervi, abdominis incisuris punctis nigris.

N. B. Adde pediculos animalium exoticorum.

CVI. PODURA. *LA PODURE.*

Pedes sex.
Oculi duo.
Antennæ filiformes.
Abdominis cauda bifurca inflexa saltatrix.
Corpus squamis tectum.

FAMIL. I. *Globulosæ.*

1. P. signata.

La Podure noirâtre à taches fauves sur le ventre.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

P. fusco-nigra, abdomine globoso signaturis ferrugineis.

Loc. Habitat lapides humidos.

2. P. viridis.

La Podure verte aux yeux noirs.

Long. $\frac{1}{4}$ lig.

P. viridis, oculis nigris, capite flavescente, antennis in medio fractis.

Loc. Habitat plantas in mense aprili.

3. P. longicornis.

La Podure brune enfumée.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

P. fusca non nitens, antennis longitudine corporis.

Loc. Habitat cortices arborum.

FAMILIA II. *Longæ.*

4. P. communis.

La Podure commune velue.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. fusco nigroque variegata villosa.

Loc. Habitat lapides humidos.

5. P. livida.

La Podure jaune à anneaux noirs.

Long. $\frac{2}{3}$ lig.

P. livido-lutea, annulis transversis nigris.

Loc. Idem.

6. P. annularis.

La Podure porte-anneau.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

P. nigra, thoracis limbo antennarumque basi flavis, pedibus furcâque pallidis.

Loc. Habitat ligna exæsa.

7. P. viatica.

La Podure noire terrestre.

Long. 1 $\frac{1}{5}$ lig.

P. atra viatica.

Loc. Habitat vias, socialis.

7. P. aquatica.

La Podure noire aquatique.

P. atra aquatica.

Loc. Habitat superficiem aquarum stagnantium.

9. P. plumbæa.

La Podure grise commune.

Long. 1 lig.

P. plumbea.

Loc. Habitat arbores, prata solitaria.

10. P. violacea.
La Podure violette.
P. violacea.
Loc. Habitat cum communi.

CVII. FORBICINA. *LA FORBICINE.*

Pedes sex origine latâ & squamosâ.
Oculi duo.
Os tentaculis duobus mobilibus.
Antennæ filiformes.
Abdominis cauda tripilis.
Corpus squamis tectum.

1. F. saccharina.
La Forbicine platte.
Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.
F. plana.
Loc. Habitat ligna exæsa, lapides, fenestra undequaque.

2. F. saltatrix.
La Forbicine cylindrique.
Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.
F. teres saltatrix.
Loc. Id.; rarior.

CVIII. PULEX. *LA PUCE.*

Pedes ſex ſaltatorii.
Oculi duo.
Os inflexum.

1. P. irritans.
La Puce.

CIX. CHELIFER. *LA PINCE.*

Pedes octo.
Oculi duo.
Antennæ cheliformes roſtro longiores.

1. C. cancroides.
Le Scorpion araigné.
Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.
C. fuſcus, abdomine lineis tranſverſis.
Loc. Habitat hortos ſub lapidibus.

2. C. longicornis.
La Pince rouge.
Long. $\frac{1}{3}$ lig.
C. totus ruber, antennis extremo biſetis.
Loc. Habitat ſub lapidibus & corticibus arborum.

CX. ACARUS. *La Tique.*

Pedes octo.
Oculi duo.
Antennæ simplices rostro breviores.

1. A. ricinus.

La Tique des chiens.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. lividus, antennis brevibus subclavatis, abdomine antice maculâ ovatâ fuscâ nitente.

Loc. Habitat aures canum.

2. A. siro.

Le Ciron de la galle.

A. humanus subcutaneus.

Loc. Habitat cutem humanam in scabie. An exiccatat verè inquirendum?

3. A. casei.

Le Ciron du fromage.

A. casei antiqui.

Loc. Habitat caseum.

4. A. coleoptreorum.

La Mitte des coleoptères.

Long. $\frac{3}{4}$ lig.

A. insectorum rufus, ano albicante.

Loc. Habitat scarabæos.

5. A. gymnopterorum.

La Mitte rouge des mouches.

A. gymnopterorum ruber, punctorum coccineorum utrinque pari.

Loc. Habitat annulos muscæ.

6. A. muscarum.

La Mitte brune des mouches.

A. rufus muscarum, pedibus posticis longis filiformibus.

Loc. Idem.

7. A. holosericeus.

La Tique rouge satinée terrestre.

Long. 3 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. terrestris ruber abdomine depresso.

Loc. Habitat prata & gramina sicca.

8.

8. A. aquaticus.

La Tique rouge satinée aquatique.

A. aquaticus ruber abdomine depresso.

Loc. Habitat aquas stagnantes.

9. A. stagnalis.

La Tique aquatique panachée.

A. aquaticus niger, abdominis medio lateribusque flavis.

Loc. Habitat stagna.

10. A. petrarum.

La Tique rouge des pierres à pattes antérieures fort longues.

Long. $\frac{1}{3}$ lig.

A. petrarum ruber, pedibus anticis longitudine corporis.

Loc. Habitat superficiem lapidum.

11. A. lucidus.

La Tique noire & lisse des pierres.

Long. $\frac{1}{4}$ lig.

A. petrarum niger, abdomine globoso lucido, femoribus subclavatis.

Loc. Idem.

12. A. coleoptratus.

La Tique noire à ventre anguleux en devant.

A. ater, lateribus abdominis antrorsum acutis.

Loc. Habitat lapides & muros.

13. A. textor.

Le Tisserand d'automne.

A. fuscus, autumnalis, textor.

Loc. Habitat corticem arborum, quas sericeo filo obvestit.

14. A. vespertilionis.

La Tique de la chauve-souris.

Long. 1 lig.

A. fuscus, ovatus, pedibus pallidis, vespertilionis.

Loc. Habitat corpus vespertilionis.

CXI. PHALANGIUM. *Le Faucheur.*

Pedes octo.
Oculi duo.
Antennæ angulosæ.
Tentacula duo longa antenniformia.

1. P. opilio.
Le Faucheur.
Loc. Habitat undèquaque.

CXII. ARANEA. *L'ARAIGNÉE.*

Pedes octo.
Oculi duo.

FAMILIA I. *Oculi in lunam dispositi.*

1. A. viatica.
L'Araignée à pattes de devant longues & arlequinées.
Long. 2 ½ lig. Larg. 1 lig.
A. thorace fusco, abdomine lutescente, pedibus quatuor posticis brevissimis, anticis longis luteo nigroque intersectis.
Loc. Habitat plantas.

2. A. citrina.
L'Araignée citron.
Long. 4 lig. Larg. 2 ½ lig.
A. citrino-lutea, pedibus quatuor posticis brevissimis, abdomine utrinque fasciâ ferrugineâ.
Loc. Idem.

3. A. extensa.

L'Araignée à ventre cylindrique & pattes de devant étendues.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

A. abdomine longo argenteo virescente, pedibus longitudinaliter extensis.

Loc. Habitat sylvas humidas.

4. A. fasciata.

L'Araignée brune à trois raies transverses blanches sur le ventre.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

A. fusca, thorace lineis quatuor obliquis fuscis, abdomine tribus transversis albis.

Loc. Habitat hortos.

5. A. intersecta.

L'Araignée à ventre roux rayé de noir & pattes arlequinées.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

A. nigra, abdomine ferrugineo flavo lineis transversis contiguis, nigris pedibus fusco ferrugineoque intersectis.

Loc. Habitat arva.

FAMILIA II. *Oculi in quadratum dispositi.*

6. A. parietina.

L'Araignée brune domestique.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

A. atro-fusca, subvillosa, pedibus atro fuscoque intersectis.

Loc. Habitat angulos murorum, domestica.

7. A. aquatica.

L'Araignée brune aquatique.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

A. aquatica tota fusca.

Loc. Habitat aquam stagnantem.

8. A. foliata.

L'Araignée porte-feuille.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

A. pallida, abdomine folium longitudinaliter extensum pallide nigrum referente.

Loc. Habitat prata.

9. A. dumetorum.

L'Araignée à feuille coupée.

Long. 4 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. livido rufa, abdominis picturâ foliaceâ nigrâ, luteo intersectâ, pedum annulis nigris.

Loc. Habitat sylvas, telam verticalem construit.

10. A. papalis.

L'Araignée à croix papale.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

A. livido-rufa, abdomine cruce triplici luteâ.

Loc. Habitat hortos.

11. A. longipes.

L'Araignée rougeâtre à ventre jaune ponctué de noir.

Long. 3 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 lig.

A. pallido-rufa, abdomine flavescente punctis nigris.

Loc. Habitat arbores.

12. A. vittata.

L'Araignée à bande rouge.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. pallida, abdomine ovato flavo, fasciâ longitudinali coccineâ.

Loc. Habitat cupressum, in horto regio.

13. A. phalangiodes.

L'Araignée domestique semblable au faucheur.

Long. 8 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. fusco-flavescens, pedibus longis corpore triplo longioribus.

Loc. Habitat domos.

FAMILIA III. *Oculi in duas lineas dispositi.*

14. A. marmorata.

L'Araignée à feuille découpée & déchiquetée.

Long. 3 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. livido-rufa, abdominis picturâ foliaceâ sæpius interruptâ, pedibus nigro maculatis.

Loc. Habitat plantas, filum horisontalem construit.

FAMILIA IV. *Oculi in tres lineas dispositi.*

15. A. lupus.
L'Araignée loup.
Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.
A. tota fusca fuliginea.
Loc. Habitat arva sine filo.

16. A. palustris.
L'Araignée cendrée à trois lignes blanches sur le corcelet.
Long. 4 lig. Larg. 2 lig.
A. tota cinereo-villosa, thoracis lineâ triplici albidâ.
Loc. Habitat prata humida.

17. A. scenica.
L'Araignée sauteuse aux trois chevrons blancs.
Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.
A. saliens nigra, abdomine utrinque lineis tribus albis ad angulum acutum coeuntibus.
Loc. Habitat arva & domos.

FAMILIA V. *Oculi in serta dispositi.*

18. A. meticulosa.
L'Araignée domestique à longues pattes.

A. longipes, thorace pedibusque pallidis, abdomine plumbeo fusco.
Loc. Habitat domos.

CXIII. MONOCULUS. *LE MONOCLE.*

Pedes sex.
Oculus unus.
Antennæ multiplices setis plurimis lateribus.
Corpus crustâ tectum.

1. M. pulex.
Le Perroquet d'eau.
Long. ½ lig.
M. antennis dichotomis, caudâ inflexâ.
Loc. Habitat aquam stagnantem, quam sanguineo colore tingit.

2. M. pediculus.

Le Monocle à queue retroussée.

M. antennis dichotomis, caudâ reflexâ.

Loc. Habitat aquam stagnantem, quam sanguineo colore tingit.

3. M. quadricornis.

Le Monocle à queue fourchue.

M. antennis quaternis, caudâ rectâ bifidâ.

Loc. Idem.

4. M. conchaceus.

Le Monocle à coquille longue.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. antennis capillaceis multiplicibus, testâ bivalvi oblongâ.

Loc. Idem.

5. M. testaceus.

Le Monocle à coquille courte.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. antennis capillaceis multiplicibus, testâ bivalvi globosâ.

Loc. Idem.

CXIV. BINOCULUS. *LE BINOCLE.*

Pedes ſex.
Oculi duo.
Antennæ ſimplices ſetaceæ.
Cauda bifida.
Corpus cruſtâ tectum.

1. B. apus.
Le Binocle à queue en filets.
Long. 18 lig. Larg. 10 lig.
B. caudâ biſetâ.
Loc. Habitat aquam, rarus.

2. B. foliaceus.
Le Binocle à queue en plumet.
Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.
B. hæmiſphæricus, caudâ foliaceâ, capitis puncto triplici fuſco.
Loc. Habitat rivulos.

3. B. gaſteroſtei.
Le Binocle du gaſteroſte.
B. gaſteroſtei.
Loc. Idem.

CXV. CANCER. *Le Crabe.*

Pedes decem, primi cheliformes.
Oculi duo.
Antennæ filiformes.
Cauda foliosa.
Corpus crustâ tectum.

1. C. astacus.
L'Ecrevisse.
C. macrourus, rostro supra serrato, basi utrinque dente simplici, thorace integro.
Loc. Habitat fluvios, rivos.

2. C. pulex.
La Crevette des ruisseaux.
Long. 7 lig. Larg. 2 lig.
C. macrourus rufescens, thorace articulato.
Loc. Habitat rivulos.

CXVI. ONISCUS. *Le Cloporte.*

Pedes quatuordecim.
Antennæ duæ fractæ.

1. O. armadillo.

Le Cloporte armadille.

Long. 5 lig. Larg. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

O. caudâ obtusâ integerrimâ.

Loc. Habitat ſylvas.

2. O. aſellus.

Le Cloporte ordinaire.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

O. caudâ obtusâ bifurcâ.

Loc. Habitat loca humida locorum.

CXVII. ASELLUS. *L'ASELLE.*

Pedes quatuordecim.

Antennæ quatuor fractæ, duæ longiores.

1. A. aquaticus.

L'Aſelle d'eau douce.

Long. 1 $\frac{2}{5}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. caudâ bifidâ ſtylitis bifurcis, articulis ſeptem.

Loc. Habitat rivos.

CXVIII. SCOLOPENDRA. *LA SCOLOPENDRE.*

Pedes ad minimum viginti quatuor, sæpe plus.

Corpus planum.

Antennæ filiformes, articulis brevibus plurimis.

1. S. forficata.

La Scolopendre à trente pattes.

Long. 9 à 10 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. rufa, pedibus utrinque quindecim.

Loc. Habitat sub lapidibus in hortis.

2. S. coleoptrata.

La Scolopendre à vingt-huit pattes.

Long. 8 lig.

S. nigricans, pedibus utrinque quatuordecim albo nigroque intersectis.

Loc. Id. rarior.

3. S. nigricans.

La Scolopendre à soixante pattes.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

S. fusca, pedibus utrinque triginta.

Loc. Idem.

4. S. phosphorica.

La Scolopendre à cent quarante pattes.

Long. 8 à 9 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

S. ferruginea, pedibus utrinque septuaginta.

Loc. Habitat terram.

5. S. fusca.

La Scolopendre à cent quarante-quatre pattes.

Long. 10 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. fusca, pedibus utrinque septuaginta duobus.

Loc. Idem.

6. S. lagura.

La Scolopendre à pinceau.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. ovalis, pedibus utrinque duodecim, caudâ albo penicillo.

Loc. Habitat cortices arborum.

CXIX. JULUS. *L'Iule.*

Pedes plus quàm centum.
Corpus teres cylindraceum.
Antennæ articulis quinque.

1. J. terreſtris.
L'Iule à deux cens pattes.
Long. 5 lig. Larg. $\frac{1}{6}$ lig.
J. fuſcus lævis, pedibus utrinque centum.
Loc. Habitat ſub lapidibus.

2. J. ſabuloſus.
L'Iule à deux cens quarante pattes.
Long. 10 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.
J. cinereus, pedibus utrinque centum & viginti.
Loc. Idem

FINIS.