

38. *Raphidia Ophiopsis* Schummel, von Daar.
 39. *Limnophilus digitatus* Schrank, von Rhodus.
 40. *Sericostoma flavicorne* nov. spec. ♂ von Kell-
 lemisch.

Nigrum; palpis maxillaribus cochleiformibus, capiti adpressis; occipite thoraceque nigro-hirtis; antennis crassis, flavis, basi obscurioribus; alis anticis densissime obscure cupreo-pilosis; pedibus flavis, femoribus infuscatis. Long. corp. cumalis. 6'''.

Dem *S. collare* Pict. nahe verwandt, jedoch schon durch den schwarzhaarigen Kopf und Thorax von jenem verschieden.

Die Neuroptera der *Linné'schen* Sammlung.

Mittheilung von Dr. H. Hagen.

Leider mangelt noch für die Neuropteren eine vergleichende Arbeit, welche über die in Linné's Sammlung vorhandenen Typen geeigneten Aufschluss giebt. In den umfassenden Werken von Curtis und Stephens wird nirgends erwähnt, dass jene Sammlung verglichen sei, und ich habe Grund zu vermuthen, dass eine Vergleichung der Linneischen Typen durch jene Herren nicht stattgefunden habe.

Hr. Buchhändler Dr. J. R. Schulz in London hat auf meine Bitte die Güte gehabt, an Ort und Stelle die noch vorhandenen Arten zu notiren. Seiner gefälligen Mittheilung verdanke ich folgende Bemerkungen:

In Linné's eigenem Exemplar der ed. XII. der *Syst. naturae* sind folgende Arten mit Tinte von Linné unterstrichen und sämmtlich noch vorhanden. Die Etiquetten sind nach dem Ausspruch des Hrn. Richard Hippist, Sekretair der Linnean Society, ebenfalls sicher von Linné's eigener Hand.

Libellula:	Ephemera:	Myrmeleon
4-maculata,	nigra,	Libelluloides,
flaveola,		Formicarium,
vulgata,	Phryganea:	Formicalynx,
rubicunda,	bicaudata.	barbarum.
depressa,		Panorpa:
vulgatissima,	Hemerobius:	communis,
cancellata,	pectinicornis,	germanica,
aenea,	Perla,	hyemalis,
junceae,		

forcipata,
Carolina,
variegata,
virgo,
puella,

albus,
Chrysops,
Phalanoides,
hirtus,
lutarius.

33 Arten.

Coa.
Raphidia:
ophiopsis,
cornuta.

Ausserdem sind im selben Buche mit Bleifeder unterstrichen und mit Etiquetten, welche wahrscheinlich vom Käufer der Linné'schen Sammlung, Hrn. Smith herrühren und den gelegentlichen Zusatz: E descriptione Linn. führen, noch folgende 17 Arten vorhanden:

Libellula:	Phryganea:	Myrmeleon:
fasciata.	nebulosa,	longicorne.
Ephmera:	phalaenoides,	
vulgata,	reticulata,	
marginata,	striata,	
culiciformis,	grisea,	
diptera.	grandis,	
	rhombica,	
	bimaculata,	
	nigra,	
	longicornis,	
	albifrons.	

Es finden sich also von den in der ed. XII. Syst. nat. beschriebenen 83 Arten in der Linné'schen Sammlung 50.

Von den europäischen Libellen fehlt nur *L. grandis*.

Leider konnte ich über die Insecten selbst keine nähere Auskunft erhalten.

E. Eversmann Fauna lepidopter. volgo-uralensis. **Casan 1844.**

Angezeigt vom Professor **Hering**.

Eine erfreuliche Bereicherung seiner Bibliothek erhielt der entomologische Verein durch das im vorigen Jahr erschienene, in der Ueberschrift bezeichnete Werk des Herrn Professor Dr. Eversmann zu Casan. Es eröffnet den Entomologen des westlichen Europa einen umfassenderen Blick in die Lepidopteren-Fauna des südöstlichen Russlands, als

Bibliography of the Neuropterida

Bibliography of the Neuropterida Reference number (r#):

2732

Reference Citation:

Hagen, H. A. 1845 [1845.???.?]. Die Neuroptera der Linnéischen Sammlung. Stettiner Entomologische Zeitung 6:155-156.

Copyrights:

Any/all applicable copyrights reside with, and are reserved by, the publisher(s), the author(s) and/or other entities as allowed by law. No copyrights belong to the Bibliography of the Neuropterida. Work made available through the Bibliography of the Neuropterida with permission(s) obtained, or with copyrights believed to be expired.

Notes:

File:

File produced for the Bibliography of the Neuropterida (BotN) component of the Global Lacewing Digital Library (GLDL) Project, 2005.