

FAUNISTICKÉ SPRÁVY

BIOLOGIA (BRATISLAVA)

36, 5, 389—390, 1981

ECDYONURUS MACANI THOMAS ET SOWA, NOVÝ DRUH PODENIEK (EPHEMEROPTERA) PRE FAUNU ČESKOSLOVENSKA

Illa Krno

Zoologický ústav Prírodovedeckej fakulty UK, Šafárikovo nám. 6,
806 07 Bratislava, ČSSR


Krno, I., Ecdyonurus macani Thomas et Sowa, a new species of Ephemeroptera for the fauna Czechoslovakia. Biológia (Bratislava) 36, 389—390, 1981.

Data are presented on the occurrence and morphological features of the larvae of *Ecdyonurus macani* Thomas et Sowa (Ephemeroptera). This species is a new one for the fauna of Czechoslovakia.

Pri štúdiu rozšírenia podeniek na Slovensku sme zistili nový druh podenky *Ecdyonurus macani* Thomas et Sowa pre faunu Československa. Podľa doterajších poznatkov je tento druh rozšírený v potokoch a riečach európskych nížin a príľahlých pahorkatín (Thomas, Sowa 1970; Illes, 1978), v ktorých pravdepodobne nahradzuje blízky príbuzný druh *Ecdyonurus torrentis*.

28. 5. 1977 som získal 5 lariev druhu *E. macani* z potoka Maďačka (310 m) v Krupinskej vrchovine a 16. 4. 1979 9 lariev z potoka Vydrica (230 m) v Malých Karpatoch.

Larvy druhu *E. macani* sú morfologicky veľmi príbuzné s druhom *E. torrentis*. Hlava lariev je pri druhu *E. macani* lichobežníkového tvaru so zaokrúhlenými rohmi. Dĺžka krídeliek pronota (obr. 1) je väčšia než šírka polovice pronota, výbežky krídeliek sú tupo zahrotené. Za charakteristický znak tohto druhu považujú Thomas a Sowa (1970) dĺžku lateroabdominálnych výbežkov sternitov (obr. 2), ktoré nikdy nepresahujú 1/4 dĺžky sternitu, kým pri príbuzných druhoch *E. torrentis* a *E. venosus* dosahuje až 1/3. Chodidlá nôh sú tmavé len na proximálnom konci. Tyčinky hornej distálnej strany zadných stehien (obr. 3) sú na rozdiel od druhov *E. venosus* a *torrentis* tupo zakončené. Na uvedených lokalitách sa *Ecdyonurus macani* vyskytoval spolu



Obr. 1. Tvar pronota.

Obr. 2. Latero-abdominálny výbežok 6. sternitu.

Obr. 3. Tyčinky hornej distálnej strany zadných stehien.

s ďalšími druhmi podeniek — *Ecdyonurus lateralis*, *E. starmachi*, *Rhithrogena germanica* a *Baetis rhodani*.

S úhrn

V príspevku sa uvádzajú údaje o výskyte a charakteristických morfologickej znakoch lariev podenky (*Ephemeroptera*) *Ecdyonurus macani*. Druh *Ecdyonurus macani* Thomas et Sowa je novým druhom pre faunu Česko-slovenska.

Došlo 4. 9. 1980

Literatúra

- ILLIES, J., 1978: Limnofauna Europea. Stuttgart, p. 1—532.
THOMAS, A., SOWA, R., 1970: *Ecdyonurus macani* n. sp., espèce européenne voisine d' *Ecdyonurus torrentis* Kimmis (Ephemeroptera, Heptageniidae). Ann. Limnol., 6, p. 75—85.

ECDYONURUS MACANI THOMAS ET SOWA, НОВЫЙ ВИД ПОДЕНОК (EPHEMEROPTERA) ДЛЯ ФАУНЫ ЧЕХОСЛОВАКИИ

Илья Крно

Автор приводит данные о встречаемости и характеристических морфологических признаках личинок поденки (*Ephemeroptera*) *Ecdyonurus macani*. Вид *Ecdyonurus macani* Thomas et Sowa является новым видом фауны Чехословакии.