

PRIVATE LIBRARY
OF WILLIAM L. PETERS
CAROLI LINNÆI

EQUITIS DE STELLA POLARI,
ARCHIATRI REGII, MED. & BOTAN. PROFESS. UPSAL.;
ACAD. UPSAL. HOLMENS. PETROPOL. BEROL. IMPER.
LOND. MONSPEL. TOLOS. FLORENT. SOC.

**SYSTEMA
NATUREÆ**

PER
REGNA TRIA NATURÆ,

SECUNDUM

CLASSES, ORDINES,
GENERA, SPECIES,

CUM

*CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS,
SYNONYMIS, LOCIS.*

TOMUS I.

EDITIO DECIMA, REFORMATA.

Cum Privilegio S:æ R:æ M:is Svecia.

*HOLMIÆ,
IMPENSIS DIRECT. LAURENTII SALVII,
1758.*

γ. Libellula corpore viridi-ceruleo, alis subfuscis: puncto marginali albo. *Fn. svec.* 758.

Raf. aqu. 2. t. 9. f. 6.

Raj. inf. 51. n. 12.

δ. Libellula corpore sericeo nitido, alis inaurato-fuscis: macula nigra. *Fn. svec.* 759.

Raf. aqu. 2. t. 9. f. 5.

Raj. inf. 50. n. 9. & p. 140. n. 2.

Habitat in Europæ fluviiis.

Puella. 13 L. alis erectis hyalinis.

α. Libellula corpore sericeo, alis puncto marginali fulvo. *Fn. svec.* 760.

Raj. inf. 51. n. 15.

Raf. aqu. 2. t. 10, II. omnes.

Reaum. inf. 6. t. 40. f. omnes.

β. Libellula corpore incarnato, alis puncto marginali fulvo. *Fn. svec.* 761.

Raj. inf. 51. n. 16. & 52. n. 17.

Reaum. inf. 6. t. 3. f. 4. & t. 4. f. 11. f. 6.

Raf. inf. aqu. 2. t. 10, II.

γ. Libellula corpore sericeo, alis puncto marginali nigro. *Fn. svec.* 762.

Raj. inf. 140. n. I.

δ. Libellula corpore ceruleo cinereoque alterno, alis puncto marginali nigro. *Fn. svec.* 763.

Grd. inf. 3. p. 29. f. R. *Merian. ent.* 78. t. 156.

Lift. gord. 228. f. 103. *Raj. inf.* 53. n. 18.

Reaum. inf. 6. t. 35. f. 6. *Frisch. insect.* 8. t. 11.

Habitat ad prata paludosa, viciitans Muscis.

Varictates conjunxi, quas copula saepius iunctas vidi.

208. EPHEMERA. Os edentulum absque palpis.

Alæ erectæ: posticis minimis.

Cauda saepius setosa.

* *Cauda trifeta.*

vulgata. 1. E. cauda trifeta, alis nebuloso-maculatis. *Faun. svec.*

750.

Habitat in Europæ aquis.

* * *Cau-*

Ephemera Larve natant in Aquis; volatiles facte brevissimo frumentur gaulio, sub quo copulentes & parient.

* * *Cauda bifeta.*

biocula- 2. E. cauda bifeta, alis albis reticulatis, abdomine dia-
ta. phano. *Fn. svec.* 751.
Habitat in Europæ aquosis.

culicifor- 3. E. cauda bifeta, alis albis, corpore fusco. *Fn. svec.* 753-
mis. *Rxf. inf.* 2. *aqu.* 2. t. 12.
Habitat in Europæ aquosis.

horaria. 4. E. cauda bifeta, alis albis margine crassiore nigrican-
tibus. *Fn. svec.* 754.
Swamm. quart. 87. *Ephemera minima.*
Habitat in Europæ aquis.

* * * *Cauda mutica.*

mutica. 5. E. cauda mutica, alis albis striatis. *Fn. svec.* 752.
Habitat in Europa.

vespertii- 6. E. nigra, alis interioribus albis. *Fn. svec.* 755. *It. et. 21.*
na. *Habitat in Europa.*

209. PHRYGANEAE. Os edentulum : Palpis IV.
Antennæ thorace longiores.
*Alæ incubentes : inferiori-
bus plicatis.*

Phalæ- 1. P. nigra, alis albidis : maculis nigris sparsis.
noïdes. *Uddm. diff.* 53. f. 16. *Phryganea nigra*, alis albo-pal-
lidis : maculis plurimis nigris.
Habitat in Europa.

striata. 2. P. nigra, alis testaceis nervoso-striatis. *Fn. svec.* 738.
Aldr. inf. 763.
Reaum. inf. 3. t. 13. f. 8, 9?
Habitat in Europa.

grisea. 3. P. grisea, alis superioribus nebulosis : macula margi-
nali nigra. *Fn. svec.* 739.
Reaum. inf. 3. t. 13. f. 8, 9, 11?
Habitat in Europæ aquosis.

M m 2

4. P.

*Phryganeæ Larvæ latent sub aqua intra tubos cylindricos, mobiles, a se conficiunt ;
volantes facte eboreas respertinas in aere inserviunt.*