

Ephemerida

371-378

CAROLI LINNÆI,

Equit. aur. de Stella Polari;
Archiatr. Reg. Med. & Botan. Profess. Upsal. &c.

FAUNA SVECICA.

SISTENS

Animalia SVECIAE Regni:
MAMMALIA, AVES, AMPHIBIA,
PISCES, INSECTA, VERMES.

DISTRIBUTA

PER

CLASSES & ORDINES,
GENERA & SPECIES,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIERUM,
SYNONYMIS AUCTORUM,
NOMINIBUS INCOLARUM,
LOCIS NATALIUM,
DESCRIPTIONIBUS INSECTORUM.

EDITIO ALTERA, AUCTIOR.

Coram collegio S. R. Mitis Sveciae & S. R. Mitis Poloniae ac Electoris Saxon.

STOCKHOLMIAE,
Summ & Literis Direct. LAURENTII SALVII,

1761.

376 INSECTA NEUROPTERA. EPHEMER

p. 52. n. 17. Libella minor, alis reticulatis, so rubro maculis ad singulas incisuras nigris.

DESCR. Corpus incarnatum, juxta incisuras abdominis lineocharacteribus nigris. Punctum alarum marginale fuscum.

♀ Libellula corpore sericeo; alis puncto marginali nigro.

762.

Raj. inf. 140. n. 1. Libella minor, corpore livide

DESCR. Alæ albæ puncto marginali atro. Corpus supra viridescitum, absque ulla alia mixtura; magnitudo præcedentium duarum

♂ Libellula corpore cæruleo cinereoque alterno; alis puncto marginali nigro. Fn. 763.

Raj. inf. 53. n. 18. Libella minor, alis brevioribus, corpore cæruleo maculis transversis nigris.

Gæd. belg. 3. p. 29. f. R.

List. gæd. p. 228. f. 103.

Habitat omnes ad Paludes.

DESCR. Alæ albæ, puncto marginali atro. Abdominis articuli vissi antice cinerei, postice cærulecenti-nitidi; antepenultimus & articulus in plerisque cinereus, nullo modo nitidus.

Ephemera.

1472. EPHEMERA *vulgaris* cauda trifeta, alis nebuloso-maculatis. Fn. 750.

Habitat ad Lacus.

DESCR. Differt manifeste a reliquis. Alis venis reticulatis valvis & maculis alarum nebulosis, fuscis, inæqualibus, Seræ etiam cal.

1473. EPHEMERA *bicolorata* cauda bifeta, alis albis reticulatis. Fn. 751.

Act. upf. 1736. p. 27. n. 2. Ephemera alis incarnatus. Blank. belg. t. 12. f. F.

Habitat juxta aquas æstate: Larva vero sub aqua.

DESCR. Caput minimum. Tuberula duo lentiformia, elevata. oculis multo majora, pellucida, oculis incumbentia; Thorax convexus supra nebulosus. Abdomen cylindraceum, albo diaphanum, ultimis tunc subfuscis. Cauda duabus seris rectis, corpore ipso duplo longioribus, albis; intra has duas teræ brevissimæ, incurvæ. Pedes nonnitentes, reticulatae.

1474. EPHEMERA *fusca* cauda bifeta, corpore fusco segmentisque abdominis albis.

Habitat ad Liumkihl Uplandia.

16x 5
7/56

SECTA NEUROPTERA. EPHEMERA. 377

DESCR. Caput, Thorax, Abdominis primum & quartu[m] ultima segmenta fusca. Alæ albae; secundarie minuta. Spiracula abdominis fusca. Pedes albi: anticus duobus longissimis Ungues fulci. Gibberes oculares magni, flavi. Antennæ breves albae. Caudæ setæ duas, albae, abdomine breviores.

1. EPHEMERA culiciformis cauda biseta, alis albis, corpore fusco. Fn. 753.

Habitat ad aquas.

DESCR. Culice paulo major. Thorax nigricans. Abdomen fuscum; setæ caudæ longitudine corporis. Tubercula 2 supra oculos, crassa, magna, lida.

2. EPHEMERA horaria cauda biseta, alis albis: margine crassiore nigricantibus. Fn. 754.

A. upf. 1736. p. 27. n. 3. Ephemera alis albis minima.

Swam. quart. p. 87. Ephemera minima.

Habitat ad lacus.

DESCR. Alæ albae margine crassiore fusco-nigricante. Cauda duabus setis armata, absque ulla parvis interiectis. Pedes albi, exceptis primis superioribus magis fuscis, supra oculos. Tubera duo oculis majora, fusco-purpurea. Abdomen cineratens, segmentorum marginibus albis. Habet quasi sex oculos: tubera scilicet duo majora descripta; oculos duos compositos; ad horum tuberum latera oculos duos alios minimos ante tubera positos.

Circa vesperam evolant ex aquis, secum ferentes tunicam pupulae, quam deponunt, ubi primo quiescunt, albam; sic fenestras & navigantium vestes tunicis his adspergunt; vivunt tantum per noctem, moriuntur in sequente hora matutina omnes; magnitudo musca domesticæ minoris.

4. EPHEMERA diptera cauda biseta, alis duabus: costa marginali fusca cinereo-maculata.

Habitat passim.

DESCR. Media. Alarum costa nigricans velut characteribus albidis inscripta. Inferiores alæ vix existunt.

5. EPHEMERA nigra cauda biseta, nigra, alis nigricantibus: inferioribus minimis.

Habitat ad aquas. D. C. Salander.

DESCR. Magnitudo culicis, tota nigra. Pedes pallidiores. Alæ inferiores adeo parvae ut vix conspicuum subeant. Alarum margo tenuius subciliatus.

6. EPHEMERA mutica cauda mutica, alis albis striatis.

Fn. 752.

Habitat ad aquas.

DESCR. Minor. Alæ hyalinae, sed vasis minime reticulatis. Cauda setis longis caret: capitis tubera oculis minora sunt in hac specie. Mox corpore pellucido, thorace nigricante. Femina corpore opaca subrufa. Tincte. In congressu coherent perfecte uti. Libellula.

378 INSECTA NEUROPTERA. PHRYGANE

1480. EPHEMERA *vespertina nigra*, alis inferioribus albis.
al. 21. Fn. 755.

Habitat copiose in Smolandia ad fluvium Sätthaella.

DESCR. Est inter minores generis sui, toto corpore & alis superioribus nigra; folæ alæ inferiores albae, quibus ab omnibus generis suis manifeste differt.

Phryganea.

1481. PHRYGANEA *phalænoides nigra*, alis albidis: max. nigris sparsis.

Uddm. diff. 53. f. 16. Phryganea nigra, alis albo palliatis maculis plurimis nigris.

Habitat in Finlandia: Aboæ & alibi.

DESCR. Speciosior & major omnibus notis Europæis hujus generis Corpus nigrum. Antennæ corpore dimidio breviores. Alæ albidæ colores: superiores maculis adipersæ plurimis, nigris, ad marginem stictum in ordine digestis. Inferiores albae margine postico falosa & margine vero laterali inferiori maculis nigris.

1482. PHRYGANEA *reticulata nigra*, alis subferruginea reticulatis.

Habitat ad Aquas.

DESCR. Media, itatura Phalæna. Alæ superiores subferruginea venis transverse reticulatae; ad angulum ani macula nigricans. Inferiores subferruginea fascia nigra; margine postico nigricante e maculis fluentibus acutis.

1483. PHRYGANEA *striata* alis testaceis nervoso-striatis. 738.

Aet. upf. 1736. p. 27. n. 2. Hemerobius alis testaceis nervoso striatis, antennis longitudine alarum.

Aldr. inf. p. 763. Perlarum forte species.

Habitat in viis lotosis.

DESCR. Facies phalæna majoris. Antennæ antrosum porrecte, latitudine corporis. Alæ magnæ, late, subtestacea tive fulco-testacea, aliquantulum ramosis striatae, minime autem ullo in puncto rotundato; Punctum album postice in ala superiori. Corpus fulcum.

1484. PHRYGANEA *grisea grisea*; alis superioribus nebulosis macula marginali nigra. Fn. 739.

Habitat ad Aquas.

DESCR. Mediae magnitudinis est. Alæ incumbentes, postice compresae superiores (uti totum corpus) griseæ, fusco obsoleto nebulosæ; in rumpum medio juxta marginem inferiorem seu crassiorem nigra macula.