

② 05165
L 482
13 PA

Doddi, N. 1761. "Ordine Neuroptera" in

05165

PP. 1-12, 45-46.

John D. Osനും

Copied from W. Juss., 1765, Fascimile Edition in Cornell Univ.

INSECTA

MUSEI GRÆCENSIS,

IN ORDINES, GENERA ET SPECIES
Q[uo]d

JUXTA
SYSTEMA NATUREÆ
CAROLI LINNÆI

DIGESSIT

NICOLAUS PODA,

E SOCIETATE JESU,
PHILOSOPHÆ DOCTOR, ET
MATHESEOS PROFESSOR.


Library

PRÆSTANT

APUD JOANNEM BAPTISTAM
DIETRICH, BIBLIOPOLAM.

G RÆC I I.
TYPIS HEREDUM WIDMANSTADII.
ANNO M. DCC. LXI.

1761



New York
State College of Agriculture
At Cornell University
Ithaca, N. Y.

DATE DUE

482
P4

Facsimile-Edition. Ed. W. Junk. No. 19.

N. PODA
INSECTA MUSEI GRÆGENSIS

GRÆCHI 1761



W. JUNK
BERLIN W, Sachsenische Str. 68
1915

RETURN TO
ENTOMOLOGY LIBRARY
Cornell University
Ithaca, N. Y.

April 27, 1966
Spokes, N. Y.
Carrollton
Binders
Pressboard

IO ORDINUM AC GENERUM

CIMEX. *Roftrum inflexum. Antennae thorace longiores. Alæ IV. cruciatæ complicitæ : superioribus antice coriacis. Dorsum planum thorace marginato. Pedes cursorij.*

APHIS. *Roftrum inflexum. Antennæ thorace longiores. Alæ IV. erectæ, aut nulæ. Pedes ambulatorij. Abdomen postice saepius bicorne.*

CHERMES. *Roftrum pectorale. Antennæ thorace longiores. Alæ IV. deflexæ. Thorax gibbus. Pedes saltatorij.*

COCCUS. *Roftrum pectorale. Abdomen postice scotum. Alæ II. erectæ manusculis. Ferrinæ aperteæ.*

THRIIPS. *Roftrum obscurum. Antennæ longitudine thoraci. Corpus lineare. Abdomen sursum reflexæ. Alæ IV. rectæ dorso incumbentes, longitudinales, angustæ.*

ORDO III. LEPIDOPTERA.

Alæ IV. imbricatae squamis. Os lingua involuta spirali. Corpus pilosum.

PAPILIO. *Antennæ spicem verfus crassiores, saepius clavato capitatae. Alæ (fendentis) erectæ, sursumque coninvientes (volatu diurno).*

SPHINX.

CHARACTERS.

II

SPHINX. *Antennæ medio crassiores s. ultra que extremitate attenuatae, subprimaticæ. Alæ deflexæ (volatu graviore vespertino s. matutino).*

PHALENA. *Antennæ setaceaæ a basi ad apicem sensim attenuatae. Alæ (fendentis) saepius depressoæ (volatu nocturno).*

ORDO IV. NEUROPTERA.

Alæ IV. nudæ, venis reticulatae. Cauda saepius aliquo Sexus adminiculō instructa, inertis.

LIBELLULA. *Os maxillosum : maxillis pluribus. Antennæ thorace breviores. Alæ extensæ. Cauda particulis hamofo foliaceis.*

EPHEMERA. *Os edentulum absque palpis. Alæ areatae : posticis minimis. Cauda saepius setosa.*

PHRYGANEA. *Os edentulum : palpis IV. Antennæ thorace longiores. Alæ incumbentes : inferioribus platis.*

HEMEROBIUS. *Os dentibus duobus. Alæ deflexæ, nec plicatae. Antennæ thorace convexo longiores.*

PA-

12 ORDINUM AC GENERUM

PANORPA. *Rostrum cornuum, cylindri-
cum: palpis... Antennae tharace longi-
iores. Cauda maris chelata.*

RAPHIDIA. *Os dentibus duobus in Ca-
pite depressio corneo. Alae deflexae.
Antennae longitudine thoracis antici-
elongari cylindrici. Cauda feminæ
feta recurva laxa.*

ORDO V. HYMENOPTERA.

*Alae IV. membranaceæ plerisque. Acu-
læs caudæ, sed nullus in maribus.*

CYNIPS. *Os maxillæ absque proboscide.*

Aculeus spiralis, fæpius reconditus.

TENTHREDO. *Os maxillæ absque pro-
boscidæ. Alæ planæ tumidae. Acu-
leus laminis duabus serratis vix pro-
minentibus.*

ICHNEUMON. *Os maxillæ absque pro-
boscidæ. Aculeus exsertus vagina cy-
lindrica bivalvi. Abdomensæpius pe-
tioatum. Alæ lanceolatae planæ,
in omni sexu.*

SPHEX. *Os maxillæ absque proboscide.
Alæ piano incumbentes (nec plica-
tæ), in omni sexu. Aculeus puncto-
rius reconditus.*

CHARACTRES. 13

VESPA. *Os maxillæ absque proboscide.
Alæ superiores plicatae, in omni se-
xu. Aculeus punctatus reconditus.*

APIS. *Os maxillæ aigue proboscide infe-
xa vaginis duabus bivalvibus. Alæ
planæ in omni sexu. Aculeus Feminis
& Neutris punctarius reconditus.*

FORMICA. *Squamula erepta thoraci ab
dominique interjecta. Aculeus Fe-
minis & Neutris reconditus. Alæ Ma-
ribus & Feminis; sed Neutris nullæ.*

MUTILLA. *Alæ nullæ in omni sexu. Cor-
pus pubescens. Thorax posicere retu-
sus. Aculeus reconditus punctorius.*

ORDO VI. DIPTERA.

*Alæ duæ. Halteres clavati, solitarii,
pone singulam alam, sub squamula
propria.*

OESTRUS. *Os absque proboscide aut
rostro exerto.*

TIPULA. *Os capitis elongati labii late-
ribus instrutum palpisque duo-
bus incurvis tegum, absque pro-
boscidæ & rostro.*

MUSCA. *Os proboscide carnosæ, labii
duobus laterilibus: palpi nulli.*

VE.

TA-

94. ORDO III. LEPIDOPTERA.

(e) Pyrales. *Aliis communitibus in figuram ditoideam forficata.*

Farinalis. 34. P. *Pyralis recurvicornis* alis posticis anticus fuscescentibus : strias repandis albis area interjecta glauca, posticis albis punctis marginalibus nigris.

Habitat in Farina.

(f) **Tineæ.** *Aliis convolutis fere in cylindrum, fronte pronotula.*

* **Metallica.** 35. P. *Tinea thorace aliisque anticus auratis*, posticis obscure zeneis, antennis longissimis.

Antennæ corpore triplo longiores, extre-

sum aliæ versus basim obscuræ ante-

† **Granella** G. 36. P. *Tinea aliis albo nigro-*

que reticulatis, capite flavo cri-

stro.

Pellionella. 37. P. *Tinea aliis canis medio*

puncto nigro, capite subgriseo.

S. N. L.

Larva latitans intra faculum confertum
e vestimentis, quæ destruit.

(g) **Alucitæ.** *Aliis digitatis fyllis ad basim.*

OR.

NEUROPTERA. Mit neptunigen

Stigelia.

LIBELLULA. Libellen. Wasser-

Dynamphen.

Aliis patentibus aquiescentes.

4. **Maculata.** 1. L. alis posticis ad basim nigricantibus omnibusque ad marginem exteriorem maculis duabus obcoloribus.

Flaveola. 2. L. alis basi luteis, posticis ad basim, omnibusque ad marginem exteriorem macula nigricante; thorace ab domine que luceo nigro maculato.

Rubicunda. 3. L. oculis, thorace, abdo-
mineque coccineo, aliis omnibus macula marginali rubra, posticis ad basim luteis.

Abdomen basim inter & apicem at-

nuctum.

Ref. inf. 2. aquat. 2. t. 8. f. 4.

Depressa. 4. L. alis omnibus basi nigrican-
tibus macula marginali nigra
thorace lineis duabus flavis, ab-
domine latiore flavo, subdiapha-
no, depresso lanceolato.

β. D

ORDO IV.

ORDO IV.

P. D. abdome opaco supra cæruleo
lescente, lateribus flavescente.
Cæterum præcedenti similima.
Rof. inf. 2. aquat. 2. pag. 33. die
platte, und breite leibige Bäffer
Hymphæ.

Aenea. 5. L. thorace, abdomeque vi-
ridi æneo, alis basi luteis, ma-
culæ marginali nigra.
Grandis 6. L. alis hyalinis macula mar-
ginali nigra, thoracis lineis qua-
tuor flavis, abdome viridi, cæ-
ruleoque vario.
Maxima, corpus trex, ale expansæ quo-
tuor digito agnanti.
Ald. inf. 2. t. 1. f. 6. speciosa ac ele-
gans Perla.

Rof. inf. 2. aquat. 2. t. 2. f. 1. pag. I.
Bäffer = Zöde, Bäffer = Jungfer,
Stüzen-Schleifer. Nürnberg. vulg.
Leufels-Zöde, Grufels-Bäfer. bit-
lici vulg. Gläser, Hertl-Flüge.

•• Oculi diffantes, remotique.
Virgo. 7. L. alis erettis coloratis.
a. L. corpore sericeo nitido, alis lu-
teo fuscis : margine immaculatis.
S. N. L.

y. L.

NEUROPTERA. 97

V. corpore viridi cæruleo, alis
subfuscis : punto marginali al-
bo. *S. N. L.*
• e. V. alis sature cæruleis, apice pal-
lidioribus, corpore eleganter vi-
ridi.

Rof. inf. 2. aquat. 2. t. 9. f. 5.
• f. V. alis ad apicem & basim hyalinis,
in medio cæruleis.

Rof. inf. 2. aquat. 2. t. 9. f. 7.

Puella. 8. L. alis erettis hyalinis.
a. P. corpore sericeo, alis puncto
marginali fuscō. *S. N. L.*

• P. corpore sericeo, alis puncto
marginali nigro. *S. N. L.*
2. P. corpore cæruleo, cinereoque
alterno, alis puncto marginali
nigro. *S. N. L.*

EPHemeræ. Utter, §§.

• *Cauda triser.*
• *Ignita.* 1. E. cauda trifera, oculis rubris,
alis ad apicem albis ? abdomen
fuscō, pedibus anticus longissimi.
Corpus tres lineas longum.

• *Cauda bifera.*
• *Maculata.* 2. E. cauda bifeta, alis reti-
culatis albis nebuloso maculatis
C cor

corpo fuscō, annulis lucidioribus.

Culiciformis. 3. E. cauda bisepta corporis longitudine, alis apicem versus fus albis, corpore fuscō.

Habitat in aquosis.

* Speciosa. 4. E. cauda bisepta corpore triplo fere longiore pedibus anticis longissimi cyaneis, alis albis, corpore fuscō.
Habitat in aquosis.

PHRYX.

Ephemeræ ovæ remittunt aqæis, atque hinc matres cum morte incubentes, vel examines in superficie acerorum frequentier repertumur. Inæc natæ larva antenæ longæ abdomen ventrioso virgatus primis 7. diiformis. Et sirofus infra singulas aculeo reconditæ cænæ trifascia longissima plus lateribus ornata, pinnas continenter agitas, eamque motu plœcide picebat in aqæs, incervato tamem corpore saitus maiores sepe faris Elaphe s. circiter mœbius glibbi duo majoris cæpiæ coloris in capite cernuntur. Et facculi duo thoraci acrosticent nascuntur. Ephemeræ alias sovantes; ubi metamorphosæ proxima aque superficiem petit, limbus vofis accedit, ac extremæ in modum se turgurando ac fringente forcis pedibus aqæ effunduntur insulans, unde tandem se librabit in auras.

PHRYGANEÆ.

Bicaudata. 1. P. alis venoso reticulatis, thorace medio sulco longitudinali-nali, cauda bisepta.

Corpus digitum sequat; cauda interdum corpus subæquat.

P. B. fronte puncto, thorace medio linea longitudinali flava.

Statu prætentis, sed triplo fere minor.

Nebulosa. 2. P. nigra, alis incurrentibus cinereo nebulosis, caudæ fenis truncatis.

• Grammatica. 3. P. alis hyalinis flavescens-tibus fronte V. vel C. nigro inscripta, cauda bisepta.

Larva intra tubulum conicum arundinaceum latet, quæniam nuzquam egreditur. Quando in altum se promovet caput, caput, atque fer pedes quibus remigat, protendit, dantici brevissimi, profici vero longissimi sunt. Caput flavum. Thorax cinereus. Reperi complures ejusmodi larvas ad orrandines stagni mente Nati e quibus omnibus P. Grammaticas obtinuit.

HEMEROBIUS. Sand. Bibelle
Nymph. Nymph.

Perla. 1. H. viridis alis hyalinis, vasis viridibus. S. N. L.

Chrysops. 2. H. viridi nigroque varius, alis hyalinis reticulatis oculis auratis.

Aureus oculorum nitor paulo proptetum perit.

Formica leo ♂. 3. H. glaber alis hyalinis maculis nigris, & una marginali alba apicem versus; antennis clavatis.

Ref. inf. 2. aquat. 2. t. 20. pag. 126

Die grösste Sand. Bibelle. Ober Nymph. Nymph.

Larva intra arenam latitat formicis plurimum visitans, atque bina appellatur *Meterstraber*, *Hanss-Löwe*.

PANORPA.

Communis. 1. P. alis æqualibus nigro maculatis. S. N. L.

Ad. inf. 3. t. 5. f. 9. culex cauda scorpionis.

Mas. Cauda scorpionis in modum sursum incurvata articulo ultimo crassata, & duabus spiculis armata. Fe-

mi-

NEUROPTERA.

101

mina abdomine attenuata, parte postrema bifida, retrorsum.

RAPHIDIA.

Opnois. 1. R. capite depresso, ore maxilloso, alis hyalinis macula marginali fusca.

Mas abdomine rotundo. **Femina** cauda setosa seta recurva corpore breviori.

Ad. sepes boreti tres repente.

Decu magni tronimuli virides macrati. *Os* palpis 4. *Pedes* antici femoribus longis gracilibus, tibialis decororibus latis crassis dentatis denitudo ultimo longiore & unco majore instruantur. *Agere* ac tande prograditur, nempe unco, & tibialis complicatis solis femorum geniculis insiftens, quibus expeditis ad ascendendum utitur. *Abdomen* oblongum octatum fulvum album maculatum.

OR-

G 3