

CAROLI LIB. BAR. DE GEER
REGIAE AVLAE MARESCH. R. ORD. WASIACI,
COMMEND. CRVGIG. R. ORD. DE STELLA BOR.
EQVIT. AVRAT. R. ACAD. SCIENT. SVEC.
MEMBR. ET PARISINAE CORRESPOND.

GENERA
ET
SPECIES
INSECTORVM

E
GENEROSSISSIMI AVCTORIS
SCRIPTIS

EXTRAXIT, DIGESSIT, LATINE QVOD PARTEM
REDDIDIT, ET TERMINOLOGIAM INSECTO-
RVM LINNEANAM ADDIDIT

ANDERS JAHAN RETZIVS

PHIL. MAG. PROF. REG. ET BOTAN. DEMONSTR.
SOCIET. PHYSIOGR. LVND. SECRET. SOC. REG. PA-
TR. SVEC. ET HASSO-HOME. MED. HAFN. NAT. CV-
RIOS. BEROL. ET SCIENT. AC ELEG. LITT. GOTH.
MEMBR. SOC. OECGN. LIPS.
CORRESPOND.

LIPSIAE,
APVD SIEGFRIED LEBRECHT CRVSIVM,
MDCCCLXXXIII.

tibis : alis superioribus posticé rotundatis angulo exteriore linea nigra. T. 2. p. 543. t. 13. f. 18 — 21.

176. *Pb. punctato-lineata*, antennis longitudine corporis, flavo-fusca, pedibus ochraceis, alis superioribus macula alba lineisque 2. nigro-griseoque-punctatis. T. 2. p. 548. t. 14. f. 4 — 5.

Fam. 2.

177. *Pb. nigra fasciata*, antennis corpore duplo longioribus, alis maris nigris fasciis testaceis, foeminae fusciis macula una vel altera flava. T. 2. p. 568. t. 15. f. 1 — 9.

Pb. bimaculata. L. S. N. p. 909.

178. *Pb. nigro-nervosa*, antennis nigris corpore duplo longioribus, palpis longis, alis fusco-testaceis nervis nigris, oculis ferrugineis. T. 2. p. 578. t. 15. f. 19. 20.

179. *Pb. nigro-coerulea*, antennis corpore duplo longioribus, palpis longis villosis, alis coeruleo-atris nitidis, oculis rubris. T. 2. p. 580. t. 15. f. 21 — 23.

Pb. nigra. L. S. N. p. 909.

Larvae obscurae hujus generis:

T. 2. p. 549. t. 14. f. 6 — 12,
p. 557. t. 14. f. 15. 16.
p. 568. t. 15. f. 8 — 10,
p. 570. t. 15. f. 11 — 14,
p. 571. t. 15. f. 15 — 18.

Gordius aquaticus Phryganearum laryas perforans
p. 553. t. 14. f. 13, 14;

7. EPHEMERA.

180. *E. communis*, fusca, abdomine luteo, maculis triangulis nigris, alis fusco-maculatis, cauda tri-

trifeta. T. 2. p. 621, t. 16, f. 1 — 14.
t. 17, f. 1 — 10.

E. vulgata. L. S. N. p. 906.

181. *E. albipennis*, nigra, thoracis lateribus fuscis,
alis albis pellucidis immaculatis, cauda tri-
feta. T. 2. p. 646, t. 17. f. 1 — 16.

E. vespertina. L. S. N. p. 906.

182. *E. cincta*, fusca, abdominis medio cingulo al-
bo, oculis 4. *maris*, cauda trifeta. T. 2.
p. 650, t. 17. f. 17. 18.

Fam. 2.

183. *E. fusco-grisea*, nigro-fusca, abdomine subtus
griseo, alis pellucidis nigro-nervosis, cauda
bifeta. T. 2. p. 652, t. 18. f. 1 — 4.

184. *E. diptera*, alis duabus griseo-fusca, abdomine
lineolis rubris, cauda bifeta, alarum *fœ-
minæ* margine exteriore fusco maculis al-
bis. T. 2. p. 656. t. 18. f. 5 — 10.

E. diptera. L. S. N. p. 907.

8. LIBELLULÆ.

Fam. 1.

185. *L. flavipennis*, fusca, capite globoso, thorace
lineis 4. obliquis flavis, alis subluteis, ab-
domine cylindrico. T. 2. p. 678. t. 20. f.
5 — 16.

L. grandis. L. S. N. p. 903.

186. *L. viridi-cincta*, nigra, capite globoso, tho-
race maculis abdomineque cingulis viridi-
bus. T. 2. p. 685. t. 21. f. 1 — 2.

L. forcipata; L. S. N. p. 903.