


IOANNIS ANTONII SCOPOLI
MED. DOCT. S. C. R. ET APOST. MAIEST. MONTANÆ
CIVITATIS IDRIÆ PHYSICI

ENTOMOLOGIA
CARNIOLICA
EXHIBENS
INSECTA
CARNIOLIÆ INDIGENA
ET
DISTRIBUTA IN ORDINES, GENERA,
SPECIES, VARIETATES.
METHODO LINNÆANA.



VINDOBONÆ,
TYPIS IOANNIS THOMÆ TRATTNER,
CAES. REG. AVLÆ TYPOGR. ET BIBLIOP.

MDCCLXIII.



SERENISSIMO PRINCIPI
A C
DOMINO DOMINO
ERNESTO FRIDERICO
DUCI SAXONIÆ,
JULIACI, CLIVLÆ, MONTIUM
A C
WESTPHALIÆ;
COMITI THURINGIÆ;
MARCHIONI MISNIÆ;
COMITI PRINCIPI
HENNEBERGIÆ;
COMITI MARCÆ
E T
RAVENSBERGI;
DYNASTÆ IN RAVENSTEIN;
EQUITI REG. POL. ORD.
AQUILÆ CANDIDÆ
etc. etc.
PRINCIPI AC DOMINO
CLEMENTISSIMO.

682. LIBELLULA *Puella*.

— *long.* lin. 10.

Diagn. Abdomen teres, lineare, alis longius; particulis caudalibus exiguis rectis. Alæ erectæ hyalinæ, nervis obscurioribus reticulatæ.

LINN. *Syst. Nat.* p. 546.

Faun. Svec. 2. 1471.

Habitat in aquis stagnantibus.

Var. (a) Alis puncto fusco marginali ad apicem.

1. Abdomine ferrugineo, dorso & capite maculis flavis.

2. — — — cæruleo maculisque cæruleis.

ROESEL. *Inf. aquat. Cl. II. Tab. 10.*
fig. 3. 5. *Tab. 11. fig. 7.*

3. — — — nigro: maculis albis.

4. — — — rufo-rubro: segmentis tribus ultimis virescentibus.

5. — — — rufo: linea dorsali segmentisque tribus ultimis virescentibus.

6. — — — fusco-viridi: subtus albo.

7. — — — segmentis 1-5 fanguineis: margine fusco.

(b) Alis absque puncto marginali.

8. Abdom. fusco: segmentorum marginibus albidis.

Omnibus *larva* ambulatoria; ligulis caudalibus fusco-fasciatis.

EPHEMERA. (†)

LINN. *Syst. Nat.* p. 546.

683. EPHEMERA *Vulgata*.

— *long.* lin. 8½.

LINN. *Syst. Nat.* p. 546.

Faun. Svec. 2. 1472.

Diagn. Cauda trifeta. Alæ fusco-reticulatæ maculatæque.

T 4

In

(†) *Larva* aquatica, vita brevis, antennæ sunt setulæ cylindricis inarticulatæ. Alæ erectæ: posticæ minimæ. Pedes antici porrecti.

In aquis fluentibus copiosior, quam in stagnantibus.

Nigricans; abdomine albedo: incisuris singulis subtus lineolis binis longitudinalibus nigris. Sexui uni setæ caudales unciam cum dimidia longæ, alteri duplo breviores. Recens nata, alas sordide flavicantes habet. Meridie choreas aereas instituit, sursum recta tendens, rediensque eadem fere via. Hujus tanta copia, circa *Laz*, e rivo quodam, Junio M. nascitur, ut vicini Rustici exiguam messem se collegisse putent, nisi quilibet ultra viginti currus his infectis probe onustos, in agrum exoneraverit, stercorationi optime inservientes.

684. EPHEMERA *Gemmata*.— long. lin. $7\frac{1}{2}$.

Diagn. Tubercula tria frontalia, diaphana, crystallina, nigro-punctulata. Corpus rufum.

Habitat circa aquæductus *Fodinarum Idriensium*.

Hæc & sequentes caudam bifetam gerunt. Incisuræ abdominis marginibus flavicantibus. Setæ caudales unciales.

685. EPHEMERA *Albipes*.— long. lin. $3\frac{1}{2}$.

Diagn. Fusca; oculis rufescentibus; pedibus albidis.

In aquosis.

Oculorum ambitus pallidior. Alæ villosulæ. Setæ caudales albidæ, corpore duplo longiores.

686. EPHEMERA *Culiciformis?*— long. lin. $4\frac{1}{2}$.

LINN. Syst. Nat. p. 547.

Faun. Svec. 2. 1475.

Diagn. Thorax linea longitudinali nigra. Oculi nigri, supra quos tubercula duo brunea.

Habitat circa aquas & paludes.

Corpus fuscum & alæ albidæ *Culiciformis* LINN. sed setæ caudales corpore fere duplo longiores in uno sexu saltem. Alæ hyalinæ, venosæ.

687. EPHEMERA *Parvula*.

— long. lin. 2.

Diagn.

Phryganea. NEUROPTERA. Phryganea. 265

Diagn. Alba; capite thorace abdominisque apice nigris.

In paludosis, Majo M.

Oculi rufi, alæ hyalinæ. Setæ abdominales alis duplo longiores, albæ. Abdomen pellucens.

PHRYGANEÆ. (†)

LINN. *Syst. Nat.* p. 547.

(*) *Alis deflexis.*

688. PHRYGANEÆ *Striata.*

— *long* lin. 7.

LINN. *Syst. Nat.* p. 547.

Faun. Svec. 2. 1483.

Diagn. Corpus nigricans. Alæ fusco-testaceæ, antennarum longitudine.

Cicca aquæductus.

Mas. Alæ immaculatæ, pedibus concolores. Abdomen terminatum molli spinula utroque in latere.

Femina. Alæ obscuriores, testaceo-punctatæ; margine externo albis punctis variegato.

Uterque, oculis bruneis, occipite piloso, antennis fusco rufoque variis longitudine alarum.

689. PHRYGANEÆ *Albicornis.*

— *long* lin. 8.

Diagn. Alæ anticæ albidæ; linea media transversa venisque fuscis longitudinalibus. Nucha albis pilis pubescens. Antennæ albidæ, alarum longitudine.

Ad aquas.

Oculi nigri. Palpi lin. ($1\frac{2}{3}$) longi. Alarum superiorum apices testacei. Alæ posticæ fuscæ; venis obscurioribus. Corpus fuscum. Pedes alis anticis concolores.

T 5

690.

(†) *Phrygan.* 1. ordinis, præsertim parvulæ, *Phal. Tineæ* ut ovum ovo similes, sed alæ pilosæ & palpi ad os incurvi detrahunt larvam.